



Glucosamine 500mg



Kotra Pharma (M) Sdn. Bhd.
No.1, 2 & 3, Jalan TTC 12, (90082-V)
Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka, Malaysia.

Appeton Essentials Glucosamine 500mg

COMPOSITION :

Each tablet contains:
Crystalline Glucosamine Sulphate
Potassium Chloride
equivalent to Glucosamine Sulphate

665mg
500mg

PRESENTATION :

Off-white, 18.8mm oblong tablet.

INDICATION :

As an adjunctive therapy in osteoarthritis.

PHARMACOLOGY :

Mechanism Of Action

Glucosamine sulphate stimulates the anabolic metabolism of osteo-cartilaginous tissues by stimulating the biosynthesis of the mucopolysaccharides that are the essential components of the cartilage ground substances. Glucosamine sulphate improves the viscosity of synovial fluid by increasing synovial fluid production, thereby providing lubricant activity. Therefore glucosamine sulphate has the therapeutic effects of reducing articular pain, improves the articular function and inhibits the articular degenerative process.

Pharmacokinetics

Glucosamine possesses antiarthrosic-arthrotrophic activities. It stimulates the anabolic metabolism of osteo-cartilaginous tissues via stimulation of the biosynthesis of the mucopolysaccharides (which are the essential components of the cartilage ground-substances and of the bone mesenchymal tissues). Glucosamine also acts to improve the viscosity of synovial fluid by increasing synovial fluid production, thereby providing lubricant activity. Glucosamine sulfate is well absorbed (with a proportion close to 90%) following oral administration. It is known that glucosamine and its metabolites bind to α - and β -globulins. Glucosamine mainly distributed to bone tissues and articular cartilages. Glucosamine half life is short, excretion, elimination of glucosamine is primarily in the urine, with a small amount of glucosamine or its derivatives eliminated in the feces.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Best taken before meal.

Light or moderate osteoarthritis symptoms:

1 tablet twice daily for at least 6 weeks.

Severe osteoarthritis symptoms:

Initially 1 tablet 3 times a day for at least 8 weeks.

Maintenance therapy should be followed for 3-4 months with 1 tablet twice daily. The treatment should be repeated every other 6 months or as directed by physician.

CONTRAINDICATIONS:

Contraindicated in patients sensitive to glucosamine sulphate and shellfish.

INTERACTION WITH OTHER MEDICAMENTS:

Glucosamine may increase insulin resistance and consequently affect glucose tolerance. Diabetics who are under medical advice, decide to use glucosamine will need to monitor their blood glucose and may need to adjust the doses of the medications they take to control

Appeton Essentials Glucosamine 500mg

blood glucose. This need to be done under medical supervision. No other drug, nutritional supplement, food or herb interaction is known.

PRECAUTIONS:

As this is a causal therapy, Appeton Essentials Glucosamine 500mg Tablet is not meant to replace NSAIDs in cases of intense pain. It is advisable to take an anti-inflammatory drug in the initial treatment of osteoarthritis together with glucosamine sulphate. Therapeutic effect can only be seen after approximately 1 week from the beginning. The effect of glucosamine on insulin sensitivity and glucose is unclear; caution is advised for diabetic patients.

Use In Pregnancy And Lactation

Animal studies did not show any unfavourable effects on the reproductive functions or lactation. In the absence of such studies in humans, the product should only be used under medical supervision for pregnant and lactating mother.

SIDE EFFECTS :

- **Cardiovascular** : Peripheral oedema, tachycardia were reported in a few patients following larger clinical trials investigating oral administration in osteoarthritis. Causal relationship has not been established.
- **Central nervous system** : Drowsiness, headache, insomnia have been observed rarely during therapy (less than 1%).
- **Gastrointestinal** : Nausea, vomiting, diarrhoea, dyspepsia or epigastric pain, constipation, heartburn and anorexia have been described rarely during oral therapy with glucosamine.
- **Skin** : Skin reactions such as erythema and pruritus have been reported with therapeutic administration of glucosamine.

STORAGE :

Store below 30°C. Protect from light.

PACK QUANTITIES :

Available in amber glass bottle of 30's & 90's.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Further information can be obtained from healthcare professional or the manufacturer.

KANDUNGAN :

Setiap tablet mengandungi:
Crystalline Glucosamine Sulphate
Potassium Chloride
bersamaan dengan Glucosamine Sulphate

665mg
500mg

CIRI-CIRI FIZIKAL :

Tablet berwarna putih, 18.8 mm dan berbentuk bujur.

INDIKASI :

Sebagai terapi tambahan untuk osteoarthritis.

Appeton Essentials Glucosamine 500mg

FARMAKOLOGI :

Tindakbalas Mekanisma

Glucosamine Sulphate merangsang metabolisme anabolik tisu-tisu rawan otot melalui rangsangan biosintesis mukopolisakarida (komponen penting bagi rawan). Ia meningkatkan kelikatan bendalir sinovia dengan menambahkan pengeluaran bendalir sinovia mempunyai kesan-kesan terapeutik dalam mengurangkan sakit sendi, memperbaiki fungsi sendi dan menghalang proses merosot artikulasi.

Farmakokinetik

Glucosamine memiliki aktiviti antiarthrosic - arthrotrophic. Ia merangsang metabolisme anabolik tisu-tisu rawan otot melalui rangsangan biosintesis mukopolisakarida (komponen penting bagi rawan dan tisu tulang mesenkim). Ia meningkatkan kelikatan bendalir sinovia dengan menambahkan pengeluaran bendalir sinovia yang menyediakan kesan pelinciran. Glucosamine Sulfat mudah diserap (dengan serapan yang hampir 90%) dengan pengambilan melalui mulut. Ia dikenali bahawa Glucosamine dan metabolitnya mengikat pada α - dan β -globulins. Glucosamine dihantar terutamanya kepada tisu tulang dan rawan artikular. Separuh hayat Glucosamine adalah pendek, perkumuhan atau penyingkiran Glucosamine terutamanya dalam air kencing, dengan kuantiti yang kecil atau penerbitannya disingkirkan dalam najis.

SUKATAN :

Baik diambil sebelum makan.

Symptom osteoarthritis yang ringan atau sederhana : 1 tablet dua kali sehari untuk sekurang-kurangnya 6 minggu.

Symptom osteoarthritis yang teruk : Pada mulanya 1 tablet tiga kali sehari untuk sekurang-kurangnya 8 minggu.

Terapi pengendalian harus diikuti dalam tempoh 3-4 bulan dengan 1 tablet dua kali sehari. Rawatan harus diulangi berselang 6 bulan atau seperti yang disyorkan oleh doktor.

KONTRAINDIKASI :

Tidak dibenarkan bagi pesakit yang sensitif terhadap Glucosamine Sulphate dan hidupan laut yang bercengkerang.

INTERAKSI DENGAN UBAT YANG LAIN:

Glucosamine boleh meningkatkan ketahanan insulin dan akibatnya menjejaskan toleransi glukosa. Pesakit kencing manis yang masih mempunyai rawatan perubatan memutuskan untuk menggunakan Glucosamine untuk memantau glukosa darah mereka dan mereka perlu menyesuaikan sukatan ubat yang diambil untuk mengawal paras glukosa darah. Ia perlu diambil atas nasihat doktor. Tiada interaksi dengan ubat, suplemen, makanan atau herba lain dikenali.

PERHATIAN :

Appeton Essentials Glucosamine 500mg Tablet bukan ubat ganti NSAIDs dalam kes kesakitan yang kuat. Dinasihatkan mengambil ubat anti-radang bersama dengan glucosamine sulphate sebagai rawatan

Appeton Essentials Glucosamine 500mg

permulaan untuk osteoarthritis. Kesan terapeutik hanya akan dilihat selepas lebih kurang 1 minggu daripada permulaan. Kesan Glucosamine terhadap kepekaan insulin dan glukosa tidak jelas; dinasihatkan untuk berhati-hati bagi pesakit kencing manis.

Kehamilan Dan Penyusuan

Kajian terhadap haiwan tidak menunjukkan sebarang bukti kesan sampingan terhadap kehamilan atau penyusuan. Tiada sebarang kajian terhadap manusia dijalankan, oleh itu semasa mengandung atau menyusukan anak pengambilan ubat ini harus diambil atas nasihat doktor.

KESAN SAMPINGAN :

- **Kardiovaskular** : Peripheral oedema dan tachycardia pernah dilaporkan oleh sebilangan pesakit yang mengikuti kajian klinikal untuk osteoarthritis. Hubung kait kesan sampingan tersebut masih belum dikenalpasti.
- **Sistem Saraf Pusat** : Mengantuk, sakit kepala dan insomnia (susah tidur) kadang-kadang diperhatikan berlaku kepada sebilangan kecil pesakit yang mengikuti program terapi (kurang daripada 1%).
- **Gastrointestinal** : Loya, muntah, cirit-birit, dyspepsia atau gastrik, sembelit, pedih ulu hati dan anorexia jarang dikesan oleh sebilangan pesakit semasa terapi oral dengan glucosamine.
- **Kulit** : Tindak balas pada kulit seperti erythema dan pruritus pernah dilaporkan semasa kajian penggunaan glucosamine secara terapeutik.

PENYIMPANAN :

Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi dari cahaya.

KUANTITI PEMBUNGKUSAN :

Dibungkus dalam botol kaca sebanyak 30, 90 dan 250 biji.

JAUHI DARI KANAK-KANAK

Keterangan lanjut boleh diperolehi dari pakar kesihatan atau pengilang.

成份:

每粒含:

葡萄糖胺硫酸钾盐晶体665mg相等干葡萄糖胺硫酸500mg。

外形:

白色锭剂,18.8毫米长,圆橢形。

适应:

关节炎的附加治疗。

药理:

作用过程

葡萄糖胺硫酸能刺激体内细胞合成粘多糖 (是软骨组织基质的构成成份)。它能刺激骨及软骨组织的

Appeton Essentials Glucosamine 500mg

的同化新陈代谢。葡萄糖胺硫酸也能改善滑液的生产及粘性,从而供应润滑的需要。因此葡萄糖胺硫酸的疗效包括减少关节疼痛,改善关节功能及抑制关节退化。

药效动力学

葡萄糖胺具有抗关节炎的活动。它能激发软骨组织的合成代谢,粘多糖(软骨物质的基本组成部分)和骨间叶组织的生物合成。葡萄糖胺也能改善关节滑液的生产及黏度,从而提供润滑作用。口服葡萄糖胺硫酸容易被人体吸收(接近90%)。据了解,葡萄糖胺及其代谢物能与球蛋白的 α 和 β 结合。主要分布至骨骼和软骨组织。葡萄糖胺的半衰期很短,主要排泄于尿液中或排除于粪便中。

剂量:

用餐之前服用最佳。

轻微骨关节炎:每天两次,每次一粒,使用六星期。

严重骨关节炎:每天三次,每次一粒,使用八星期。

持效治疗须继续三至四个月,每天两次,每次一粒。每六个月须重复此治疗或遵照医生指示服用。

禁忌:

对葡萄糖胺硫酸及水生贝壳类动物过敏的病人不可使用。

与其它药物的相互作用:

葡萄糖胺可增加胰岛素抗性,进而影响葡萄糖胺的耐受性。接受医疗辅导的糖尿病患者准备服用葡萄糖胺时须监测血糖,并可能需要调整它们的药物剂量来控制血糖。这需要在医务人员的监督下进行。没有与其它药物,营养补充剂,食物或草药的相互作用。

注意:

在骨关节炎病人极其为疼痛的情况下Appeton Essentials Glucosamine 500mg Tablet 是不能用来取代NSAIDs当作止痛药。比较好的疗法是让初期骨关节炎病人一起使用抗炎药和葡萄糖胺硫酸。服用约一星期后方见效。氨基葡萄糖对胰岛素敏感性和葡萄糖的影响目前还不清楚,建议糖尿病患者谨慎服用。

怀孕及哺乳

根据动物研究报告显示此产品不会对生殖功能或在哺乳期带来任何伤害。在没有人体实验的情况下此产品只能够在医生监督下使用于孕妇及哺乳妇女。

副作用:

- 心脏血管:曾以口服葡萄糖胺治疗骨关节炎的临床实验中发现,有少数病人出现周边细胞水肿,心跳过速的反应。但因果尚未证实。
- 中枢神经系统:治疗过程中,嗜睡,头痛,失眠较为罕见(少于1%)。
- 肠胃系统:治疗过程中,噁心,呕吐,腹泻,消化不良或上腹疼痛,便秘,胃灼热及食欲不振,甚为罕见。
- 皮肤:皮肤的反应如:红疹及皮肤瘙痒亦曾被报道。

贮藏:

贮藏于30°C 以下,避免阳光照射。

包裝: 30及90粒玻璃瓶装。

置于小孩取不到之处。

欲知详情,请询问保健专业人士或制造商。