

Gaviscon Liquid Sachets (Inner Leaflet)
W100mm x H175mm

FRONT

GAVISCON LIQUID SACHETS

Gaviscon Liquid Sachets bring relief from the pain and discomfort of heartburn and acid indigestion which, for example, can occur after meals or during pregnancy. They belong to a group of medicines called 'reflux suppressants', which form a protective layer on top of the stomach contents to prevent stomach acid escaping from the stomach where it works into the food pipe where it hurts.

What is this product?

Each sachet (10ml) of oral suspension contains 500 mg sodium alginate, 267 mg sodium bicarbonate and 160 mg calcium carbonate as the active ingredients, 40mg methyl parahydroxybenzoate (E218), and 6mg propyl parahydroxybenzoate (E216) as preservative. It also contains carbomer, sodium saccharin, sodium hydroxide, natural mint flavour and purified water. The product is sugar-free and colour-free. You can take this product if you are pregnant or breast feeding.

Dosage:

For oral administration. Adults, including the elderly and children 12 years and over: One to two sachets, up to 4 times a day after meals and at bed time.

Before taking this product:

Each sachet (10ml) of oral suspension contains 6.2 mmol of sodium and 1.6 mmol of calcium. If you have been advised a diet restricted in either of these please consult your doctor before taking this product. This product contains methyl (E218) and propyl (E216) parahydroxybenzoates which may cause allergic reactions (possibly delayed). Do not take if you know you are allergic to any of the ingredients as skin rashes and difficulty in breathing have been reported. Consult your doctor if you experience these or any other side effects.

KEEP MEDICINE OUT OF THE REACH AND SIGHT OF CHILDREN.
Jauhi dari kanak-kanak.

After taking this product:

If you forget a dose it is not necessary to double the dose next time, just carry on taking as before. If symptoms persist after seven days consult your doctor. If you take too much of the medicinal product you may feel bloated. It is unlikely to cause you any harm, but please consult your doctor or pharmacist.

Do not store above 30°C and store in the original package. Do not freeze or refrigerate. Do not use this medicine after the expiry date shown.

Manufacturer and Product Licence Holder in UK:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Hull, HU8 7DS, UK.
Export Distributors: Reckitt & Colman (Overseas) Ltd., Hull, U.K.

Marketed by:

RB (Health) Malaysia Sdn Bhd (1297081-V)
Level 17, Menara One Sentrum, No. 201, Jalan Tun Sambanthan,
50470 Kuala Lumpur, Malaysia. Careline number: 1800-888-889 MAL09032013X
Reckitt Benckiser (Singapore) Pte. Ltd.
12 Marina Boulevard #19 – 01, Marina Bay Financial Centre, Tower 3,
Singapore 018982. Careline number: 1800-875-0770 SIN13738P
Brunei - BRU15031830NP

0275453



BACK

GAVISCON LIQUID SACHETS

oral suspension

ဆေးအမျိုးအစား : အစာခြေအက်ဆစ်ပြန်စီးခြင်းနှင့်အစာမကြေခြင်းကြောင့် အစာအိမ်နာခြင်းနှင့် မအိမ်သာဖြစ်ခြင်းတို့မှ သက်သာစေသည်။

အရွယ်အစား : ၁၀မီလီလီတာဆေးရည်အိတ်

အရေအတွက် : ဆေးတစ်ထွင်းတွင်အလွန်နိမ့်အလွှာအုပ်ထားသော ၁၀မီလီလီတာဆေးရည်အိတ် (၂၄) အိတ်ပါဝင်သည်။

အလေးချိန် : ၁၀မီလီလီတာဆေးရည်အိတ် (၂၄) အိတ်

အသုံးပြုရန်လမ်းညွှန် : သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ လူကြီးများနှင့် အသက် ၁၂ နှစ်အထက်ကလေးများ ဆေးရည်အိတ် (၁) အိတ်မှ (၂) အိတ်ကို အစာစားပြီးနောက်နှင့် အိပ်ယာဝင်ချိန်တွင် တစ်နေ့လျှင် ၄ ကြိမ်အထိသောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
အသက် ၁၂ နှစ်အောက်ကလေးများ: သမားတော်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းသာ သောက်သုံးသင့်ပါသည်။

ဆေးထားသိုရန်လမ်းညွှန် : 30°C အထက်တွင် မထားရ။

သတိပြုရန်/သတိပေးချက် - ဤဆေးသည် ဆိုဒီယမ်ပမာဏမြင့်မားစွာပါဝင်သည်။ အထူးသဖြင့် ဆိုဒီယမ်ပါဝင်မှုနည်းသောအစားအစာစားသုံးနေရသောသူများတွင်သတိနှင့်သုံးစွဲသင့်သည်။ ဥပမာ- နှလုံးလှုပ်ငန်းဆောင်တာချို့ယွင်းနေသူများနှင့် ကျောက်ကပ်လှုပ်ငန်းဆောင်တာချို့ယွင်းနေသူများ၊ ၂၀မီလီလီတာဆေးရည်တိုင်းတွင် ကယ်လ်စီယမ်ပမာဏ ၂၆၀မီလီဂရမ် (6.5 mmol) ပါဝင်သည်။ သွေးတွင်းကယ်လ်စီယမ်ပမာဏများသော၊ ကျောက်ကပ်တွင်ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်များစုဝေးနေသော၊ မကြာခဏတစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်သည့် ကျောက်ကပ်အတွင်းကယ်လ်စီယမ်ဆီးကျောက်ငယ်များ စုဝေးတည်နေသော လူနာများတွင် ဤဆေးကို သတိနှင့် သုံးစွဲသင့်ပါသည်။ အကယ်၍ (၇) ရက်ပြီးနောက် ယင်းလက္ခဏာများမသက်သာပါက လူနာ၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပြန်လည်စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။ ရေရှည်သုံးစွဲခြင်းကို ရှောင်သင့်ပါသည်။

ဆေးဓာတ်မတည့်ခြင်း/ ဓာတ်မတည့်တုန်ပြန်ခြင်း -

ဆေးဓာတ်မတည့်ခြင်း၊ အသက်ရှူလေပြန်ရုတ်တရက်ကျပ်ခြင်းကဲ့သို့သော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ

ဆေးမသုံးသင့်သည့်အခြေအနေများ - ဆိုဒီယမ် အယ်လ်ဂျိနိတ်၊ ဆိုဒီယမ် ဘိုင်ကာဗိုနိတ်၊ ကယ်လ်ဆီယမ် ကာဗိုနိတ် (သို့) ဆေးတွင်ပါဝင်သောပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ဆေးဓာတ်မတည့်ခြင်းရှိပါက အသုံးမပြုသင့်ပါ။

0275453

