



EYE GLO Relief Eye Drops



Relieves sore, swollen and watery eyes
Melegakan sakit, bengkak dan mata berair
缓解双眸疼痛及肿胀

Description: A sterile, buffered, clear solution. **Eye Glo Relief** is formulated to be used when your eyes are sore, swollen and watery eyes. The eye drops help to calm eyes that have become sore due to exposure to harsh conditions such as dust, strong wind, or when your eyes have been unprotected from chemicals like chlorine from swimming; or prolonged rubbing of the eyes.

Its active ingredient, Zinc Sulphate, has astringent properties which causes the blood vessels to constrict thereby reducing the redness and swelling of the eyes.

Eye Glo Relief is recommended for use only when requiring relief from sore, swollen and watery eyes. Users should consider the use of other products in the Eye Glo range for everyday use.

Directions
It is recommended that 1 to 2 drops of **Eye Glo Relief** is placed into the affected eye(s) up to 3 to 4 times a day. Once relief has been obtained, you may consider the use of other Eye Glo products for regular use. To avoid contamination of your bottle of **Eye Glo Relief** eye drops, do not touch the tip of the container to any surface.

Contraindications
Do not use if you are hypersensitive to any of the ingredients in **Eye Glo Relief**.

Warning
Benzalkonium Chloride is not suitable for use together with soft contact lenses.

Packing : 5ml, 10ml

Eye Glo Relief diformulasi khas untuk melegakan kebengkakan dan kesakitan mata. Ubat titis mata ini melegakan kesakitan mata yang diakibatkan oleh debu, angin kencang, atau semasa mata anda terdedah kepada bahan-bahan kimia, misalnya klorin dalam kolam renang; atau menggosok mata secara berpanjangan.

Zinc Sulphate, bahan aktifnya, mempunyai ciri astringen yang mengecutkan saluran darah dan seterusnya mengurangkan kemerahan dan kebengkakan mata.

Eye Glo Relief dicadangkan hanya untuk kegunaan semasa mata terasa sakit, bengkak atau berair. Pengguna harus memilih keluaran-keluaran lain dari rangkaian keluaran Eye Glo untuk kegunaan harian.

Cara penggunaan
1-2 titis **Eye Glo Relief** dititis pada setiap mata 3-4 kali sehari. Selepas mata berkenaan sembuh, pengguna patut memilih keluaran Eye Glo lain untuk kegunaan harian. Untuk mengelakkan pencemaran ubat titis mata **Eye Glo Relief**, jangan biarkan penitis botol menyentuh sebarang permukaan.

Kontraindikasi
Jangan gunakan **Eye Glo Relief** sekiranya anda sensitif terhadap sebarang bahan kandungan ubat titis ini.

Amaran
Benzalkonium Chloride tidak sesuai digunakan bersama kanta sentuh.

Pembungkusan : 5ml, 10ml

Eye Glo Relief 的特别配方可舒缓眼睛肿胀及疼痛。它适用于因眼睛长期暴露于尘埃、强风、化学物质（例如泳池中的氯）。长期拭擦双眼，或其他情况下导致的眼睛不适。

最主要成份，Zinc Sulphate，有良好的收敛作用。它能帮助血管收缩，进而减低眼睛肿胀。

Eye Glo Relief 只适用于眼睛肿胀疼痛的情况。若但每日使用呵护双眸的眼药水，请选择其他 **Eye Glo** 系列的产品每日呵护双眸。

剂量：
每日3至4次，1至2滴于肿胀不适的眼睛。当病情好转后，请选用其他 **Eye Glo** 系列的产品每日呵护双眸，为避免污染 **Eye Glo Relief**，请勿将容器尖端接触任何表面。

禁忌：
若对此产品中任何药物或化学品产生过敏反应者切勿使用。
此产品含氯化苯甲羟铵，不适合与软性隐形眼镜一同并用。

包装 : 5ml, 10ml

Formula/处方
Zinc Sulphate.....0.25% w/v
Preservative/Pengawet/防腐剂
Benzalkonium Chloride.....0.01% w/v

Shelf life/Temppoh hayat/有效期限
Please refer to box or label/Sila rujuk pada kotak atau label/请参阅产品包装盒或标签上。



EYE GLO The Facts





How to apply eye drops!
1. Ensure that your hands are clean.
2. Tilt head slightly back and, with the index finger, pull lower eyelid away from eye to form a pouch.
3. Drop the medicine into the pouch.
4. Gently and slowly close the eye, open and blink once (to mix the drop with your natural tears) and then close the eyes for 30 seconds.
5. Do remember to recap the container before putting it away.

Precautions
May cause transient mild stinging or temporary blurred vision. If you experience severe eye pain, changes in vision, continued redness or irritation of the eye, or if the symptoms worsen or persist, discontinue use and consult your medical practitioner. Do not use eye drops if the solution changes colour or becomes cloudy, or if particles are present. The product contains benzalkonium chloride and should not be used if soft contact lenses are being worn. Remove contact lenses prior to application and wait at least 15 minutes before reinserting. Benzalkonium chloride is known to discolour soft contact lenses.

Storage Conditions
• For external use only.
• Store in a dry place below 30°C.
• Protect from direct light.
• Keep out of reach of children
• DISCARD CONTENTS 4 WEEKS AFTER OPENING.

Cara penggunaan
1. Pastikan tangan anda bersih.
2. Dongakkan kepala, tarik kelopak bawah mata untuk membentuk satu penakung.
3. Titiskan ubat ke dalam penakung tersebut.
4. Tutup mata dengan perlahan, buka dan kelipkan mata sekali (untuk mencampurkan ubat titis mata dengan air mata anda), dan seterusnya tutup mata selama 30 saat.
5. Pastikan botol ditutup ketat sebelum disimpan.

Amaran
Mungkin menyebabkan ketidakselesaan ringan atau penglihatan kabur yang sementara. Sekiranya anda merasai kesakitan mata yang serius, perubahan penglihatan, kemerahan atau kerengsaan mata yang berterusan, atau bertambah serius, hentikan penggunaan ubat ini dan jumpa doktor anda. Jangan gunakan ubat ini sekiranya ia bertukar warna, menjadi keruh

atau terdapat sebarang partikel di dalamnya. Produk ini mengandungi Benzalkonium Chloride dan tidak boleh digunakan jika kanta sentuh lembut dipakai. Keluarkan kanta lekapan sebelum titiskan ubat titis mata dan tunggu sekurang-kurangnya 15 minit sebelum memakainya semula. Benzalkonium Chloride boleh melunturkan warna kanta lekapan lembut.

Cara penyimpanan
• Untuk kegunaan luar sahaja.
• Simpan di tempat kering di bawah 30°C.
• Lindungi dari cahaya.
• Jauhkan daripada kanak-kanak.
• BUANG UBAT TITIS MATA 4 MINGGU SELEPAS PEMBUKAAN BOTOL.

如何使用
1. 洗净双手。
2. 头稍往后倾，以食指轻轻将眼皮拉下形成一“小袋”。
3. 将眼药水滴于此“小袋”。
4. 慢慢合上眼睛，睁开，再眨动一下以便药水和眼泪溶合一起。再合上眼睛大约30秒钟。
5. 记得在收起容器之前，重新盖上盖子。

注意事项
可能会导致短暂轻微的刺痛或暂时的视力模糊。若使用此产品后眼睛感到疼痛，视线模糊，肿胀，眼睛不适或病情毫无好转迹象，请立即停止使用并请示您的医生。若眼药水出现变色，污浊或发现微粒，请立即停止使用。
该产品含有氯化苯甲羟铵，如果配戴软性隐形眼镜，则不应使用此产品。在使用前取下隐形眼镜，并等待至少15分钟后重新放入。氯化苯甲羟铵是会使软性隐形眼镜变色。

贮存
• 此药只可外敷。
• 贮存于低于30°C 远离光线直射。
• 贮存于孩童不可触及处。
• 开瓶后，任何眼药皆不可贮存超过4星期。

Product Registration Holder & Manufacturer:
DUOPHARMA (M) SDN. BHD.
Lot 2599, Jalan Sentulung 59,
Kawasan 3, Taman Klang Jaya, 41200 Klang,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Revision date: 06.09.2023

EYE GLO Relief, Size: 20.3cm x 11cm

Pantone 190 C

Black 100%

Pantone 185 C

0c 100m 100y 0k
PANTONE 2035 C0c 100m 100y 50k
PANTONE 7624 C