

XORLYX 10 Salicylic Acid 10% w/w Ointment

Description

XORLYX 10 is a Salicylic Acid ointment contains

- Salicylic acid 0.1 gram/ 1 gram (10% w/w)

Topical Salicylic Acid acts as keratolytic agent.

XORLYX 10 Salicylic Acid 10% w/w ointment is a white or almost white and translucent ointment.

Product Indication/Usage

For treatment of seborrheic dermatitis, scalp, psoriasis and hyperkeratotic skin disorders.

Recommended Dose/Use Instruction

Apply a thin layer of XORLYX 10 Salicylic Acid 10% w/w to the affected areas, once or twice daily (in the morning and at night) until improvement occur or as directed by physician.

Contraindication

- Allergic or hypersensitivity to Salicylic Acid or any other ingredient in its preparation.
- It should not be used by patients with diabetes or with impaired peripheral blood circulation.
- Do not use for children aged less than 2 years.

Warnings and Precautions

- Keep medicine out of reach of children.
- For external use only.
- This preparation is to be used on the skin only.
- Avoid using on open wound or area of broken, inflamed or normal skin, around wart and on large areas of skin.
- Avoid contact with eyes, face, genitals and mucous membranes.
- Salicylic acid is irritating and may cause dermatitis.
- If irritation or sensitisation develops, consult your doctor. Seek medical advice if symptoms get serious/severe or persistent.
- Do not use large amounts, apply this medication more often, or use it for a longer period than directed, if large area of skins are treated for a longer period than directed, the systemic absorption of XORLYX 10 Salicylic Acid 10% w/w Ointment will be enhanced and may lead to Salicylate toxicity.
- Do not share your medication with others.
- Be careful to apply it only to the affected area and not the surrounding skin.
- Consult your doctor before using this treatment on children aged 2 to 12 years.
- XORLYX 10 Salicylic Acid 10% w/w Ointment should be used cautiously in elderly.
- When using XORLYX 10 Salicylic Acid 10% w/w Ointment do not use any of the following preparations on the affected area, unless directed to do so by your doctor:
 - * Any other medicated topical agents, e.g. benzoyl peroxide, topical retinoids, salicylate and hydroquinone.
 - * Abrasive soaps and cleansers.
 - * Cosmetics/soaps that dry the skin or are designed to peel/exfoliate.
 - * Protein bound drugs.
 - * Alcohol containing preparation.

Usage During Pregnancy and Lactation

- Pregnancy Category C.
- XORLYX 10 Salicylic Acid 10% w/w Ointment should be used only if potential benefit outweighs the potential risk to the fetus. Topical salicylic acid should not be used extensively in large amount or for prolonged period in pregnant women.

- XORLYX 10 Salicylic Acid 10% w/w Ointment should be used cautiously in nursing mothers.

Interactions With Other Medications

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking/using or have recently taken/use any other medicine or preparation such as:

- Any other medicated topical agents, e.g. benzoyl peroxide, topical retinoids, salicylate and hydroquinone.
- Abrasive soaps and cleansers.
- Cosmetics or soaps that dry the skin or are designed to peel/exfoliate.
- Protein bound drugs.
- Alcohol containing preparation.

Side Effects and Adverse Effects/Undesirable Effects

Like all medicines, XORLYX 10 Salicylic Acid 10% w/w Ointment can cause unwanted side effects although not everyone gets them. Some possible effects are:

- Contact dermatitis or skin irritation; flushing, unusually warm skin, burning sensation; pruritus and stinging of skin.
- Excessive drying and peeling of skin.
- Extensive prolonged use of XORLYX 10 Salicylic Acid 10% w/w Ointment may enhance the systemic absorption and may lead to Salicylate toxicity.

Signs and Symptoms of Overdose and Treatment

Excessive prolonged use of XORLYX 10 Salicylic Acid 10% w/w Ointment may result in symptoms of Salicylism. If this occurs, symptomatic treatment should be initiated.

Storage Conditions

Keep the tube tightly closed.

Keep out of reach of children.

Store below 30°C.

Protect from heat, moisture and light.

Dosage Form

Ointment.

Packaging

Printed aluminium tube with standard white cap.

Available in 15 gram, 30 gram and 50 gram.

1 (one) tubes per unitcarton.

Shelf Life

36 months.

This insert contains basic prescribing information only. For further information, please consult your doctor or pharmacist.

Product Registration Holder & Manufacturer

Xorix Sdn Bhd
Lot 1, 2, 3 & 4,
Kawasan Industri Batu 7,
23000 Dungun,
Terengganu,
MALAYSIA.

XORLYX 10 Salap Asid Salisilik 10% w/w

Keterangan Produk

XORLYX 10 Salap Asid Salisilik 10% w/w mengandungi:

- Asid Salisilik 0.1 gram/ 1 gram (10% w/w)

Salap luaran Asid Salisilik bertindak sebagai agen keratolitik (keadaan kulit berkeruping).

XORLYX 10 Salap Asid Salisilik 10% w/w merupakan salap berwarna putih atau hampir putih dan lutsinar.

Indikasi/Kegunaan Produk

Bagi rawatan keratosis lenjer sebum, lenjer kulit kepala, psoriasis dan keadaan kulit hiperkeratosis.

Dos Yang Disarankan/Arahan Penggunaan

Sapukan XORLYX 10 dengan lapisan yang nipis pada bahagian kulit yang terjeris, satu atau dua kali sehari (pada waktu pagi dan malam) sehingga berlaku penyembuhan atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi.

KontraIndikasi (Keadaan Tidak Boleh Guna)

- Alahan kepada Asid Salisilik dan bahan sediaan ubat ini.
- Tidak boleh digunakan oleh pesakit kencing manis atau yang peredaran darah periferi terjeris.
- Tidak boleh digunakan bagi kanak-kanak berusia kurang dari 2 tahun.

Amaran dan Langkah Berjaga-jaga

- Jauhi ubat dari kanak-kanak.
- Untuk kegunaan luaran sahaja.
- Sediaan ini hanya untuk digunakan pada kulit sahaja.
- Hindari dari menggunakan pada luka yang terdedah atau kawasan kulit yang pecah, radang atau kulit biasa pada kawasan kulit yang luas.
- Hindari dari terkena mata, muka, kemaluan dan membran mukus.
- Asid Salisilik merengsakan dan boleh menyebabkan dermatitis/keradangan kulit.
- Jika kerengsaan atau keadaan menjadi sensitif, dapatkan nasihat doktor. Dapatkan nasihat perubahan sekiranya gejala/symptom menjadi serius/teruk atau berpanjangan.
- Jangan guna kuantiti yang besar, gunakan lebih kerap atau untuk tempoh yang panjang dari yang diarahkan. Jika kawasan kulit yang dirawat adalah besar dan dirawat untuk tempoh yang panjang, penyerapan sistemik XORLYX 10 akan dipertingkatkan dan boleh membawa kepada ketoksikan Salisilat.
- Jangan berkongsi ubat anda dengan orang lain.
- Hati-hati sapu hanya pada tempat terjeris dan bukannya kulit sekeliling.
- Dapatkan nasihat doktor sebelum menggunakan rawatan ini pada kanak-kanak berusia 2 hingga 12 tahun.
- Salap ini hendaklah digunakan dengan berhati-hati untuk warga tua. Apabila menggunakan salap ini, jangan gunakan mana-mana sediaan berikut pada kawasan terjeris, melainkan jika diarahkan berbuat demikian oleh doktor anda iaitu;
 - * Agen ubat topikal/sapu lain contohnya *benzoyl peroxide*, retinoid topikal/sapu, *salicylate* dan *hydroquinone*.
 - * Sabun dan pencuci yang merengsakan.
 - * Kosmetik atau sabun yang mengeringkan kulit atau direka untuk pengelupasan kulit.
 - * Ubat 'protein bound'.
 - * Sediaan ubat yang mengandungi alkohol.

Penggunaan Semasa Kehamilan dan Penyusuan

- Kehamilan Kategori C.
- XORLYX 10 perlu digunakan jika potensi kesannya jauh melebihi potensi risiko kepada janin/kandungan.

Salap ini tidak boleh digunakan secara intensif dalam jumlah besar atau bagi tempoh berpanjangan dalam kalangan wanita hamil.

- XORLYX 10 harus digunakan dengan berhati-hati bagi ibu-ibu yang menyusukan bayi.

Tindak Balas Ubat

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil/menggunakan atau baru sahaja mengambil/menggunakan sebarang ubat-ubatan seperti:

- * Agen ubat topikal/sapu lain contohnya *benzoyl peroxide*, retinoid topikal/sapu, *salicylate* dan *hydroquinone*.
- * Sabun dan pencuci yang merengsakan.
- * Kosmetik atau sabun yang mengeringkan kulit atau direka untuk pengelupasan kulit.
- * Ubat 'protein bound'.
- * Sediaan ubat yang mengandungi alkohol.

Kesan Sampingan/Kesan Yang Tidak Diingini

Seperti semua ubat-ubatan, XORLYX 10 boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan setiap orang mengalaminya. Antara kesan sampingan yang mungkin berlaku adalah:

- Dermatitis oleh sentuhan atau kerengsaan kulit; kulit kemerahan; kulit terasa lebih panas daripada biasa, rasa terbakar, gatal dan pedih.
- Peningkatan dan pengelupasan kulit yang berlebihan.
- Penggunaan salap yang berlebihan dan berpanjangan boleh meningkatkan penyerapan sistemik dan boleh membawa kepada ketoksikan Salicylate.

Tanda dan Gejala Dos/Sukatan Berlebihan dan Rawatannya

Penggunaan salap yang mengandungi Asid Salisilik secara berlebihan dan berpanjangan boleh mengakibatkan gejala/symptom Salicylism. Jika berlaku, rawatan gejala harus dimulakan.

Cara Menyimpan

Tutup tiub dengan kemas.
Jauhi ubat dari kanak-kanak.
Simpan bawah suhu 30°C.
Lindungi dari haba, lembapan dan cahaya.

Bentuk Dos

Salap.

Pembungkusan

Tiub aluminium bercetak beserta penutup berwarna putih.
Terdapat dalam 15 gram, 30 gram dan 50 gram.
1 (satu) tiub dalam satu unitkarton.

Hayat Simpanan

36 bulan.

Sisipian ini hanya mengandungi maklumat tatacara asas sahaja. Untuk maklumat lanjut sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Pemegang Pendaftaran Produk & Pengilang

Xorix Sdn Bhd
Lot 1,2,3 & 4,
Kawasan Industri Batu 7,
23000 Dungun,
Terengganu,
MALAYSIA.