

XORILYX 20 Salicylic Acid 20% w/w Ointment

Description

XORILYX 20 is a Salicylic Acid Ointment contains:

- Salicylic acid 0.2 g / 1 g (20% w/w)
- Xorilix 20 Salicylic Acid 20% w/w ointment is a white or almost white or translucent ointment. Works by softening keratin, a protein that forms part of the skin structure. This helps to loosen the skin cells to allow removal of warts.

Product Indication/Usage

XORILYX 20 Salicylic Acid 20% w/w Ointment is indicated for removal warts.

Recommended Dose/Use Instruction

Follow your doctor's instruction carefully. They may differ from the general instructions in this leaflet.

Before using XORILYX 20, moisten or soak the wart in warm water for about 5 minutes to help loosen and soften the treatment area. Dry thoroughly. After soaking/moisturising and before applying the treatment to the wart, use an emery board or pumice stone to carefully remove the top dead layers of skin on the affected area (avoid sharing this board/stone with others). This dead skin removal is to help the medication penetrate the skin more easily. Do not try to rub the wart off.

Protect surrounding healthy skin (for example with White Soft Paraffin or specially designed plaster). Apply a thin layer of XORILYX 20 to cover the entire warts. Be careful to apply it only to the affected area and not the surrounding skin.

The treatment may be used once or twice daily (in the morning and at night) or as directed by your doctor or pharmacist. Treatment should start as early as possible after the start of an infection. Subsequently, it may then be possible to maintain improvement by less frequent application. You need to apply the medication as instructed until the warts clear up, or for up to 12 weeks or as directed by your doctor or pharmacist. If the wart persists after 12 weeks, consult your doctor.

Contraindications

- Allergic or hypersensitivity to Salicylic Acid or any other ingredient in its preparation.
- It should not be used by patients with diabetes or with impaired peripheral blood circulation.
- Do not use on face or on moles, birthmarks, hairy warts or on genital/anal wart.
- Do not use for children aged less than 2 years.

Warnings and Precautions

- Keep medicine out of reach of children.
- For external use only.
- This preparation is to be used on the skin only.
- Avoid using on open wound or area of broken, inflamed or normal skin around wart and on large areas of skin.
- Avoid contact with eyes, face, genitals and mucous membranes.
- Salicylic acid is irritating and may cause dermatitis.
- If irritation or sensitisation develops, consult your doctor. Seek medical advice if symptoms get serious/severe or persistent.
- Do not use large amounts, apply this medication more often, or use it for a longer period than directed, if large areas of skin are treated for a longer period than directed, the systemic absorption of XORILYX 20 will be enhanced and may lead to Salicylate toxicity.
- Do not share your medication with others as warts can be contagious through skin contact.
- Be careful to apply it only to the affected area and not the surrounding skin.
- Consult your doctor before using this treatment on children aged 2 to 12 years.
- XORILYX 20 should be used cautiously in elderly.
- When using XORILYX 20 do not use any of the following preparations on the affected area, unless directed to do so by your doctor:

- * Any other medicated topical agents, e.g. benzoyl peroxide, topical retinoids salicylate and hydroquinone.
- * Abrasive soaps and cleansers.

- * Cosmetics/soaps that dry the skin or are designed to peel/exfoliate.
- * Protein bound drugs.
- * Alcohol containing preparation.

Usage During Pregnancy and Lactation

- Pregnancy Category C.
- XORILYX 20 should be used only if potential benefit outweighs the potential risk to the fetus. Topical salicylic acid should not be used extensively in large amount or for prolonged period in pregnant women.
- XORILYX 20 should be used cautiously in nursing mothers

Interactions With Other Medications

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking/using or have recently taken/used any other medicine or preparation such as:

- Any other medicated topical agents, e.g. benzoyl peroxide, topical retinoids, salicylate and hydroquinone.
- Abrasive soaps and cleansers.
- Cosmetics/soaps that dry the skin or are designed to peel/exfoliate.
- Protein bound drugs and alcohol containing preparation.

Side Effects and Adverse Effects/Undesirable Effects

Like all medicines, XORILYX 20 can cause unwanted side effects although not everyone gets them. Some possible effects are:

- Contact dermatitis or skin irritation; flushing, unusually warm skin, burning sensation; pruritus and stinging of skin.
- Excessive drying and peeling of skin.
- Extensive prolonged use of XORILYX 20 may enhance the systemic absorption and may lead to Salicylate toxicity.

Signs and Symptoms of Overdose and Treatment

Excessive prolonged use of XORILYX 20 may result in symptoms of Salicylism. If this occurs, symptomatic treatment should be initiated.

Storage Conditions

Keep the tube tightly closed. Keep out of reach of children. Store below 30°C. Protect from heat, moisture and light.

Dosage Form

Ointment.

Packaging

Printed aluminium tube with standard white cap. Available in 15 gram, 30 gram and 50 gram. Packed one tube per uniconart.

Shelf Life

36 months.

This insert contains basic prescribing information only. For further information, please consult your doctor or pharmacist.

Product Registration Holder & Manufacturer

Xorix Sdn Bhd
Lot 1, 2, 3 & 4,
Kawasan Industri Batu 7,
23000 Dungun,
Terengganu,
MALAYSIA.

XORLYX 20 Salicylic Acid 20% w/w Ointment

Keterangan

XORLYX 20 Salap Asid Salisilik 20% w/w mengandungi:

- Asid Salisilik 0.2 gram/ 1 gram (20% w/w)
- Xorlyx 20 merupakan salap berwarna putih atau hampir putih dan lutsinar. Bertindak dengan mengelompokkan keratin, iaitu satu protein yang membina sebahagian struktur kulit. Ini membantu melonggarkan sel kulit untuk pembuangan ketuat.

Indikasi/Kegunaan Produk

XORLYX 20 Salap Asid Salisilik 20% w/w digunakan bagi merawat dan menghilangkan ketuat.

Dos Yang Disarankan/Arahan Penggunaan

Ikuti arahan doktor anda. Arahan doktor mungkin berlainan daripada arahan di dalam sisipan ini.

Sebelum menggunakan XORLYX 20, basahkan atau rendam ketuat di dalam air suam selama kira-kira 5 minit untuk melonggarkan dan melembutkan kawasan rawatan. Keringkan dengan sempurna. Selepas rendaman/pembasahan dan sebelum menjalankan rawatan pada ketuat, gunakan papan emery atau batu pumis untuk menanggalkan bahagian atas kulit yang mati di kawasan terlibat (elakkan berkongsi papan/batu ini dengan orang lain). Penanggalan kulit mati ini adalah untuk membantu untuk menembusi kulit dengan lebih senang. Jangan cuba menggosok keluar ketuat tersebut.

Lindungi kawasan sekeliling (contohnya dengan Paraffin Lembut Putih) atau plaster yang direka khas. Sapu nipis salap ini dengan meliputi keseluruhan ketuat. Hati-hati untuk menggunakan hanya pada tempat berkenaan sahaja dan bukan kulit sekelilingnya.

Rawatan boleh digunakan sekali atau dua kali sehari (pada waktu pagi dan malam) atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Rawatan hendaklah dimulakan seawal yang mungkin selepas mulanyaangkitan. Kemudian, ia boleh terus kekalkan penyembuhan dengan mengurangkan kekerapan penggunaan. Anda hendaklah menggunakan ubat seperti yang diarahkan sehingga ketuat hilang, atau sehingga 12 minggu atau seperti yang diarahkan doktor atau ahli farmasi anda. Sekiranya ketuat masih kekal selepas 12 minggu, dapatkan nasihat doktor anda.

Kontraindikasi

- Alahan kepada Asid Salisilik dan bahan sedia ada ubat ini.
- Tidak boleh digunakan oleh pesakit kencing manis atau keadaan peredaran darah periferi terjejas.
- Tidak boleh digunakan pada muka atau tahi lalat, tanda lahir, ketuat yang berbulu dan ketuat pada kemaluan/dubur.
- Tidak boleh digunakan bagi kanak-kanak berusia kurang dari 2 tahun.

Amaran dan Langkah Berjaga-Jaga

- Jauhi ubat dari kanak-kanak.
- Untuk kegunaan luaran sahaja.
- Sediaan ini hanya untuk digunakan pada kulit sahaja.
- Hindari dari menggunakan pada luka yang terdedah atau kawasan kulit yang pecah, radang atau kulit biasa di sekeliling ketuat dan pada kawasan kulit yang luas.
- Hindari dari terkena mata, muka, kemaluan dan membran mukus.
- Asid Salisilik merangsakan dan boleh menyebabkan dermatitis/radang kulit.
- Jika kerengsaan atau keadaan menjadi sensitif, dapatkan nasihat doktor anda. Dapatkan nasihat perubatan sekiranya gejala/symptom menjadi serius/teruk dan berpanjangan.
- Jangan gunakan kuantiti yang besar, gunakan lebih kerap atau untuk tempoh yang lebih panjang dari yang diarahkan. Jika kawasan kulit yang dirawat adalah besar dan untuk tempoh panjang, penyerapan sistemik salap ini akan dipertingkatkan dan boleh membawa kepada ketoksikan Salisilat.
- Jangan berkongsi ubat anda dengan orang lain kerana ketuat boleh berjangkit melalui sentuhan.
- Hati-hati untuk menyimpannya hanya pada tempat yang terjejas dan bukannya

- pada kulit sekeliling.
- Dapatkan nasihat doktor sebelum menggunakan rawatan ini pada kanak-kanak berusia 2 hingga 12 tahun.
- XORLYX 20 hendaklah digunakan dengan berhati-hati untuk warga tua.
- Apabila menggunakan XORLYX 20, jangan gunakan mana-mana sediaan berikut pada kawasan terjejas, melainkan jika diarahkan berbuat demikian oleh doktor anda iaitu;
- * Agen ubat topikal/sapu lain contohnya *Benzoyl Peroxide*, retinoid topikal /sapu, *salicylate* atau *Hydroquinone*.
- * Sabun dan pencuci yang merengsakan.
- * Kosmetik/sabun yang mengeringkan atau direka untuk penggelupasan kulit.
- * Ubat "protein bound" dan sediaan ubat yang mengandungi alkohol.

Penggunaan Semasa Kehamilan dan Penyusuan

- Kehamilan Kategori C.
- XORLYX 20 perlu digunakan jika potensi kesannya melebihi potensi risiko pada janin/kandungan. Salap ini tidak boleh digunakan secara intensif dalam jumlah besar atau bagi tempoh lama bagi wanita hamil.
- XORLYX 20 harus digunakan dengan berhati-hati bagi ibu-ibu yang menyusukan bayi.

Tindak Balas Ubat

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil/menggunakan atau baru sahaja mengambil/menggunakan sebarang ubat-ubatan seperti:

- * Agen ubat topikal/sapu lain contohnya *Benzoyl Peroxide*, retinoid topikal /sapu, *salicylate* atau *Hydroquinone*.
- * Sabun dan pencuci yang merengsakan.
- * Kosmetik/sabun yang mengeringkan atau direka untuk penggelupasan kulit.
- * Ubat "protein bound".
- * Sediaan ubat yang mengandungi alkohol.

Kesan Sampingan/Kesan Yang Tidak Diingini

Sebagai semua ubat-ubatan, XORLYX 20 Salap Asid Salisilik 20% w/w boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun pada setiap orang mengalaminya. Antara kesan sampingan yang mungkin berlaku adalah:

- Dermatitis oleh sentuhan atau kerengsaan kulit; kulit kemerahan-merahan; kulit terasa panas, rasa terbakar, gatal dan pedih.
- Pengerangan dan penggelupasan kulit yang berlembih.
- Penggunaan salap yang berlembih dan berpanjangan boleh meningkatkan penyerapan sistemik dan boleh membawa ketoksikan Salicylate.

Tanda dan Gejala Dos/Sukatan Berlembih dan Rawatannya

Penggunaan salap yang mengandungi Asid Salisilik secara berlembih dan berpanjangan boleh mengakibatkan gejala/symptom Salicylism. Jika berlaku, rawatan gejala/symptom harus dimulakan.

Cara Menyimpan

Tutupi tiub dengan kemas. Jauhi ubat dari kanak-kanak. Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi dari haba, lembapan dan cahaya.

Pembungkusan

Tiub aluminium bercetak beserta penutup berwarna putih. Terdapat dalam 15 gram, 30 gram dan 50 gram. Satu tiub di dalam satu unit karton.

Sisipan ini hanya mengandungi maklumat tatacara asas sahaja. Untuk maklumat lanjut sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Pemegang Pendaftaran Produk & Pengilang

Xorix Sdn Bhd
Lot 1,2,3 & 4,
Kawasan Industri Batu 7,
23000 Dungun,
Terengganu,
MALAYSIA.

Bentuk Dos

Salap.

Hayat Simpanan

36 bulan.