

鸡眼水 Lion Ball Corn Remover Solution 20% w/v

Composition : Salicylic Acid 20 %w/v

Dosage Form: Solution

Description: Clear colourless liquid with characteristic odor.

Pharmacodynamics:

Pharmacotherapeutic group: Wart and anticorn preparations.

ATC code: D11AF

Salicylic acid is keratolytic, producing desquamation by solubilising the intercellular cement in the stratum corneum resulting in the shedding of skin scales.

Pharmacokinetics:

Absorption

Salicylic acid is absorbed through the skin; where detectable, maximum plasma levels are found 6 to 12 hours after application. Systemic absorption of salicylic acid has been reported to range from 9% to 25% after topical application of other salicylic acid-containing preparations. The extent of absorption is variable depending on the duration of contact and the vehicle. Despite percutaneous absorption, the systemic exposure is low given the low dose topically administered to small, localised areas of hyperkeratotic tissue.

Distribution

Following percutaneous absorption, salicylic acid is distributed in the extracellular space; approximately half of which is protein bound to albumin.

Metabolism

Salicylates are metabolised in the liver by microsomal enzymes to salicyluric acid and phenolic glucuronides of salicylic acid. That which is not metabolized is excreted in the urine as unchanged salicylic acid.

Elimination

Within 24 hours of salicylic acid being absorbed and distributed in the intercellular space, approximately 95% of the absorbed dose can be recovered in the urine.

Indication: For the treatment of corns, warts and callouses.

Use Instruction:

Soak the affected area in warm water for 5 minutes. Dry thoroughly with a clean towel. The surface of the affected area should be rubbed with a brush, with care taken not to cause bleeding. Apply the solution to the affected area using cotton bud, twice daily. Care should be taken to avoid the surrounding healthy skin. The affected area should cover with a plaster (dressing) to help the penetration of ingredients.

Clinically visible improvement should occur in 1-2 weeks, but the maximum effect may be expected after 4-8 weeks. If wart persists beyond 12 weeks of treatment, the patient should be advised to consult their pharmacist or doctor.

Not recommended for use in infants under the age of 2 years. Children under 12 years should be treated under supervision.

Route of Administration: Topical application

Contraindication: Hypersensitivity to salicylic acid or to any of the excipients. Do not use on open wounds, irritated or reddened skin, or any area that is infected. Do not use on the face, anogenital regions, moles, birthmarks, mucous membranes, warts with hair growth. Do not be used by diabetics or patients with impaired blood circulation.

Warning & Precautions: Avoid contact with eyes and other mucous membranes. If contact occurs, flush with water for 15 minutes. Avoid contact with normal skin around affected areas. Avoid using on areas of broken or damaged skin. Discontinue treatment if excessive irritation occurs. Excessive prolonged use of topical salicylic acid may result in symptoms of salicylism and must therefore be avoided.

Drug Interaction: Topical Salicylic Acid may increase the absorption of other topically applied medicines. Concomitant use of Corn Remover Solution and other topical medicines on the treated area should be avoided.

Pregnancy and Lactation: The safe use of Corn Remover Solution during pregnancy and breastfeeding has not been established. Therefore this product should be used with caution or following the advice of your doctor.

Side Effects: Skin irritation and salicylism may occur.

Symptoms & Treatment of Overdose: Symptoms of salicylate poisoning or salicylism may increase if Corn Remover Solution is used excessively or if it is used for prolonged periods of time.

Storage Condition: Store below 30°C. Protect from light and moisture. Keep out of reach of children.

Shelf Life: Please refer to the packaging. Do not use beyond the expiry date.

For external use only. Keep away from fire or flame.

Untuk kegunaan luar sahaja. Jauhkan daripada api atau nyalaan.

仅供外用。远离火源或火焰。

鸡眼水 Lion Ball Corn Remover Solution 20% w/v

Komposisi: Asid Salisilik 20 %w/v

Bentuk dosej: Cecair

Deskript: Cecair yang jelas, tidak berwarna dan mempunyai bau tersendiri.

Farmakodinamik: Sila rujuk kepada penerangan Bahasa Inggeris.

Farmakokinetik: Sila rujuk kepada penerangan Bahasa Inggeris.

Indikasi: Untuk rawatan kutil, ketuat dan callus.

Arahan Penggunaan: Rendamkan kawasan yang dijangkiti dalam air suam selama 5 minit. Keringkan dengan menggunakan tuala yang bersih.

Permukaan kawasan yang dijangkiti perlu disapu dengan berus, berhati-hati untuk mengelakkan pendarahan. Sapu di kawasan yang dijangkiti dengan menggunakan putik kapas, 2 kali sehari. Jangan sapu di kulit sekitar yang sihat. Kawasan yang dijangkiti perlu ditutup dengan plaster untuk membantu penembusan bahan-bahan. Klinikal pembaikan dapat dilihat dalam 1-2 minggu, tetapi kesan maksimum boleh dijangkakan selepas 4-8 minggu. Jika kawasan yang dijangkiti berterusan melebihi 12 minggu, pesakit adalah dinasihatkan merujuk kepada ahli farmasi atau doktor. Tidak sesuai digunakan oleh bayi di bawah umur 2 tahun. Perhatian haruslah diberikan kepada kanak-kanak bawah 12 tahun semasa penggunaan.

Cara Penggunaan: Topikal

Kontraindikasi: Hipersensitif kepada asid salisilik atau bahan yang lain. Elakkan daripada terkena kulit yang terbuka, gatal, merah, atau mana-mana kawasan yang dijangkiti. Produk ini tidak sesuai digunakan di muka, kawasan anogenital, tahi lalat, tanda lahir, membran mukus dan ketuat dengan pertumbuhan rambut. Produk ini tidak sesuai digunakan oleh pesakit kencing manis atau pesakit dengan peredaran darah terjejas.

Amaran dan Perhatian: Elakkan daripada terkena dengan mata dan membran mukus yang lain. Jika terkena, cucikan dengan air selama 15 minit.

Elakkan daripada terkena kulit biasa yang di sekitar kawasan yang dijangkiti atau kulit yang rosak. Sila berhenti guna jika iritasi kulit berlaku. Haruslah dielakkan penggunaan asid salisilik yang berlebihan supaya simptom salicylism tidak berlaku.

Interaksi dengan ubat lain: Penggunaan asid salisilik boleh meningkatkan penyerapan ubat-ubatan lain. Produk ini tidak boleh digunakan bersama dengan ubat-ubatan lain pada bahagian yang dijangkiti.

Kehamilan dan Penyusuan: Keselamatan penggunaan oleh wanita hamil dan ibu yang menyusukan anak tidak dapat dipastikan. Oleh itu produk ini harus digunakan dengan berhati-hati atau atas nasihat doktor anda.

Kesan Sampingan: Iritasi kulit dan salicylism mungkin berlaku.

Simptom & Rawatan Overdos: Simptom keracunan salisilat atau salicylism mungkin meningkat jika produk ini digunakan secara berlebihan atau jika ia digunakan untuk tempoh yang lama.

Keadaan Penyimpanan: Simpan di bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya dan kelembapan. Jauhkan daripada kanak-kanak.

Tempoh Hayat: Sila rujuk kepada bungkusan. Jangan guna selepas tamat tarikh luput.

成份: 水杨酸 20%w/v

剂型: 液体

外观: 透明液体, 带有独特气味。

药效: 请参阅英文版本

药代代谢: 请参阅英文版本

主治: 用于治疗鸡眼, 疣和茧。

使用说明: 患处在水中浸泡约 5 分钟, 用干净的毛巾拭干和刷子磨擦患处表面, 请小心使用避免引起出血。用棉花棒将药水涂抹在患处, 一天 2 次。请避免触及周围健康的皮肤。使用胶布将患处覆盖, 以帮助成份的渗透。[临床经验在 1-2 星期的时间里, 患处将有明显改善。最佳效果预期需要 4-8 星期的时间。若患处持续超过 12 星期的治疗, 建议患者咨询药剂师或医生。不建议 2 岁以下的婴幼儿使用。12 岁以下儿童应在指导下治疗。

使用方法: 局部外用。

禁忌: 对水杨酸和其他成分过敏者。此药不宜在伤口, 过敏, 发红的皮肤或任何受感染的地方使用。此药不宜在脸上, 肛门生殖器官周围, 痣, 胎记, 粘膜或有毛发生长的疣的地方使用。糖尿病或血液循环不良的患者不宜使用。

警告与注意事项: 避免接触眼睛和其他黏膜。如果触及, 用清水冲洗 15 分钟。避免触及患处周围正常及受伤的皮。若用后出现皮肤敏感, 请立即停用。此药若使用过度或使用过长时间会导致出现水杨酸反应(Salicylism)的症状。

与其它药物的相互作用: 水杨酸的使用可能增加对其他药物的吸收。同个区域应避免同时使用此药及其它外敷的药物。

妊娠和哺乳: 妊娠和哺乳妇女使用的安全性尚未确定。因此, 请慎用此药水或寻求医生的意见。

副作用: 可能会出现皮肤敏感或水杨酸反应。

过量症状及医治: 此药若使用过度或使用过长时间, 可能会提高水杨酸中毒或出现水杨酸反应的症状。

贮存: 储存低于 30° C。避免阳光直射和潮湿。远离儿童。

有效期: 请参阅盒子。不要使用超出有效日期。

The information contained in this leaflet is limited. For further information, please consult your pharmacist or doctor.

Maklumat dalam risalah ini adalah terhad. Untuk informasi selanjut, sila jumpa ahli farmasi atau doktor.

此说明书仅属略述, 欲知更详细资料, 可询问您的药剂师或医生。

Manufactured by:

SYARIKAT WEN KEN DRUG SDN BHD

No. 24, Jalan Lambak, Taman Johor, 81200 Johor Bahru, Johor.

Manufactured for Product Registration Holder:

GAB SDN BHD (Co. No.86319A)

No. 24, Jalan BPU 4, Bandar Puchong Utama, 47100 Puchong, Selangor.

Date of revision : 05.06.2015

Packing 包装: 5ml, 10ml, 15ml