



● SWKD

○ WKMS

○ WKMM

○ HU

○ HU (KK)

File Name :Septic-Kare-Leaflet

Received : 13.07.2018

Amended : 06.01.2020

Output : 01.10.2024

Request : Shuying

Designer :

Opened : 100w x 160h MM

Closed : 100w x 40h MM

Finished: -

Colour : 1Cx1C

K



THREE LEGS SEPTYC-KARE  
ANTISEPTIC SPRAY 1%w/v

COMPOSITION:  
Chlorhexidine Gluconate 1%w/v

PRODUCT DESCRIPTION:  
Clear colourless to slight yellowish and odourless solution.

INDICATION:  
As an antiseptic for treatment of skin lesions, cuts, abrasions, infected wounds and burns.

DIRECTION OF USE:  
Clean and dry the affected area. Then spray the solution 3 times a day.

ROUTE OF ADMINISTRATION: Topical

CONTRAINDICATIONS:  
Risk-benefit should be considered when hypersensitivity to Chlorhexidine exist.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:  
Three Legs Septyc-Kare Antiseptic Spray 1%w/v contains chlorhexidine. Chlorhexidine is known to induce hypersensitivity, including generalized allergic reactions and anaphylactic shock. The prevalence of chlorhexidine hypersensitivity is unknown, but available literature suggests this is likely to be very rare. Three Legs Septyc-Kare Antiseptic Spray 1%w/v should not be administered to anyone with a possible history of an allergic reaction to chlorhexidine.

If any signs or symptoms of a suspected hypersensitivity reaction such as itching, skin rash, redness, swelling, breathing difficulties, light headedness and rapid heart rate develop, immediately stop using the product. Appropriate therapeutic countermeasures must be instituted as clinically indicated.

For external use only.

If symptoms persist, please consult doctor.

PHARMACODYNAMICS:  
Chlorhexidine is effective against a wide range of Gram negative and Gram positive vegetative bacteria, yeasts, dermatophyte fungi and lipophilic viruses. It is inactive against bacterial spores except at elevated temperatures.

PHARMACOKINETICS:  
Chlorhexidine is cationic nature, it binds strongly to skin mucosa and other tissues and is thus very poorly absorbed. There are, as a consequence, no general pharmacological studies on chlorhexidine available and its effects on internal organs are minimal. No detectable blood levels have been found in man following oral use and percutaneous absorption, if it occurs at all, is insignificant.

EFFECTS ON ABILITY TO DRIVE AND USE MACHINES: Not known

SEMBURAN ANTISEPTIK 1%w/v  
SEPTYC-KARE CAP KAKI TIGA

KOMPOSISI:  
Chlorhexidine Gluconate 1%w/v

DESKRIPSI:  
Larutan tanpa berwarna atau sedikit kekuningan, dan tidak berbau.

INDIKASI:  
Sebagai antiseptik bagi kecederaan kulit seperti luka, melecet, luka yang terinfeksi dan luka akibat terbakar.

CARA PENGGUNAAN:  
Bersihkan dan keringkan bahagian yang terjejas. Kemudian semburkan ubat ini 3 kali sehari.

CARA PENGAMBILAN: Topikal

KONTRAINDIKASI:  
Risiko-manafaat wajar dipertimbangkan jika wujud alahan terhadap Chlorhexidine.

AMARAN DAN PERHATIAN:  
Semburan Antiseptik 1%w/v Septyc-Kare Cap Kaki Tiga mengandungi chlorhexidine.

Chlorhexidine diketahui akan menyebabkan hipersensitiviti, termasuk tindak balas terhadap alahan umum dan kejutan anafilaksis. Penyebaran hipersensitiviti chlorhexidine tidak diketahui, tetapi maklumat yang tersedia menunjukkan bahawa ianya sangat jarang berlaku. Semburan Antiseptik 1%w/v Septyc-Kare Cap Kaki Tiga tidak boleh diberikan kepada individu yang pernah mempunyai masalah alahan terhadap chlorhexidine.

Sekiranya ada simptom atau gejala tindak balas hipersensitiviti yang disyaki seperti gatal, ruam kulit, kulit kemerahan, bengkak, sukar bernafas, kepala berpinar dan kadar degupan jantung yang pesat, hentikan penggunaan produk dengan segera. Pengawasan terapeutik yang sesuai harus dimulakan secara klinikal.

Untuk kegunaan luar sahaja. Sekiranya gejala berterusan, sila jumpa doktor.

FARMAKODINAMIK:  
Chlorhexidine berkesan membasmikan pelbagai bakteria gram- negatif dan gram- positif, ragi, kulat dermatofit dan virus lipofilik. Ia tidak aktif terhadap spora bakteria kecuali pada suhu tinggi.

FARMAKOKINETIK:  
Chlorhexidine bersifat kationik, ia bergabung kuat dengan mukosa kulit dan tisu lain menjadikan ianya sukar diserap. Sebab itu, tiada kajian farmakologi secara khusus mengenai chlorhexidine dan

三脚标SEPTYC-KARE  
消毒喷剂 1%w/v

成份:  
葡萄糖酸洗必太  
(Chlorhexidine Gluconate) 1%w/v

外观:  
无色至微黄色的无味溶液。

主治:  
作为消毒剂, 治疗皮肤损伤、割伤、擦伤、伤口感染和烧伤。

用法:  
洗净及擦干患处后, 喷上此药水, 每日三次。

给药途径: 外用

禁忌:  
当已知对Chlorhexidine 过敏时, 应考虑其风险/益处。

警告和注意:  
三脚标Septyc-Kare消毒喷剂1%w/v 含有氯己定。已知氯己定会造成的过敏症包括全身性过敏反应和过敏性休克。氯己定过敏患病率尚不清楚, 但现有文献表示这很罕见。任何有可能会对氯己定有过敏反应的人都不应使用三脚标Septyc-Kare消毒喷剂1%w/v。

如果发现任何怀疑有过敏反应的迹象或症状, 例如瘙痒、皮疹、发红、肿胀、呼吸困难、头晕和心跳加快, 请立即停止使用此产品。必须根据临床症状采取适当的治疗对策。

仅限于外用。

如果症状持续, 请咨询医生。

药效学:  
氯己定有效对付对多种革兰氏阴性和革兰氏阳性细菌, 酵母菌, 皮肤真菌和亲脂性病毒。除了在高温下, 它对细菌孢子没有效。

药代动力学:  
氯己定具有阳离子性质, 它可与皮肤粘膜和其他组织强力结合, 所以难以被吸收。因此, 目前尚无关于氯己定的常规药理的研究, 它对内脏器官的影响甚微。经口服后或经皮吸收后, 未能从血液水平里检测到, 如果发生, 也是无关紧要。



THREE LEGS SEPTYC-KARE  
ANTISEPTIC SPRAY 1%w/v

INTERACTIONS WITH OTHER MEDICAMENTS:  
The cationic nature of the compound results in activity being reduced by soap and anionic compounds as they can form insoluble salts. Anions to be wary of include borates, bicarbonates, carbonates, chlorides, citrates, nitrates, phosphates and sulphates with due attention being paid to the presence of hard water.

STATEMENT ON USAGE DURING PREGNANCY AND LACTATION:  
No special precautions need to be taken when used in pregnancy and lactation.

ADVERSE EFFECTS/ UNDESIRABLE EFFECTS:  
Immune system disorders

Frequency not known: Hypersensitivity including anaphylactic shock

SYMPTOMS AND TREATMENT OF OVERDOSE:  
Chlorhexidine Gluconate taken orally is poorly absorbed into the blood. Accidental ingestion may require gastric lavage using milk, egg white, gelatin or mild soap. Employ supportive measures as appropriate. Haemolysis has been reported following ingestion or accidental intravenous administration. Haemolysis may necessitate blood transfusion.

STORAGE CONDITIONS:  
Store below 30°C. Protect from light. Keep out of reach of children.

SHELF LIFE: 3 years

DOSAGE FORM: Spray

PACKING SIZE: 30ml, 60ml

The information contained in this leaflet is limited. For further information, please consult your pharmacist or doctor.

SEMBURAN ANTISEPTIK 1%w/v  
SEPTYC-KARE CAP KAKI TIGA

kesannya terhadap organ dalaman adalah minimum. Tiada paras darah yang dapat dikesan pada manusia melalui penggunaan oral dan penyerapan perkutan, jika berlaku, ia adalah tidak ketara.

KESAN KE ATAS KEUPAYAAN MEMANDU DAN PENGGUNAAN MESIN:  
Tidak diketahui

INTERAKSI DENGAN UBAT LAIN:  
Sifat kationik kompaun yang dihasil semasa aktiviti dapat dikurangkan dengan sabun dan sebatian anionik kerana ia boleh membentuk garam yang tidak larut. Anions perlu berwaspada termasuk borat, bikarbonat, karbonat, klorida, citrates, nitrat, fosfat dan sulfat dengan memberikan pemerhatian yang teliti terhadap kehadiran air mentah.

KEHAMILAN DAN PENYUSUAN:  
Tiada langkah keselamatan yang khusus perlu diambil untuk penggunaan semasa kehamilan dan penyusuan.

KESAN SAMPINGAN:  
Gangguan sistem imun

Kekerapan tidak diketahui: Hipersensitiviti termasuk kejutan anafilaksis

SIMPTOM DAN RAWATAN UNTUK KELEBIHAN DOS:  
Chlorhexidine Gluconate yang diambil secara oral adalah kurang diserap ke dalam darah. Pengambilan secara tidak sengaja mungkin memerlukan lavage gastrik menggunakan susu, putih telur, gelatin atau sabun lembut. Ambil langkah-langkah sokongan yang bersesuaian. Hemolisis telah dilaporkan selepas pengingesan atau pengambilan intravena secara tidak sengaja. Hemolisis mungkin memerlukan pemindahan darah.

KEADAAN PENYIMPANAN:  
Simpan di bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.

TEMPOH HAYAT: 3 tahun

DOS: Semburan

SAIZ Bungkusan: 30ml, 60ml

Maklumat terkandung di dalam risalah ini adalah terhad. Untuk maklumat yang terperinci, sila hubungi ahli farmasi atau doktor.

三脚标SEPTYC-KARE  
消毒喷剂 1%w/v

对驱动和使用机器的能力的影响:  
未知

药物相互作用:  
因为可形成不溶性盐, 所以肥皂和阴离子化合物可降低该化合物所造成的阳离子性质。需警惕的阴离子包括硼酸盐, 碳酸氢盐, 碳酸盐, 氯离子, 柠檬酸盐, 硝酸盐, 磷酸盐和硫酸盐, 并要注意硬水的存在。

怀孕和哺乳:  
当怀孕和哺乳期使用时, 无需采取特殊预防措施。

副作用:  
免疫系统疾病

频率未知: 过敏反应包括过敏性休克

药物过量症状及治疗:  
口服的氯己定难以吸收至血液中。误食可能需用牛奶、蛋清、明胶或温和的肥皂洗胃。采取适当的措施。因摄入或意外静脉注射后发生的溶血曾被报道。溶血可能需要输血。

贮存:  
储藏低于30°C。避免阳光直射处。远离儿童。

有效期: 3年

剂型: 喷剂

包装: 30毫升, 60毫升

此说明书仅属略述。欲知更详细资, 可咨询您的药剂师或医生。