

Xycide C (Chlorhexidine Gluconate 0.5% w/v and Isopropyl Alcohol 77% w/v Hand Sanitizer)

Description

Xycide C is a light pink solution, slight alcohol and lavender odour containing:

- Chlorhexidine Gluconate 0.5% w/v
- Isopropyl alcohol 77% w/v

Pharmacodynamic

Bisbiguanide antiseptics exert their lethal effect upon bacterial cells through non-specific interaction with acidic phospholipids of the cell membranes. Since there is little percutaneous absorption of isopropyl alcohol or chlorhexidine gluconate, pharmacodynamic studies have not been undertaken.

Pharmacokinetic

There is little absorption of isopropyl alcohol or chlorhexidine gluconate through intact skin. Pharmacokinetic studies have not been conducted with the product.

Indications

Non-rinse hand sanitizer for hand hygiene when soap and water not available.

Dose/Use Instruction

Apply 3-5 ml (1 pump) onto hand and rub until dry. After 10 applications, it is advisable to wash hands with soap and water.

Mode of Administration

Topical

Contraindications

Known hypersensitivity to Xycide C or any of its components, especially in those with a history of possible chlorhexidine-related allergic reactions.

Warnings and Precautions

For external use only

Flammable: keep away from fire or flame.

Keep out of eyes, ears, and mouth. If contact occurs in any of these areas, rinse with cold water right away, consult your physician immediately.

Keep medicine out of reach of child.

Xycide C contains chlorhexidine. Chlorhexidine is known to induce hypersensitivity, including generalised allergic reactions and anaphylactic shock. The prevalence of chlorhexidine hypersensitivity is unknown, but available literature suggests this is likely to be very rare. Xycide C should not be administered to anyone with a possible history of an allergic reaction to chlorhexidine.

If any signs or symptoms of a suspected hypersensitivity reaction such as itching, skin rash, redness, swelling, breathing difficulties, light headedness, and rapid heart rate develop, immediately stop using the product. Appropriate therapeutic countermeasures must be instituted as clinically indicated.

Interactions With Other Medications

Chlorhexidine salts are incompatible with soaps and other anionic material. Activity may be reduced in the presence of suspending agents such as alginates and tragacanth, insoluble powders such as kaolin, and insoluble compounds of calcium, magnesium and zinc. Isopropyl alcohol should not be brought into contact with some vaccines and skin test injections (patch test). If in doubt, consult the vaccines

manufacturers literature. Isopropyl alcohol also is known to be incompatible with the oxidizing agents such as hydrogen peroxide and nitric acid, which may cause decomposition.

Usage During Pregnancy And Lactation

No special precautions need to be taken when used in pregnancy and lactation.

Side Effects / Adverse Reactions

Immune system disorder

Frequency not known: Hypersensitivity including anaphylactic shock.

Overdose and Treatment

There are no reports of this occurring and the nature of the product makes it unlikely. Chlorhexidine gluconate taken orally is poorly absorbed into the blood. Accidental ingestion may require appropriate gastric lavage using milk, egg white, gelatine or mild soap.

Storage Conditions

Store below 30°C, protect from heat, flames and sunlight.

Dosage Forms

Solution.

Packaging

500 ml HDPE bottle with HDPE pump dispenser.

Shelf Life

24 months.

Manufacturer & Product Registration Holder

Xorix Sdn. Bhd,
Lot 1, 2, 3 & 4,
Kawasan Industri Batu 7,
23000 Dungun,
Terengganu, MALAYSIA.

Xycide C (Chlorhexidine Gluconate 0.5% w/v and Isopropyl Alcohol 77% w/v Hand Sanitizer)

Keterangan

Xycide C adalah larutan merah jambu muda, berbau alkohol dan lavender yang mengandungi:

- Chlorhexidine Gluconat 0.5% w/v
- Isopropil alkohol 77% w/v

Pharmakodinamik

Antiseptik bisbiguanide memberikan kesan berbahaya pada sel bakteria melalui interaksi tidak spesifik dengan fosfolipid berasid membran sel. Memandangkan terdapat sedikit penyerapan perkutaneus bagi isopropil alkohol atau chlorhexidine gluconate, kajian farmakodinamik belum dijalankan.

Pharmakokinetik

Terdapat sedikit penyerapan isopropil alkohol dan chlorhexidine gluconate melalui kulit. Kajian farmakokinetik tidak dijalankan untuk produk ini.

Indikasi

Pensanitasi tangan tanpa bilas untuk kebersihan tangan apabila sabun dan air tidak tersedia.

Dos Dan Cara Guna

Ratakan 3ml – 5ml (1 pam) pada tangan, gosok sehingga kering. Selepas 10 kali digunakan, adalah dinasihatkan untuk membasuh tangan dengan air dan sabun.

Cara Penggunaan

Topikal.

Kontraindikasi (Keadaan Tidak Boleh Guna)

Hipersensitiviti yang diketahui terhadap Xycide C atau mana-mana komponennya, terutamanya pada mereka yang mempunyai sejarah kemungkinan tindak balas alahan berkaitan chlorhexidine.

Amaran dan Langkah Berjaga-jaga

Untuk kegunaan luar sahaja.

Mudah terbakar: jauhi daripada api.

Jauhi daripada terkena mata, telinga dan mulut. Jika terkena, bilas dengan air sejuk dan jumpa doktor secepat mungkin.

Jauhi daripada kanak-kanak.

Xycide C mengandungi chlorhexidine. Chlorhexidine diketahui menyebabkan hipersensitiviti, termasuk tindak balas alahan umum dan kejutan anaphylactic. Kelaziman hipersensitiviti chlorhexidine tidak diketahui, tetapi literatur yang ada mencadangkan ini mungkin sangat jarang berlaku. Xycide C tidak boleh diberikan kepada sesiapa yang mempunyai sejarah kemungkinan tindak balas alahan terhadap chlorhexidine.

Jika sebarang tanda atau simptom tindak balas hipersensitiviti yang disyaki seperti gatal-gatal, ruam kulit, kemerahan, bengkak, kesukaran bernafas, pening kepala dan degupan jantung yang cepat berkembang, segera hentikan penggunaan produk. Tindakan balas terapeutik yang sesuai mesti dimulakan seperti yang ditunjukkan secara klinikal.

Pengaruh Ubat-Ubatan Lain

Garam Chlorhexidine tidak serasi dengan sabun dan bahan anionik lain. Aktiviti boleh dikurangkan dengan kehadiran agen penggantungan seperti alginat dan tragacanth, serbuk tidak larut seperti kaolin, dan sebatian kalsium, magnesium dan zink yang tidak larut. Isopropil alkohol tidak boleh bersentuhan dengan beberapa vaksin dan suntikan ujian kulit (ujian tampalan), jika ragu-ragu, rujuk literatur pengeluaran vaksin. Isopropil alkohol juga diketahui tidak serasi dengan agen pengoksida seperti hidrogen peroksida dan asid nitrik, yang boleh menyebabkan penguraian.

Penggunaan Semasa Mengandung Dan Penyusuan

Tiada langkah berjaga-jaga khas perlu diambil apabila digunakan semasa mengandung dan menyusu.

Kesan Sampingan / Kesan Yang Tidak Diingini

Gangguan sistem imun

Kekurangan tidak diketahui: Hipersensitiviti termasuk kejutan anafilaksis.

Dos Berlebihan dan Rawatan

Tiada laporan mengenai perkara ini berlaku dan sifat produk menjadikannya tidak mungkin terlebih dos. Chlorhexidine gluconate yang diambil secara oral kurang diserap ke dalam darah. Tertelan secara tidak sengaja mungkin memerlukan lavaj gastrik yang sesuai menggunakan susu, putih telur, gelatin atau sabun lembut.

Cara Menyimpan

Simpan di bawah 30° C, lindungi dari haba, api dan cahaya.

Bentuk Dos

Larutan.

Pembungkusan

500 ml botol HDPE dengan dispenser pam HDPE.

Hayat Simpanan

24 bulan.

Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk

Xorix Sdn. Bhd,
Lot 1, 2, 3 & 4,
Kawasan Industri Batu 7,
23000 Dungun, Terengganu, MALAYSIA.