

FUNOMOR

Antifungal Cream 1% w/w

Active Ingredient: Clotrimazole 1%/w/w

Preservative: Chlorocresol 0.2%/w/w

Product Description

White colour, smooth application, sticky and phenolic odour cream.

Indication:

- All dermatomycoses due to dermatophytes (Trichophyton species) e.g. athlete's foot (tinea pedis), jock itch (tinea cruris) and ringworm (tinea corporis)
- All dermatomycoses due to yeast (Candida species) e.g. candida vulvitis, candida balanitis
- Dermatomycoses due to moulds and other fungi
- Skin diseases showing secondary infection with these fungi
- Phytiasis versicolor (tinea versicolor) due to Malassezia furfur

Recommended Dose:

General: The affected area should be washed and thoroughly dried. Thin layer of clotrimazole cream is evenly rubbed into the affected area twice daily. Treatment should continue for 2-4 weeks after the disappearance of all signs of infection to ensure mycological cure and prevent relapse.

Adult & Paediatric Dosing Based On Type Of Infection:

- Candidiasis (topical): twice daily for up to 4 weeks
- Phytiasis versicolor (tinea versicolor): twice daily for up to 4 weeks
- Tinea corporis: twice daily for up to 4 weeks
- Tinea cruris: twice daily for up to 4 weeks
- Tinea pedis: twice daily for up to 4 weeks

Pharmacodynamics:

Clotrimazole is an imidazole derivative with a broad spectrum antimycotic activity.

Mechanism of Action

Clotrimazole acts against fungi by inhibiting ergosterol synthesis. Inhibition of ergosterol synthesis leads to structural and functional impairment of the cytoplasmic membrane.

Pharmacodynamic effects

Clotrimazole has a broad antimycotic spectrum of action in vitro and in vivo, which includes dermatophytes, yeasts, moulds, etc.

Under appropriate test conditions, the minimum inhibitory concentration (MIC) values for these types of fungi are in the region of less than 0.062-4(-8) mg/ml substrate. The mode of action of clotrimazole is primarily fungistatic. In-vitro activity is limited to proliferating fungal elements; fungal spores are slightly sensitive.

In addition to its antimycotic action, clotrimazole also acts on Trichomonas vaginalis, gram-positive microorganisms (Streptococci-Staphylococci), and gram-negative microorganisms (Bacteroides/Gardnerella vaginalis).

In vitro clotrimazole inhibits the multiplication of Corynebacteria and gram-positive cocci-with the exception of Enterococci in concentrations of 0.5-10 mg/ml substrate..

Primary resistant variants of sensitive fungal species are very rare; the development of secondary resistance by sensitive fungi has so far only been observed in very isolated cases under therapeutic conditions.

Pharmacokinetics:

Absorption of clotrimazole is less than 0.5% after topical application.

Contraindication:

Hypersensitivity to the Clotrimazole or to any of the excipients.

Warning and Precaution:

For irritation or sensitivity caused with the use of clotrimazole; treatment should be discontinued and appropriate therapy instituted. The patient should be advised to use the medication for the full treatment time even though the symptoms may have improved.

Keep out of reach of children.

Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.

Effects on Ability to Drive and Use Machines:

It is unlikely to impair a patient's ability to drive or use machinery.

Interactions with Other Medicaments: Not known

Pregnancy & Lactation:

Weigh the potential benefits of drug treatment against potential risks before prescribing this drug during pregnancy and breastfeeding.

This medicine should be used in the first trimester of pregnancy after consideration of the benefit/risk relation and by physician decision. It is not known whether Clotrimazole is excreted in human breast milk. As many drugs are excreted in human breast milk, caution should be exercised with Clotrimazole used by nursing mothers.

Side Effect:

Local reactions include irritation, burning sensation, contact dermatitis, blister, edema, erythema, peeling of skin, pruritis, urticaria and stinging of skin.

Symptoms of Overdosage and Treatment:

Acute overdosage with topical application of clotrimazole is unlikely and would not be expected to lead to a life-threatening situation. In the case of overdose, there is no specific antidote.

Route of Administration: Topical

Packing: 10g

Storage Condition: Store below 30°C. Protect from light and moisture.

Shelf Life: Please refer to the packaging. Do not use beyond the expiry date.

The information contained in this leaflet is limited. For further information, please consult your doctor or pharmacist.

PRODUCT REGISTRATION HOLDER

HL Pharmaceuticals Sdn Bhd (1012040-U)
No 760 & 762, Jalan Sentul,
51000 Kuala Lumpur, Malaysia.

MANUFACTURER

Syarikat Wen Ken Drug Sdn Bhd
24, Jalan Lambak, Taman Johor,
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Date of revision: 5 Apr 2024



FUNOMOR

Krim Anti Kulat 1% w/w

Komposisi: Clotrimazole 1%/w/w

Bahan Pengawet: Chlorocresol 0.2%/w/w

Deskripsi:

Krim berwarna putih, mudah disapu, melekit dan berbau fenolik.

Indikasi:

- Semua dermatomikosis yang disebabkan oleh dermatofit (Trichophyton species) seperti kaki atlet (Tinea pedis), gatal pangkal paha (tinea cruris) dan kurap (Tinea corporis)
- Semua dermatomikosis disebabkan oleh yis (Candida species) seperti Candida vulvitis, Candida balanitis
- Dermatomikosis yang disebabkan oleh kulat dan fungus yang lain
- Penyakit kulit yang mempunyaijangkitan sekunder oleh fungus
- Phytiasis versicolor (tinea versicolor) yang disebabkan oleh Malassezia furfur

Dose Saranan:

General: Umum: Basuh dan keringkan dengan menyeluruh bahagian yang dijangkiti. Sapu lapisan nipis krim clotrimazole dengan sekata kepada bahagian yang dijangkiti dua kali sehari. Rawatan perlu diteruskan 2-4 minggu selepas kehilangan semua tanda-tanda jangkitan untuk memastikan penyembuhan yang sempurna dan mengelakkan jangkitan berulang.

Dos dewasa dan pediatrik bergantung kepada jenis jangkitan:

- Kandidiasis (topikal): Dua kali sehari untuk jangka masa sehingga 4 minggu
- Panau (tinea versicolor): Dua kali sehari untuk jangka masa sehingga 4 minggu
- Tinea corporis: Dua kali sehari untuk jangka masa sehingga 4 minggu
- Tinea cruris: Dua kali sehari untuk jangka masa sehingga 4 minggu
- Tinea pedis: Dua kali sehari untuk jangka masa sehingga 4 minggu

Symptom & Rawatan Overdos:

Overdos akut dengan aplikasi topikal clotrimazole jarang berlaku dan tidak akan menyebabkan keadaan yang mengancam nyawa.

Kesan Sampangan:

Untuk iritasi atau sensitiviti yang diakibatkan oleh penggunaan clotrimazole; rawatan perlu dihentikan dan terapi yang sesuai perlu dimulakan. Pesakit adalah dinasihat untuk menghabiskan ubat untuk seluruh jangka masa rawatan walaupun simptom mungkin telah bertambah baik.

Amaran & Perhatian:

Untuk iritasi atau sensitiviti yang diakibatkan oleh penggunaan clotrimazole; rawatan perlu dihentikan dan terapi yang sesuai perlu dimulakan. Pesakit adalah dinasihat untuk menghabiskan ubat untuk seluruh jangka masa rawatan walaupun simptom mungkin telah bertambah baik.

Kesan Terhadap Kebolehan Memandu Dan Mengendalikan Mesin: Tiada kemungkinan kesan terhadap kebolehan memandu atau mengendalikan mesin.

Kontraindikasi:

Hiper sensitiviti kepada clotrimazole.

Kehamilan & Laktasi:

Timbangkan potensi manfaat rawatan ubat terhadap potensi risiko sebelum menetapkan preskripsi ubat ini semasa kehamilan dan laktasi. Ubat ini boleh digunakan dalam trimester pertama kehamilan selepas menimbang hubungan manfaat/risiko dan dengan nasihat doktor, ia tidak diketahui samada clotrimazole dikeluarkan dalam susu ibu. Oleh kerana banyak ubat dikeluarkan dalam susu ibu, perhatian perlu diberikan kepada penggunaan clotrimazole oleh ibu yang menyusukan anak.

Interaksi Dengan Ubat Lain:

Tidak ada interaksi ubat yang diketahui.

Farmakodinamik:

Clotrimazole adalah derivatif imidazole dengan aktiviti antimikotik spektrum luas.

Tindakan Mekanisme:

Clotrimazole bertindak terhadap fungus dengan merencatkan sintesis ergosterol. Perencatan sintesis ergosterol membawa kepada kemerosotan struktur dan fungsi membrane sitoplasmik.

Kesan Farmakodinamik:

Clotrimazole memiliki tindakan antimikotik berspektrum luas in-vitro dan in-vivo yang berkesan terhadap dermatofit, yis, kulat dan sebagainya.

Dalam keadaan ujian yang sesuai, nilai kepekatan perencatan minimum (MIC) untuk jenis-jenis fungus ini adalah dalam lingkungan kurang daripada 0.064-4 (-8) mg/ml substrat. Cara tindakan utama clotrimazole ialah fung statik. Aktiviti in-vitro adalah terhad kepada elemen pembiakan fungus; spora fungus kurang sensitif kepadanya.

Tambahan kepada tindakan antimikotik, clotrimazole juga bertindak terhadap trichomonas vaginalis, mikroorganisma gram-positif (streptococci/staphylococci), mikroorganisma gram-negatif (bacteroides/gardnerellavaginalis).

Clotrimazole merencatkan pembiakan corynebacteria dan koki gram-positif kecuali enterococci dalam kepekatan 0.5-1.0 mg/ml substrat dan memberi tindakan trichomonasida pada 100 mg/ml.

Jarang sekali berlaku variasi resistan primer spesies fungus yang sensitif; kemunculan resistan sekunder oleh spesies fungus yang sensitif hanya diperhatikan dalam kes asing dalam keadaan terapeutik.

Farmakokinetik:

Penyerapan clotrimazole adalah kurang daripada 0.5% selepas sapu pada kulit/ aplikasi topikal.

Kadaan Penyimpanan:

Simpan di bawah 30°C. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.

Tempoh Hayat:

Sila rujuk kepada bungkusan. Jangan guna selepas tamat tarikh luput.

Saiz Bungkusan:

10g dalam tiub aluminium.

Maklumat dalam risalah ini adalah terhad. Untuk informasi selanjut, sila jumpa doktor atau ahli farmasi

PEMEGANG PENDAFTARAN PRODUK

HL Pharmaceuticals Sdn Bhd (1012040-U)
No 760 & 762, Jalan Sentul,
51000 Kuala Lumpur, Malaysia.

PENGILANG

Syarikat Wen Ken Drug Sdn Bhd
24, Jalan Lambak, Taman Johor,
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Tarikh kemaskini: 5 Apr 2024

