SWKD WKMS WKMM HU HU (KK)	File Name : Septyc-Kare-Antiseptic-Cream_Leaflet_11072024		
	Received : 31.10.2023 Amended : 11.07.2024 Output : - Request : Shuying Designer : Nickles	Opened : 100w x 160h MM Closed : 100w x 40h MM Finished: - Colour : 1Cx1C K	

Three Legs
Wound-Kare
Antiseptic Cream

Antiseptic and cleansing cream for use on cuts, scratches, blisters, grazes, windburn, sunburn, nappy rash, insect bites, cracked and itchy skin.

THREE LEGS WOUND-KARE ANTISEPTIC CREAM

ACTIVE INGREDIENT:
Cetrimide 0.5%w/w, Chlorhexidine Gluconate 0.1%w/w
Preservative: Chlorocresol 0.2%w/w

PRODUCT DESCRIPTION:
White colour, smooth application and sticky cream with characteristic odour.

INDICATION:
Antiseptic and cleansing cream for use on cuts, scratches, blisters, grazes, windburn, sunburn, nappy rash, insect bites, cracked and itchy skin.

DIRECTION OF USE:
Apply gently onto the affected area 2-3 times daily. Wash hand thoroughly before and after each application.

ROUTE OF ADMINISTRATION: Topical

CONTRAINDICATIONS:
Patients with known hypersensitivity to any of the ingredients in the product.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:
Three Legs Wound-Kare Antiseptic Cream contains chlorhexidine. Chlorhexidine is known to induce hypersensitivity, including generalized allergic reactions and anaphylactic shock.

The prevalence of chlorhexidine hypersensitivity is unknown, but available literature suggests this is likely to be very rare. Three Legs Wound-Kare Antiseptic Cream should not be administered to anyone with a possible history of an allergic reaction to chlorhexidine.

Cetrimide may have a prolonging effect on the wound healing process.

If any signs or symptoms of a suspected hypersensitivity reaction such as itching, skin rash, redness, swelling, breathing difficulties, light headedness, and rapid heart rate develop, immediately stop using the product. Appropriate therapeutic countermeasures must be instituted as clinically indicated.

For external use only. If symptoms persist, please consult doctor.

Keep out of reach of children.

Three Legs Wound-Kare Antiseptic Cream is incompatible with anionic substances (e.g. soap).

PHARMACODYNAMICS:
Chlorhexidine gluconate is an effective antiseptic with a wide range of activity against micro-organisms, including gram positive and gram negative bacteria, fungi and viruses.

Cetrimide is a quaternary ammonium compound with surfactant and antiseptic properties.

PHARMACOKINETICS:
Chlorhexidine gluconate and cetrimide are poorly absorbed from the gastro-intestinal tract and skin.

EFFECTS ON ABILITY TO DRIVE AND USE MACHINES: Not known

INTERACTIONS WITH OTHER MEDICAMENTS:
Not known

PREGNANCY & LACTATION:
There are no adequate data from the use of chlorhexidine gluconate and cetrimide in pregnant women. The potential risk for humans is unknown but is most likely very low since chlorhexidine gluconate and cetrimide are poorly absorbed following topical application.

It is not known whether chlorhexidine gluconate and cetrimide are excreted in breast milk. There is no adequate data from the use of chlorhexidine and cetrimide in breast-feeding women. However, it is unlikely that the products are excreted in breast milk since the products are poorly absorbed. After topical usage of the product, as a general precaution, rinse nipples thoroughly with water before breast-feeding.

ADVERSE EFFECTS/ UNDESIRABLE EFFECTS:
Irritative skin reactions and hypersensitivity reactions to chlorhexidine have been reported. In the event that these reactions occur, discontinue use.

Chlorhexidine may cause anaphylaxis.

Cetrimide may have a prolonging effect on the wound healing process.

Immune system disorders

Frequently not known: Hypersensitivity including anaphylactic shock.

SYMPTOMS AND TREATMENT OF OVERDOSE:
Symptoms
While accidental ingestion is unlikely to cause any systemic effects due to poor absorption of chlorhexidine gluconate and cetrimide, ingestion of high concentrations may cause esophageal damage and necrosis with symptoms such as nausea and vomiting.

Treatment
Treatment of poisoning is symptomatic, demulcents and diluents may be given if necessary, but emesis and lavage should be avoided. Activated charcoal may be considered if the patient presents within an hour of ingestion.

Corticosteroids may reduce oropharyngeal edema.

STORAGE CONDITIONS: Store below 30°C. Protect from direct sunlight.

SHELF LIFE: Please refer to the packaging. Do not use beyond the expiry date.

DOSAGE FORM: Cream

PACKING SIZE: 10g, 15g and 30g in aluminum tube

The information contained in this leaflet is limited. For further information, please consult your pharmacist or doctor.

KRIM ANTISEPTIK WOUND-KARE CAP KAKI TIGA

BAHAN AKTIF:
Cetrimide 0.5%w/w, Chlorhexidine Gluconate 0.1%w/w
Bahan Pengawet: Chlorocresol 0.2%w/w

DESKRIPSI:
Krim berwarna putih, mudah disapu, melekit dan mempunyai bau cirian.

INDIKASI:
Krim antiseptik dan pembersih untuk digunakan pada luka, calar, lepuh, ragut, selaran angin, selaran matahari, ruam lampin, gigitan serangga, kulit merekah dan gatal.

CARA PENGGUNAAN:
Sapu krim ini di bahagian yang terjejas 2-3 kali sehari. Bersihkan tangan sebelum dan selepas setiap penggunaan.

LALUAN PEMBERIAN UBAT: Topikal

KONTRAINDIKASI:
Pesakit yang diketahui hypersensitif kepada mana-mana bahan dalam produk.

AMARAN DAN PERHATIAN:
Krim Antiseptik Wound-Kare Cap Kaki Tiga mengandungi chlorhexidine. Chlorhexidine diketahui boleh menyebabkan hipersensitiviti, termasuk tindak balas terhadap alahan umum dan kejutan anafilaksis.

Penyebaran hipersensitiviti chlorhexidine tidak diketahui, tetapi maklumat yang tersedia menunjukkan bahawa ianya jarang berlaku. Krim Antiseptik Wound-Kare Cap Kaki Tiga tidak boleh diberikan kepada sesiapa yang pernah mempunyai masalah alahan terhadap chlorhexidine.

Cetrimide mungkin memperlambat proses penyembuhan luka.

Jika ada simptom atau gejala tindak balas hipersensitiviti yang disyaki seperti gatal, ruam kulit, kulit kemerahan, bengkak, kesukaran bernafas, pening dan kadar degupan jantung yang pesat, hentikan penggunaan produk dengan segera. Pengawasan terapeutik yang sesuai harus dimulakan seperti yang ditunjukkan secara klinikal.

Untuk kegunaan luar sahaja. Jika simptom berlarutan, sila merujuk kepada doktor.

Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.

Krim Antiseptik Wound-Kare Cap Kaki Tiga tidak serasi dengan bahan anionik. (seperti sabun).

FARMAKODINAMIK:
Chlorhexidine gluconate adalah antiseptik yang berkesan dengan pelbagai aktiviti terhadap mikroorganisma, termasuk bakteria gram positif dan gram negatif, kulat dan virus.

Cetrimide ialah sebatian ammonium kuaterner dengan sifat surfaktan dan antiseptik.

FARMAKOKINETIK:
Chlorhexidine gluconate dan cetrimide kurang diserap daripada saluran gastro-usus dan kulit.

KESAN PADA KEUPAYAAN MEMANDU DAN PENGGUNAAN MESIN: Tidak diketahui

INTERAKSI DENGAN UBAT LAIN:
Tidak diketahui

KEHAMILAN & PENYUSUAN:
Tiada data yang mencukupi dari penggunaan chlorhexidine gluconate dan cetrimide pada wanita hamil. Risiko potensi untuk manusia tidak diketahui tetapi kemungkinannya sangat rendah kerana chlorhexidine gluconate dan cetrimide kurang diserap selepas penggunaan topikal.

Tidak diketahui sama ada chlorhexidine gluconate dan cetrimide diekskresikan dalam susu ibu. Tiada data yang mencukupi daripada penggunaan chlorhexidine dan cetrimide pada wanita yang menyusukan bayi. Namun, kemungkinan produk diekskresikan dalam susu ibu adalah rendah kerana penyerapan produk tersebut adalah rendah. Selepas penggunaan topikal produk, sebagai langkah berjaga-jaga, bilas puting susu dengan air secara teliti sebelum menyusukan bayi.

KESAN-KESAN SAMPINGAN:
Reaksi kulit yang merengsa dan tindak balas hipersensitiviti terhadap chlorhexidine telah dilaporkan. Jika tindak balas ini berlaku, hentikan penggunaan.

Chlorhexidine boleh menyebabkan anafilaksis.

Cetrimide mungkin memperlambat proses penyembuhan luka.

Gangguan sistem imun

Kekerapan tidak diketahui: Hipersensitiviti termasuk kejutan anafilaksis

SIMPTOM DAN RAWATAN UNTUK KELEBIHAN DOS:
Simptom
Walaupun pengambilan secara tidak sengaja mungkin tidak menyebabkan apa-apa kesan sistemik disebabkan kurang penyerapan chlorhexidine gluconate dan cetrimide , pengambilan kepekatan tinggi boleh menyebabkan kerosakan esofagus dan nekrosis dengan simptom seperti loya dan muntah-muntah.

Rawatan
Rawatan keracunan adalah simptomatik; demulcents dan diluent boleh diberikan jika perlu tetapi emesis dan lavage sepatutnya dielakkan. Pertimbangkan untuk menggunakan arang aktif boleh dipertimbangkan dalam masa 1 jam selepas pengambilan.

Kortikosteroid boleh mengurangkan edema orofaringeal.

KEADAAN PENYIMPANAN: Simpan di bawah 30°C. Lindungi daripada sinaran matahari.

TEMPOH HAYAT: Sila rujuk kepada bungkusan. Jangan guna selepas tamat tarikh luput.

DOS: Krim

SAIZ PEMBUNGKUSAN: 10g, 15g dan 30g dalam tiub aluminium

Maklumat yang terkandung dalam risalah ini adalah terhad. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada ahli farmasi atau doktor anda.

三脚标 WOUND-KARE 消毒膏

活性成分：西曲氯胺0.5%w/w, 葡萄糖酸氯己定0.1%w/w

防腐剂：氯甲酚0.2%w/w

产品描述：
白色药膏，容易涂抹，有粘性及具有特殊气味。

主治：
适用于割伤、划伤、水泡、擦伤、风烧伤、晒伤、尿布疹、昆虫叮咬、皮肤皲裂和瘙痒的抗菌和清洁霜。

用法：
将此药轻轻涂抹于患处，每日二至三次。使用前后需将双手洗干净。

给药途径：外用

禁忌：
已知对产品中的任何成分过敏的患者。

注意与防范：
三脚标Wound-Kare消毒膏含有氯己定。已知氯己定会造成的过敏症包括全身性过敏反应和过敏性休克。

氯己定过敏的患病率尚不明确，但现有文献表明这种情况很可能非常罕见。任何有可能会对氯己定有过敏反应的人都不应使用三脚标Wound-Kare消毒膏。

西曲氨胺可能会延长伤口愈合的时间。

如果出现任何疑似过敏反应的迹象或症状，例如瘙痒、皮疹、发红、肿胀、呼吸困难、头晕和心率加快，请立即停止使用该产品。必须根据临床情况采取适当的治疗的对策。

仅限于外用。若症状持续，请咨询医生。

远离儿童。

三脚标Wound-Kare消毒膏与阴离子物质（例如肥皂）不相容。

药效学：
葡萄糖酸氯己定是一种有效的抗菌剂，对微生物具有广泛的活性，包括革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌、真菌和病毒。

西曲氨胺是一种季铵化合物，具有表面活性剂和抗菌剂性能。

药代动力学：
葡萄糖酸氯己定和西曲氨胺在胃肠道和皮肤中吸收较差。

对驾驶和使用机器能力的影响：未知

与其他药物的相互作用：
未知

怀孕和哺乳：
尚无孕妇使用葡萄糖酸氯己定和西曲溴铵的充分数据。对人类的潜在风险尚不清楚，但可能性非常低，因为葡萄糖酸氯己定和西曲溴铵在局部应用后吸收不良。

目前尚不清楚葡萄糖酸氯己定和西曲溴铵是否会分泌到母乳中。尚无关于哺乳期妇女使用氯己定和西曲溴铵的充分数据。然而，由于产品吸收不良，因此产品不太可能排泄到母乳中。局部使用本产品后，作为一般预防措施，在母乳喂养前用水彻底冲洗乳头。

副作用：
据报道，氯己定会引起皮肤刺激反应和过敏反应。如果发生这些反应，请停止使用。

氯己定可能引起过敏性休克。

西曲氨胺可能会延长伤口愈合的时间。

免疫系统疾病

频率未知：过敏反应，包括过敏性休克。

过量服用的症状和治疗：
症状
由于葡萄糖酸氯己定和西曲氨胺很难被吸收，所以误食不太可能引起任何全身影响，但摄入高浓度可能会导致食道损伤和坏死，并伴有恶心和呕吐等症状。

治疗
中毒的治疗是对症的；如有必要，可给予镇痛剂和稀释剂，但应避免进行催吐和灌洗。如果患者在摄入后一小时内就诊，可以考虑使用活性炭。

皮质类固醇可减轻口咽水肿。

贮存：存放于30°C以下。避免阳光直射。

有效期：请参考包装。勿在有效期期限之后使用。

剂型：乳膏

包装：10克、15克和30克铝管

此说明书仅属略述，欲知更详细资料，请咨询您的药剂师或医生。

Date of Revision: 11.07.2024

Manufactured by Product Registration Holder:
Syarikat Wen Ken Drug Sdn Bhd
24, Jalan Lambak, Taman Johor,
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Singapore Distributor:
Wen Ken Marketing (S) Pte Ltd
2, Alexandra Road, #02-08, Delta House,
Singapore 159919.

–