

GDN_AntisepticFirstAidCream30g_Leaflet

Size: 100 (W) x 160 (H) mm

GD1566LR2M

Front Panel

guardian

ANTISEPTIC FIRST AID CREAM

Active ingredients: Cetrimide 0.5%w/w, Chlorhexidine Gluconate 0.1%w/w.

Preservative: Chlorocresol 0.2%w/w.

Product description: White colour, smooth application, sticky cream with characteristic odour.

Pharmacodynamics: Chlorhexidine gluconate is an effective antiseptic with a wide range of activity against micro-organisms, including gram positive and gram negative bacteria, fungi and viruses. Cetrimide is a quaternary ammonium compound with surfactant and antiseptic properties.

Pharmacokinetics: Chlorhexidine gluconate and cetrimide are poorly absorbed from the gastrointestinal tract and skin.

Indication: As an antiseptic for skin lesions, cuts, abrasions, infected wounds, and burns.

Directions for use: Apply gently onto affected area 2-3 times daily. Wash hands thoroughly before and after each application.

Route of administration: Topical.

Contraindications: Known hypersensitivity to the product or any of its components, especially in those with a history of possible chlorhexidine gluconate-related allergic reaction.

Warnings and precautions: Guardian Antiseptic First Aid Cream contains chlorhexidine. Chlorhexidine is known to induce hypersensitivity, including generalised allergic reactions and anaphylactic shock.

The prevalence of chlorhexidine hypersensitivity is unknown, but available literature suggests this is likely to be very rare. Guardian Antiseptic First Aid Cream should not be administered to anyone with a possible history of an allergic reaction to chlorhexidine.

If any signs or symptoms of a suspected hypersensitivity reaction such as itching, skin rash, redness, swelling, breathing difficulties, light headedness and rapid heart rate develop, immediately stop using the product. Appropriate therapeutic countermeasures must be instituted as clinically indicated.

Prolonged and repeated applications of cetrimide are inadvisable as hypersensitivity may occur.

For external use only. Avoid contact with eyes. Keep out of reach of children.

Effects on ability to drive and use machines: Not known.

Interactions with other medicaments: Not known.

Pregnancy & Lactation: There are no adequate data from the use of chlorhexidine gluconate and cetrimide in pregnant and breastfeeding women.

The potential risk for humans is unknown but is most likely very low since chlorhexidine gluconate and cetrimide are poorly absorbed following topical application.

Adverse effects / undesirable effects: Chlorhexidine: Immune system disorders. Frequency not known: Hypersensitivity including anaphylactic shock.

Cetrimide: Hypersensitivity reactions may occasionally occur in certain individuals and present as localised contact dermatitis.

Symptoms and treatment of overdose:

Symptoms: While accidental ingestion is unlikely to cause any systemic effects due to the poor absorption of chlorhexidine gluconate and cetrimide, ingestion of high concentrations may cause esophageal damage and necrosis with symptoms such as nausea and vomiting. Cetrimide has depolarising muscle relaxant properties and toxic symptoms include dyspnoea and cyanosis due to paralysis of the respiratory muscles, possibly leading to asphyxia. Central nervous system depression (sometimes preceded by excitement and convulsions), hypotension, coma, and death may also occur.

Treatment: Treatment of poisoning is symptomatic; demulcents and diluents may be given if necessary but emesis and lavage should be avoided. Activated charcoal may be considered if the patient presents within an hour of ingestion. Corticosteroids may reduce oropharyngeal edema.

Storage conditions: Store below 30°C, away from direct sunlight.

Shelf life: Please refer to the packaging. Do not use beyond the expiry date.

Dosage form: Cream.

Packing size: 30g in aluminium tube.

The information contained in this leaflet is limited. For further information, please consult your doctor or pharmacist.

Manufactured under the commission of GfR Brands Limited of 5/F Devon House, Takoon Plaza, Quarry Bay, Hong Kong
Distributed By
Guardian Health & Beauty :
21 Tampines North Drive 2, #04-01, Giant,
Singapore 528765
Guardian Health and Beauty @ Sth Bhd, #JC0000294
Lot 58865 Rimba Point, Kampong Rimba,
Mukim Gadong BE3119, Brunei Darussalam

Malaysia Product Registration Holder:
Guardian Health and Beauty Sth Bhd, (201401024993)
Level 11, 8 First Avenue, Bandar Utama,
47800, Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel: (60) 3 2777 7100

Manufactured By:
Syntex Wern Kim Drug Sth Bhd
24, Jalan Lambak, Taman Johor,
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

MAL25026031XC

Date of revision: Jul 2025

GD1566LR2M

guardian

抗菌急救膏

活性成分：西曲溴铵0.5%w/w，葡萄糖酸氯己定0.1%w/w。

防腐剂：氯甲酚 0.2%w/w。

产品描述：白色，涂感顺滑，粘稠的乳膏，具有特有的气味。

药效学：葡萄糖酸氯己定是一种有效的抗菌剂，对微生物具有广泛的活性，包括革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌、真菌和病毒。

西曲溴铵是一种季铵化合物，具有表面活性剂和抗菌剂性能。

药代动力学：葡萄糖酸氯己定和西曲溴铵在胃肠道和皮肤中吸收较差。

主治：作为皮肤损伤、刮伤、擦伤、伤口感染和烧伤的消毒剂。

用法说明：每日2至3次，轻轻涂于患处。使用前后要彻底洗手。

给药途径：局部的。

禁忌：已知对此产品或其任何成分过敏，尤其是有可能与葡萄糖酸氯己定相关的过敏反应史的人。

■ Pantone Cool Gray 11 C

Back Panel

注意与防范：Guardian抗菌急救膏含有氯己定。已知氯己定会造成过敏反应包括全身性过敏反应和过敏性休克。

氯己定过敏的患病率尚不明确，但现有文献表明这种情况很可能非常罕见。任何有可能会对氯己定有过敏反应的人都不应使用Guardian抗菌急救膏。

如果出现任何疑似过敏反应的迹象或症状，例如瘙痒、皮疹、发红、肿胀、呼吸困难、头晕和心率加快，请立即停止使用此产品。必须根据临床情况采用适当的治疗对策。不建议长期和重复使用西曲溴铵，因为可能会出现过敏反应。

仅供外用，避免接触眼睛。请置于儿童难以触及之处。

对驾驶和使用机器能力的影响：未知。

与其他药物的相互作用：未知。

怀孕和哺乳：尚无关于孕妇和哺乳期妇女使用葡萄糖酸氯己定和西曲溴铵的充分资料。

对人类的潜在风险是未知的，但可能性非常低，因为葡萄糖酸氯己定和西曲溴铵在局部应用后吸收不良。

副作用：葡萄糖酸氯己定：免疫系统疾病，频率未知。过敏反应，包括过敏性休克。

西曲溴铵：某些人偶尔会出现过敏反应，表现为局部接触性皮炎。

过量服用的症状和治疗：

症状：由于葡萄糖酸氯己定和西曲溴铵吸收较差，所以误食不太可能引起任何全身影响，但摄入高浓度可能会导致食道损伤和坏死，并伴有恶心和呕吐等症状。

西曲溴铵具有去极化肌肉松弛特性，毒性症状包括呼吸肌麻痹导致的呼吸困难和发绀，可能导致窒息。中枢神经系统抑制（有时先于兴奋和抽搐）、低血压、昏迷和死亡也可能发生。

治疗：中毒的治疗是对症的：如有必要，可给予镇痛剂和稀释剂，但应避免进行呕吐和灌洗。如果患者在摄入后一小时内就诊，可以考虑使用活性炭。

皮质类固醇可减轻口咽水肿。

贮存：存放于30°C以下，避免阳光直射。

有效期：请参考包装。请勿使用超过有效期。

剂型：乳膏。

包装：30克铝管。

此说明书仅属概述，欲知详情，请咨询您的医生或药剂师。

guardian

ANTISEPTIC FIRST AID CREAM

Bahan aktif: Cetrimide 0.5%w/w, Chlorhexidine Gluconate 0.1%w/w.

Bahan pengawet: Chlorocresol 0.2%w/w.

Deskripsi produk: Krim berwarna putih, mudah disapu, melekit dan mempunyai bau cian.

Farmakodinamik: Chlorhexidine gluconate adalah antiseptik yang berkesan dengan pelbagai aktiviti terhadap mikroorganisma, termasuk bakteria gram positif dan gram negatif, kulat dan virus.

Cetrimide ialah sebatian ammonium kuaterner dengan sifat surfaktan dan antiseptik.

Farmakokinetik: Chlorhexidine gluconate dan cetrimide kurang diserap daripada saluran gastro-usus dan kulit.

Indikasi: Sebagai antiseptik bagi kecederaan kulit seperti luka, melecel, luka terinfeksi dan luka akibat terbakar.

Cara penggunaan: Sapukan krim pada bahagian yang berkenaan dengan lembut 2-3 kali sehari. Basuhkan tangan secara menyeluruh sebelum dan selepas guna.

Laluan pemberian ubat: Topikal.

Kontraindikasi: Hipersensitiviti yang diketahui terhadap produk atau mana-mana komponennya, terutama pada mereka yang mempunyai sejarah kemungkinan tindak balas alahan berkaitan chlorhexidine gluconate.

Amaran dan perhatian: Guardian Antiseptic First Aid Cream mengandungi chlorhexidine. Chlorhexidine diketahui boleh menyebabkan hipersensitiviti, termasuk tindak balas terhadap alahan umum dan kejutan anafilaksis.

Penybaran hipersensitiviti chlorhexidine tidak diketahui, tetapi maklumat yang tersedia menunjukkan bahawa ianya jarang berlaku. Guardian Antiseptic First Aid Cream tidak boleh diberikan kepada sesiapa yang pernah mempunyai masalah alahan terhadap chlorhexidine.

Jika ada simptom atau gejala tindak balas hipersensitiviti yang disyaki seperti gatal, ruam kulit, kulit kemerahan, bengkak, kesukaran bernafas, pening dan kadar degupan jantung yang pesat, hentikan penggunaan produk dengan segera. Pengawasan terapeutik yang sesuai harus dimulakan seperti yang ditunjukkan secara klinikal.

Penggunaan cetrimide yang berlebihan dan berulang adalah tidak digalakkan sebab alahan mungkin berlaku.

Untuk kegunaan luar sahaja. Elakkan bersentuhan dengan mata.

Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.

Kesan pada Keupayaan Memandu dan Menggunakan Mesin: Tidak diketahui.

Interaksi dengan Ubat Lain: Tidak diketahui.

Kehamilan & Penyusuan: Tiada data yang mencukupi daripada penggunaan chlorhexidine gluconate dan cetrimide dalam wanita hamil dan menyusui.

Potensi risiko untuk manusia tidak diketahui tetapi kemungkinan besar sangat rendah kerana chlorhexidine gluconate dan cetrimide kurang diserap selepas penggunaan topikal.

Kesan-Kesan Sampingan: Gangguan sistem imun. Kekerapan tidak diketahui: Hipersensitiviti termasuk kejutan anafilaksis.

Simptom dan Rawatan untuk Kelelahan Dos:

Symptom: Walaupun pengambilan secara tidak sengaja tidak mungkin menyebabkan apa-apa kesan sistemik disebabkan chlorhexidine gluconate dan cetrimide kurang diserap, pengambilan berlebihan mungkin boleh menyebabkan kerosakan esofagus dan nekrosis dengan simptom seperti loya dan muntah-muntah.

Cetrimide mempunyai sifat pelemas otot yang menyakutkan dan toksik gejala termasuk dyspnoea dan sianosis akibat kelumpuhan otot pernafasan, mungkin membawa kepada asfiksia. Kemurungan sistem saraf pusat (kadang-kadang didahului oleh keseronokan dan sawan), hipotensi, koma, dan kematian juga mungkin berlaku.
Rawatan: Rawatan keracunan adalah simptomatik; demulcents dan diluent boleh diberikan jika perlu tetapi emesis dan lavage sepatutnya dielakkan. Pertimbangan untuk menggunakan arang aktif dalam masa satu jam selepas pengingesan. Kortikosteroid boleh mengurangkan edema orofaringeal.

Keadan Penyimpanan: Simpan di bawah 30°C, jauhkan daripada pancaran terus matahari.

Tempoh Hayat: Sila rujuk kepada bungkusan. Jangan guna selepas tamat tarikh luput.

Dos: Krim.

Saiz pembungkusan: 30g dalam tiub aluminium.

Maklumat yang terkandung dalam risalah ini adalah terhad. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

■ Pantone Cool Gray 11 C