

HALÉON

Panadol Extra TABLET

Paracetamol 500mg dan Kafein 65mg

Setiap tablet mengandung: 500mg Parasetamol, 65mg Kafein, pregelatinized starch, povidone, calcium carbonate, croscapellum, elginic acid, opadry white, camouba wite, magnesium stearate, blend of sodium peroxide.

Strength of sodium paracetamol: 1.35mg/tablet.

Dokter/poli Preskripsi
Tablet berbentuk bulat berwarna putih dengan huruf kekananan dengan salutan film, terukir "HP" dengan huruf "P" di dalam bulatan pada satu permukaan dan kesempadan pada permukaan yang sebaliknya.

Indikasi

Ranolol Extra digunakan untuk merawat kesakitan ringan dan sederhana serta melegakan demam termasuk sakit kepala, migrain, sakit otot, sakit sendenggot, sakit tekak, sakit muskuloskeletal, demam dan sakit selepas vaksinasi, sakit selepas prosedur pengiraan / pencabutan gigi, sakit gegang dan sakit osteoarthritis.

Doa yang Dinyatakan

Dosasi Kanak-kanak yang lebih dari enam tahun dan kanak-kanak berusia 12 tahun atau lebih:

Anchil 1 tablet, setiap 4 hingga 6 jam bila perlu. (Dosis maksimum harian 8 kapslet (4000mg parasetamol / 520mg kafein)).

Sesuai apabila dos ini telah ditetapkan oleh doktor.

Dosis paling rendah yang dapat memberi keberkesanan harus digunakan untuk tempoh rawatan yang paling singkat dan sesuai.

Selang minimum antara doa: 4 jam.

Kanak-Kanak

Paracetamol kafein tidak dinyatakan untuk kanak-kanak di bawah umur 12 tahun.

Paracetamol caffeine is not recommended for children under the age of 12 years.

Kemeroteutan bucu pinggang:

Pejabat yang didagnosis mengalami masalah bucu pinggang mesti mendapatkan nasihat perubahan sebelum mengambil ubat ini. Batasan yang berkaitan dengan penggunaan produk paracetamol pada pekat dengan masalah bucu pinggang adalah akibat daripada kandungan paracetamol dalam ubat (ila nyal kepada Sekyen Amanan dan Perhatian)

Kemeroteutan hati:

Pejabat yang didagnosis mengalami masalah hati mesti mendapatkan nasihat perubahan sebelum mengambil ubat ini. Batasan yang berkaitan dengan penggunaan produk paracetamol pada pekat dengan masalah hati adalah akibat daripada kandungan paracetamol dalam ubat (ila nyal kepada Sekyen Amanan dan Perhatian).

Cara Pengambilan

Pengambilan secara oral sahaja.

Kontraindikasi

Jangan ambil ubat ini jika anda ialah pekat paracetamol, kafein atau kandungan lain dalam ubat ini.

Amanan & Perhatian

Jangan mengambil lebih daripada dua yang dinyatakan kerana ia boleh menyebabkan keresakan serius pada badan. Penggunaan serentak dengan ubat lain yang mengandungi paracetamol boleh menyebabkan overdosis.

Jangan ambil ubat ini jika anda sedang mengambil sebarang ubat preskripsi atau bukan preskripsi yang mengandungi paracetamol untuk merawat kesakitan, demam, atau sekiranya anda infirmas, atau untuk membantu tidur.

Bujuk doktor doktor dan sebelum mengambil bucu anda:

- mempunyai masalah bucu pinggang atau hati,

- kurang berat badan atau kekurangan zat makanan,

- kerap minum alkohol,

- Adanya gangguan atau mungkin menggunakan produk-produk lain sama sekali atau mehabungkan jumlah paracetamol yang anda ambil.

Bujuk doktor doktor dan sebelum mengambil bucu anda:

Jangan ambil lebih daripada 12 tablet dalam sehari. Jangan mengambil lebih dari empat tablet dalam satu dos maksima ($0.347g \times 4 = 1.388g$).
Kerana ini akan meningkatkan risiko asidosis metabolik. Tanda-tanda asidosis metabolik termasuk:
- pening atau mual, - rasa haus,
- rasa sakit (mulut), sakit mulut,

- hilang selera makan,

- Hubungi doktor dengan segera jika anda mendapat kombinasi gejala-gejala ini.

Sila jumpa doktor jika gejala masih berlanjutan.

Setiap tablet mengandungi 0.1735gm dos. Kandungan sodium dalam satu dos maksima ($0.347g \times 4$) dos 2 tablet).

Sodium methyl-, sodium ethyl- dan sodium propyl-pyridoxalpyridoxylates boleh menyebabkan reaksi alahan.

- Elakkan pengambilan produk ubat yang mengandungi kafein. Terlalu banyak kafein boleh menyebabkan degupan jantung yang cepat, kegugupan atau kemurutan darah.

Minta nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan jika anda mengalami tekanan darah tinggi, glaukoma atau sindrom ginjal kronik yang sedia ada.

JANGAN ambil lebih daripada 8 tablet dalam tempoh 24 jam.

JANGAN membiarkan doo yang diberikan kecuali atas arahan doktor. Ambil doo paling rendah yang dapat memberi keberkesanan. Pengambilan lebih daripada

hak maksimum dos akan boleh menyebabkan keresakan hati yang teruk atau yang membawa maut.

JANGAN ambil dengan produk lain yang mengandungi parasetamol.

Tidak dinyatakan untuk kanak-kanak di bawah umur 12 tahun.

(Ubat ini mengandungi PARACETAMOL, JANGAN mengambil sebarang ubat-ubatan lain yang mengandungi paracetamol pada masa yang sama.)

AMARAN ALAHAN: Paracetamol boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk. Gejala-gejala termasuk kemerahan kulit, lepuh dan ruam. Ini mungkin berlaku selepas beberapa hari setelah rasai ini berlaku, bahkan penggunaan ubat ini dan dapatkan bantuan perubahan dengan segera.
Jauhkan daripada pandangan dan capaian kanak-kanak. Keep out of the sight and reach of children.
Sertifikat pembaruan dan kutipan pada label.

Interaksi

Paracetamol

Kesan antipiretik dan analgesik yang kuat dan tahan lama ini mungkin ditingkatkan dengan penggunaan bahan paracetamol yang berjangkitan sebab peningkatan risiko peradahan dan lokal sekitar kulit mempunyai kesan yang perlahan.

Kafein

Kafein boleh meningkatkan pengiritisan liliur dari badan. Oleh itu, penggunaan bersamaan lithium tidak digalakkan.

Kemahiran dan Penyusutan

Kemahiran:

Tidak dinyatakan untuk semua kemahiran.

Paracetamol

Seperti penggunaan ubat ini secara menanggung, tanpa arahan rasmi mendapatkan nasihat perubahan sebelum mengambil paracetamol. Dos paling rendah yang dapat memberi keberkesanan untuk tempoh rawatan yang paling singkat harus dipertimbangkan.

NPA01R0101

[illegible]