

HALEON

menstrual[®]

Paracetamol 500mg dan Pamabrom 25mg

Setiap tablet mengandung 500mg Paracetamol, 25mg Pamabrom, Croscarmellose Sodium, Opasdry Ink YS-1123, D3C Red 27 Al Lake, Polyvinylpyrrolidone Starch, Magnesium Stearate, Microcrystalline Cellulose, Geminolac.

Deskripsi Produk

Kepilul berbentuk kapsul yang berwarna putih merah jambu, dengan tulisan "PANACOL" di kedua-dua belah permukaan. Tampak bahu dan warna.

Indikasi

Untuk mengurangkan simptom kembung perut, kelenjar benak badan akibat penyerapan air, sakit kepala, sakit gigi, sakit belakang dan sengal-sengal otot yang berkaitan dengan kesakitan dan ketidakselesaan akibat demam dan ketidur.

Dos yang diberikan

Wanita sedang mengalami atau berumur 12 tahun ke atas: 1 tablet setiap 4-6 jam bila perlu.

Pasial di rumah sakit: 1 kapsul (400mg paracetamol, 20mg pamabrom) 4 kali sehari.

- Dengan melebihi dos yang diberikan.

- Dengan terlalu banyak atau terlalu banyak kegunaan waktu, digunakan untuk dos maksimum yang mungkin.

- Dengan minum air lebih dari 4 jam.

- Dengan minum minuman beralkohol. Dari 5 saat sebelum sehingga 5 saat selepas permukaan had, sehingga keseluruhan 10 saat.

- Dengan mengambil makanan.

- Dengan mengambil makanan.

Kanak-kanak: Bekerut untuk kegunaan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun.

Children: Not for use in children less than 12 years.

Wanita: Tidak boleh untuk kegunaan wanita yang tidak had.

Lelaki: Bekerut untuk kegunaan lelaki.

Kemerosotan buah pinggang

Pasial dengan kegagalan buah pinggang mesti mendapatkan nasihat perubatan sebelum mengambil ubat ini. Batasan yang berkaitan dengan penggunaan produk paracetamol dan pamabrom pada pesakit dengan masalah buah pinggang adalah bahawa paracetamol daripada kandungan paracetamol dalam ubat (sila lihat kepada Awaran dan Perhatian).

Kemerosotan hati

Pasial yang mengalami masalah hati mesti mendapatkan nasihat perubatan sebelum mengambil ubat ini. Batasan yang berkaitan dengan penggunaan produk paracetamol dan pamabrom pada pesakit dengan masalah hati adalah bahawa paracetamol daripada kandungan paracetamol dalam ubat (sila lihat kepada Awaran dan Perhatian).

Cara Pengambilan

Kontraindikasi

Jangan ambil jika

- anda telah mengambil paracetamol, pamabrom atau kandungan lain dalam ubat ini,

- anda tidak boleh membuang air kecil

- anda hamil atau menyusukan bayi

Awaran dan Perhatian

Jangan mengambil lebih daripada dos yang diberikan kerana ia boleh menyebabkan kerosakan serius pada hati anda.

Sila dapatkan nasihat perubatan jika anda mengalami simptom-simptom berikut:

Rujuk doktor doktor anda sebelum mengambil jika anda:

- mempunyai masalah buah pinggang.

- kurang berat badan atau kekurangan berat badan.

- kerap minum alkohol.

- anda mungkin perlu menggunakan penggunaan produk ini sama sekali atau mengurangkan jumlah paracetamol yang anda ambil.

Rujuk doktor doktor anda sebelum mengambil jika anda:

- mempunyai masalah buah pinggang, masalah ginjal, kencing berat badan atau semasa mengambil alkohol kerana ini akan meningkatkan risiko akibat metabolisme.

Tanda-tanda untuk akibat metabolisme termasuk:

- Perut kembung yang mendalam, cirit dan sakit

- Rasa sakit (mulut, sakit (mulut)

- Hilang selera makan

Hubungi doktor dengan segera jika anda mendapati kombinasi gejala-gejala ini.

Sila dapatkan nasihat perubatan jika anda mengalami simptom-simptom berikut: "jall air" yang juga dikenali sebagai diuretik.

Sila jumpa doktor jika gejala masih berlanjutan.

Ubat ini mengandungi **PANACETOL**, Jangan mengambil sebarang ubat-ubatan lain yang mengandungi paracetamol pada masa yang sama.

AMARAN ALAHAN: Paracetamol boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk. Gejala-gejala termasuk kemerahan kulit, lepuh dan ruam. **Iti mungkin tanda-tanda reaksi alergi.** Jika reaksi ini berlaku, hentikan penggunaan ubat ini dan dapatkan nasihat perubatan dengan segera.

Jangan daripada kandungan dan capaian kanak-kanak. Keep out of the sight and reach of children.

Rujuk doktor doktor anda sebelum guna jika anda mengalami masalah atau ubat yang serupa bagi mencirikan darah.

Ikut petunjuk arahan dan contents yang ini mengandungi arahan dengan penggunaan dan ubat yang berkaitan dengan simptom-simptom risiko.

Perhatian: Ubat ini mengandungi paracetamol.

Kandungan dan Penyusutan

Kandungan

Tidak dikenali untuk diambil bersama kandungan, kecuali atau nasihat perubatan.

Not recommended for use during pregnancy, except in medical advice.

Paracetamol

Paracetamol mengandungi ubat yang sama dengan paracetamol, wanita hamil perlu mendapatkan nasihat perubatan sebelum mengambil paracetamol.

Not recommended for use during pregnancy, except in medical advice.

Ubat ini mengandungi paracetamol dan pamabrom.

6200000021800

[illegible]