

pharmaniaga®

Albendazole 200 mg

ZOBEN

TABLET

Treatment for common worm infections

DESCRIPTION

White to off white, round beveled edge tablet, embossed with a star design on one side and 'PMB' icon on the other side.

COMPOSITION

Each tablet contains Albendazole 200 mg.

PHARMACODYNAMICS

Albendazole causes degenerative alterations in the tegument and intestinal cells of the worm by binding to the colchicine-sensitive site of tubulin, thus inhibiting its polymerization or assembly into microtubules.

The loss of the cytoplasmic microtubules leads to impaired uptake of glucose by the larval and adult stage of the susceptible parasites, and depletes their glycogen stores. Degenerative changes in the endoplasmic reticulum, the mitochondria of the germinal layer, and the subsequent releases of lysosomes result in decreased production of adenosine triphosphate, which is the energy required for the survival of the helminth. Due to diminished energy production, the parasite is immobilized and eventually dies.

PHARMACOKINETICS

Albendazole is poorly absorbed from the gastro-intestinal tract, but rapidly undergoes extensive first-pass metabolism. The principle metabolite albendazole sulphoxide has anthelmintic activity and a plasma half-life of about 8.5 hours. It is excreted in the urine together with other metabolites including albendazole sulphone and the 2-amino sulphoxide and 2-amino sulphone.

INDICATIONS

Albendazole is used in the treatment of roundworm, pinworm, hookworm, threadworm (strongyloidiasis), and whipworm infections.

CONTRAINDICATIONS

Confirmed or suspected pregnancy, hypersensitivity to albendazole and hepatic function impairment.

ADVERSE REACTIONS

Since albendazole is poorly absorbed from the gastro-intestinal tract at the usual therapeutic doses, side effects have generally been restricted to gastro-intestinal disturbances, such as transient abdominal pain and diarrhoea, and have tended to occur in patients being treated for heavy intestinal infection.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

Albendazole is not recommended for use during confirmed or suspected pregnancy because of its teratogenic effects in animals. It is not known whether albendazole is distributed into breast milk. However, problems in humans have not been documented.

RECOMMENDED DOSAGE

Roundworm, whipworm, hookworm and pinworm infections:

Adults and children above 2 years:
2 tablets (400 mg) as a single dose.

Children 2 years:

1 tablet (200 mg) as a single dose.

Not recommended for children below 1 year of age.

Threadworm (Strongyloidiasis) infections:

Adults and children above 2 years:

2 tablets (400 mg) as a single dose for 3 days.

Children 2 years:

1 tablet (200 mg) as a single dose for 3 days.

Not recommended for children below 1 year of age.

Tablets can be chewed or crushed and mixed with food.

Treatment programme may be repeated in 2 to 3 weeks for heavy infection.

Albendazole should not be administered during confirmed or suspected pregnancy.

OVERDOSE AND TREATMENT

Since no specific antidote is known, recommended treatment of albendazole overdose consists of the following:

* Gastric lavage, which may be undertaken within the first 2 to 3 hours after ingestion.

* Supportive and symptomatic treatment.

ROUTE OF ADMINISTRATION

Oral

STORAGE CONDITIONS

Store below 30°C. Protect from light.

SHELF LIFE

Product should not be used beyond the expiry date imprinted on the product packaging.

PRESENTATION

In blisters of 2, 10 and 100 tablets.

Date of Revision: 21st July 2022

Product Registration Holder / Manufacturer:

Pharmaniaga Manufacturing Berhad (198001006232)

No.11A, Jalan P/1, Kawasan Perusahaan Bangi,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

PRP0166.10/ BRP0166.2 210722



pharma**niaga**[®]

Albendazole 200 mg

ZOBEN

TABLET

Rawatan untuk jangkitan kecacingan biasa

DISKRIPSI

Tablet putih-keputihan berbentuk bulat berlereng tepi, diukir dengan bentuk bintang pada sebelah permukaan dan cetakan 'PMB' pada sebelah permukaan lagi.

KOMPOSISI

Setiap tablet mengandungi Albendazole 200 mg.

FARMAKODINAMIK

Albendazole menyebabkan perubahan degenerative dalam sel-sel teguman dan usus cacing dengan mengikat pada bahagian-bahagian yang sensitive pada colchicines di tubulin dan seterusnya menghalang proses polimerisasi atau penghimpunan ke dalam mikrotubul.

Kehilangan mikrotubul sitoplasma akan merendahkan kadar pengambilan glukosa oleh larva dan parasit rentan peringkat dewasa serta menghabiskan stor glikogen mereka. Perubahan degeneratif pada retikulum endoplasmik, mitokondria lapisan germa dan seterusnya pembebasan lysosomes akan menghalang pengeluaran adenosine trifosfat yang berkurangan, iaitu sumber tenaga untuk helminth terus hidup. Penghasilan tenaga yang berkurangan akan melumpuhkan parasit dan memusnahkannya sama sekali.

FARMAKOKINETIK

Albendazole adalah sukar diserap dari usus, tetapi cepat menjalani metabolisme pas-pertama dengan meluas. Prinsip metabolit albendazole sulphoxide mempunyai aktiviti antihelmintic dan plasma separuh hayat kira-kira 8.5 jam. Ia dikumuhkan ke dalam air kencing berserta lain-lain metabolit termasuk albendazole sulphone dan 2-amino sulphoxide dan 2-amino sulphone.

INDIKASI

Albendazole digunakan untuk merawat jangkitan cacing gelang, cacing peniti, cacing kerawit, cacing benang (strongyloidiasis) dan jangkitan cacing cemeti.

KONTRAINDIKASI

Wanita hamil atau disyaki hamil, sensitif pada albendazole dan kerosakan fungsi hepatic.

KESAN ADVERS

Oleh kerana albendazole sukar diserap dari usus pada dos terapeutik biasa, maka kesan sampingan, umumnya terhad pada gangguan-gangguan usus seperti sakit perut dan cirit-birit sementara, dan cenderung kepada pesakit yang menjalani rawatan untuk jangkitan usus yang teruk.

AMARAN DAN PERHATIAN

Albendazole tidak sesuai digunakan untuk wanita yang sudah disahkan atau disyaki hamil kerana kesan teratogeniknya terhadap haiwan. Adalah tidak diketahui samada albendazole masuk ke dalam susu ibu. Namun demikian, kesan negative terhadap manusia tidak pernah dilaporkan.

SUKATAN YANG DISARANKAN

Jangkitan cacing gelang, cacing cemeti, cacing kerawit dan cacing peniti:

Dewasa dan kanak-kanak lebih 2 tahun:

2 tablet (400 mg) sebagai dos tunggal.

Kanak-kanak 2 tahun:

1 tablet (200 mg) sebagai dos tunggal.

Tidak disyorkan untuk kanak-kanak yang berumur bawah 1 tahun.

Jangkitan cacing benang (Strongyloidiasis):

Dewasa dan kanak-kanak lebih 2 tahun:

2 tablet (400 mg) sebagai dos tunggal untuk 3 hari.

Kanak-kanak 2 tahun:

1 tablet (200 mg) sebagai dos tunggal untuk 3 hari.

Tidak disyorkan untuk kanak-kanak yang berumur bawah 1 tahun.

Tablet boleh dikunyah atau dihancurkan dan dicampur dengan makanan. Program rawatan boleh diulangi selama 2 hingga 3 minggu untuk jangkitan teruk.

Albendazole tidak sepatutnya diambil semasa kehamilan atau disyaki hamil.

DOS BERLEBIHAN DAN RAWATAN

Oleh kerana tiada antidot spesifik dikenalpasti, rawatan yang dicadangkan untuk dos albendazole yang berlebihan adalah seperti berikut:

* Gastrik lavage, yang mungkin berlaku selepas 2 hingga 3 jam pengambilan.

* Rawatan sokongan dan simptomatik.

CARA PENGAMBILAN

Oral

KAEDAH PENYIMPANAN

Simpan dibawah suhu 30°C. Lindungi dari cahaya.

JANGKAHAYAT

Produk ini tidak boleh digunakan setelah tarikh luput seperti yang tertera pada pek pembungkusan.

PEMBUNGKUSAN

Blister dengan 2, 10 and 100 tablet.

Tarikh Kemaskini: 21hb Julai 2022

Pemegang Pendaftaran Produk / Pengeluar:
Pharmaniaga Manufacturing Berhad (198001006232)
No.11A, Jalan P/1, Kawasan Perusahaan Bangi,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

PRP0166.10/ BRP0166.2 210722

