

Vemizol 消虫速

Setiap 5ml mengandungi 200mg albendazole



Penerangan Produk:

Ampaian berwarna hampir putih dan berperisa susu.

Setiap 5ml mengandungi: Albendazole 200mg
Methylparaben 0.21% w / v
Propylparaben 0.031% w / v

Farmakodinamik:

Albendazole mempunyai sifat larvacidal, ovicidal dan vermicial. Ia menghalang pemplimoran tubulin, dengan itu mengurangkan tahap tenaga, melumpuhkan dan kemudian membunuh helminth yang terdedah.

Farmakokinetik:

Albendazole kurang diserap dari saluran gastrousus, tetapi pesat mengalami metabolisme first pass. Albendazole sulphoxide merupakan metabolit utama, mempunyai aktiviti antihelminthik dan separuh hayat plasma kira-kira 8.5 jam; ia dikumuh dalam air kencing bersama-sama dengan metabolit lain termasuk albendazole sulphone dan 2-amino sulfonida dan 2-amino sulphone.

Indikasi:

Jangkitan tunggal atau pelbagai parasit usus, Albendazole berkesan dalam rawatan Ascaris lumbricoides (cacing gelang), Trichuris trichiura (cacing cambuk), Enterobius vermicularis (cacing kerawit, cacing benang), Ancylostoma duodenale dan Necator americanus (cacing kait), H. nana dan Taenia sp (cacing pita), Strongyloides stercoralis dan Opisthorchis viverrini dan Opisthorchis sinensis.

Dos yang disorkan:

Untuk jangkitan cacing gelang, cacing cambuk, cacing kerawit atau cacing kait:
Dewasa dan kanak-kanak 2 tahun ke atas:
2 sudu teh (10ml) sebagai dos tunggal.
Kanak-kanak 1 hingga 2 tahun: 1 sudu teh (5ml) sebagai dos tunggal.

Untuk jangkitan cacing benang atau cacing pita:

Dewasa dan kanak-kanak 2 tahun ke atas:
2 sudu teh (10ml) sehari untuk 3 hari berturut-turut,
Kanak-kanak 1 hingga 2 tahun: 1 sudu teh (5ml) sehari untuk 3 hari berturut-turut.

Goncang sebelum ambil setiap dos.

Kontraindikasi:

Manfaat dan risiko harus dipertimbangkan untuk masalah perubahan berikut:

Intoleransi terhadap albendazole

Kerosakan fungsi hati: Separuh hayat albendazole dipanjangkan, pengumpulan ubat dalam badan mungkin berlaku mengakibatkan peningkatan kekerapan kesan sampingan, oleh itu dos harus dikurangkan.

Amaran dan pengawasan:

Sekiranya gejala berterusan, sila berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi anda. Jangan simpan ampaian Vemizol yang sudah tamat tempoh.

Penghamilan dan penyusuan:

Ubat ini dilarang sama sekali jika kehamilan telah disahkan atau disyaki.

Kesan Sampingan:

Gangguan gastro-usus (sakit perut, cirit-birit, mual atau muntah), sakit kepala dan rasa pening.

Gejala dan Rawatan Dos Berlebihan:

Sekiranya berlakunya dos berlebihan yang tidak disengajakan, gangguan gastro-usus mungkin akan berlaku secara berjangkang sehingga beberapa jam. Muntah harus dipaksa dan pembernsihan usus perlu dilakukan. Walau bagaimanapun, sila berjumpa dengan doktor anda secepat mungkin.

Kaedah Penyimpanan:

Simpan di tempat yang kering di bawah suhu 30 °C. Bekas ditutup dengan ketat. Terlindung daripada cahaya. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.

Saiz Pak:

10ml, 12x 10ml

Cara Penggunaan: Oral

Vemizol 悬浮液 产品信息注册资料

产品描述: 白色, 奶味的悬浮液。

每5ml (毫升) 含有: 200毫克
阿苯达唑 0.21% w / v
对羟基苯甲酸酯 0.031% w / v

药效学:

阿苯达唑具有杀幼虫、杀卵和杀蠕虫的特性。它抑制微管蛋白聚合, 从而消耗能量水平, 固定, 然后杀死易感蠕虫。

药代动力学:

阿苯达唑被胃肠道吸收的数量很少, 但迅速经历广泛的首过代谢。主要代谢物, 阿苯达唑亚硫酸具有驱虫活性, 血浆半衰期约为8.5小时; 它与其他代谢物 (包括阿苯达唑酮和2-氨基亚硫酸和2-氨基磺) 一起从尿液中排出。

适应症:

单一或混合的肠道寄生虫感染。阿苯达唑可有效治疗蛔虫, 鞭虫, 线虫, 钩虫, 绦虫等寄生虫感染。

推荐剂量:

蛔虫, 鞭虫, 钩虫, 蛲虫感染: 成年人及2岁以上的儿童: 10ml (2茶匙) 作为单次剂量。
1至2岁的儿童: 5ml (1茶匙) 作为单次剂量。

线虫或绦虫感染:

成年人及2岁以上的儿童: 10ml (2茶匙) 作为单次剂量, 连续服用3天。 1至2岁的儿童: 5ml (1茶匙), 每日一次, 连续3天。
每次剂量前摇匀。

禁忌症:

应考虑以下医疗问题的风险收益:

阿苯达唑不耐症

肝功能损害: 阿苯达唑的半衰期延长, 可能会导致药物积聚于体内, 从而增加副作用的发生率, 因此剂量应减少。

警告和注意事项:

如果症状持续发生, 请咨询医生或药剂师。不要保存过期的Vemizol 悬浮液。

怀孕和哺乳:

在确认或疑似怀孕期间应严禁使用该药。

不良反应:

胃肠道紊乱 (腹痛或不适, 腹泻, 恶心或呕吐), 头痛和眩晕。

过量症状和治疗:

如果发生药物过量服用的症状, 有可能会引发持续长达数小时的胃肠道疾病。因此应立即催吐及泻胃。尽管如此, 还是要尽快咨询您的医生。

储存条件:

保持容器密封。储存在30 °C以下的干燥处。防光。请将本品放在儿童不能接触的地方。

包装大小:

10ml, 12x 10ml

服用方法: 口服

Product Registration Holder:

DUOPHARMA MANUFACTURING (BANGI) SDN. BHD.

Lot No.2,4,6,8 & 10, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia.



Manufacturer:

DUOPHARMA MANUFACTURING (BANGI) SDN. BHD.

Lot No.2 & 4, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia.

1500008928 N.1
Revision Date: Dec 2021