

CHAMPS D-Worms Suspension 200mg/5ml

Setiap 5ml mengandungi 200mg albendazole



Produk Deskripsi:

Suspensi berwarna putih dan berperisa susu

Setiap 5ml mengandungi: Albendazole 200mg
Methylparaben 0.21% w / v
Propylparaben 0.031% w / v

Farmakodinamik:

Albendazole mempunyai sifat larvicidal, ovcidal dan vermicial, ia menghalang penggempuran tubulin, dengan itu mengurangkan tahap tenaga, melumpuhkan dan kemudian membunuh helminth yang terdedah.

Farmakokinetik:

Albendazole kurang diserap dari saluran gastrousus, tetapi pesat mengalami metabolisme first pass. Albendazole sulphoxide merupakan metabolit utama, mempunyai aktiviti antihelminthik dan separuh hayat plasma kira-kira 8.5 jam; ia dikumuh dalam air kencing bersama-sama dengan metabolit lain termasuk albendazole sulphone dan 2-amino sulfonida dan 2-amino sulphone.

Indikasi:

Digunakan untuk merawat jangkitan tunggal atau pelbagai cacing termasuk cacing gelang, cacing cambuk, cacing kait, cacing benang, cacing kerawit dan cacing pita.

Dos yang Dicadangkan:

Untuk jangkitan cacing gelang, cacing cambuk, cacing kait atau cacing kerawit

Kanak-kanak 1 hingga 2 tahun:

Ambil 1 sudu teh (5ml), sebagai dos tunggal.

Kanak-kanak 2 tahun ke atas dan dewasa:

Ambil 2 sudu teh (10ml), sebagai dos tunggal.

Untuk jangkitan cacing benang atau cacing pita

Kanak-kanak 1 hingga 2 tahun:

Ambil 1 sudu teh (5ml), setiap hari selama 3 hari berturut-turut.

Kanak-kanak 2 tahun ke atas dan dewasa:

Ambil 2 sudu teh (10ml), setiap hari selama 3 hari berturut-turut.

Untuk jangkitan pelbagai cacing

Ambil 2 sudu teh (10ml) dua kali sehari selama 3 hari berturut-turut.

Goncang sebelum ambil setiap dos.

Kontraindikasi:

Albendazole dikenali sebagai teratogenik dan embriotoksik pada tikus dan anab. Oleh itu, Albendazole tidak disyorkan untuk digunakan pada wanita hamil atau sedang merancang mengandung. Wanita yang mengandung harus mengambil ubat dalam masa 7 hari selepas permulaan haid.

Hipersensitiviti terhadap Albendazole.

Masalah perubatan lain, terutamanya gangguan fungsi hepatic.

Amaran dan pengawasan:

Sila berjumpa doktor anda jika gejala masih berlanjutan selepas rawatan

Kehamilan atau penyusuan:

Albendazole tidak disyorkan untuk digunakan pada wanita hamil atau pada wanita yang merancang mengandung.

Kesan Sampungan:

Gangguan gastro-usus (sakit perut, cirit-birit, mual atau muntah), sakit kepala dan rasa pening.

Gejala dan Rawatan Dos Berlebihan:

Tidak ada penawar khusus yang diketahui, rawatan dos berlebihan albendazole yang disyorkan terdiri daripada yang berikut:
- Lavage gastrik, yang mungkin dilakukan dalam 2 hingga 3 jam pertama setelah dimakan.
- Rawatan sokongan dan simptomatik.
- Gangguan gastro-usus (sakit perut, cirit-birit, mual dan muntah) mungkin berlaku dan boleh berlarutan hingga beberapa jam.

Kaedah Penyimpanan:

Simpan di tempat yang kering di bawah suhu 30 °C. Bekas ditutup dengan ketat. Terlindung daripada cahaya. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.

Saiz Pek:

10ml & 12 x 10ml

Cara Penggunaan: Oral

Suspensi Produk Informasi Pendaftaran

Produk ini berwarna putih, berperisa susu.

Produk ini (5ml) mengandungi:

Albendazole 200mg
Methylparaben 0.21% w / v
Propylparaben 0.031% w / v

Kelebihan:

Albendazole mempunyai sifat larvicidal, ovcidal dan vermicial, ia menghalang penggempuran tubulin, dengan itu mengurangkan tahap tenaga, melumpuhkan dan kemudian membunuh helminth yang terdedah.

Farmakodinamik:

Albendazole kurang diserap dari saluran gastrousus, tetapi pesat mengalami metabolisme first pass. Albendazole sulphoxide merupakan metabolit utama, mempunyai aktiviti antihelminthik dan separuh hayat plasma kira-kira 8.5 jam; ia dikumuh dalam air kencing bersama-sama dengan metabolit lain termasuk albendazole sulphone dan 2-amino sulfonida dan 2-amino sulphone.

Indikasi:

Digunakan untuk merawat jangkitan tunggal atau pelbagai cacing termasuk cacing gelang, cacing cambuk, cacing kait, cacing benang, cacing kerawit dan cacing pita.

Dos yang Dicadangkan:

Untuk jangkitan cacing gelang, cacing cambuk, cacing kait atau cacing kerawit

Kanak-kanak 1 hingga 2 tahun:

Ambil 1 sudu teh (5ml), sebagai dos tunggal.

Kanak-kanak 2 tahun ke atas dan dewasa:

Ambil 2 sudu teh (10ml), sebagai dos tunggal.

Untuk jangkitan cacing benang atau cacing pita

Kanak-kanak 1 hingga 2 tahun:

Ambil 1 sudu teh (5ml), setiap hari selama 3 hari berturut-turut.

Kanak-kanak 2 tahun ke atas dan dewasa:

Ambil 2 sudu teh (10ml), setiap hari selama 3 hari berturut-turut.

Untuk jangkitan pelbagai cacing

Ambil 2 sudu teh (10ml) dua kali sehari selama 3 hari berturut-turut.

Goncang sebelum ambil setiap dos.

Kontraindikasi:

Albendazole dikenali sebagai teratogenik dan embriotoksik pada tikus dan anab. Oleh itu, Albendazole tidak disyorkan untuk digunakan pada wanita hamil atau sedang merancang mengandung. Wanita yang mengandung harus mengambil ubat dalam masa 7 hari selepas permulaan haid.

Hipersensitiviti terhadap Albendazole.

Masalah perubatan lain, terutamanya gangguan fungsi hepatic.

Amaran dan pengawasan:

Sila berjumpa doktor anda jika gejala masih berlanjutan selepas rawatan

Kehamilan atau penyusuan:

Albendazole tidak disyorkan untuk digunakan pada wanita hamil atau pada wanita yang merancang mengandung.

Kesan Sampungan:

Gangguan gastro-usus (sakit perut, cirit-birit, mual atau muntah), sakit kepala dan rasa pening.

Gejala dan Rawatan Dos Berlebihan:

Tidak ada penawar khusus yang diketahui, rawatan dos berlebihan albendazole yang disyorkan terdiri daripada yang berikut:
- Lavage gastrik, yang mungkin dilakukan dalam 2 hingga 3 jam pertama setelah dimakan.
- Rawatan sokongan dan simptomatik.
- Gangguan gastro-usus (sakit perut, cirit-birit, mual dan muntah) mungkin berlaku dan boleh berlarutan hingga beberapa jam.

Kaedah Penyimpanan:

Simpan di tempat yang kering di bawah suhu 30 °C. Bekas ditutup dengan ketat. Terlindung daripada cahaya. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.

Saiz Pek:

10ml & 12 x 10ml

Cara Penggunaan: Oral



Product Registration Holder :
DUOPHARMA MANUFACTURING (BANGI) SDN. BHD.
Lot No. 2, 4, 6, 8 & 10, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia.

Manufacturer :
DUOPHARMA MANUFACTURING (BANGI) SDN. BHD.
Lot No. 2 & 4, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia.

1500011214 N.1
Revision Date: Oct 2021

Champs D Worms Strawberry Leaflet (w)128mm x (h) 130mm

Pantone 1785 C

Black 100%