

IKOP® Paracetamol Honey Suspension 250mg/5mL

Nama dan Komposisi Bahan Aktif (w/v)

Paracetamol 250 mg/5 mL

Pengawet

Sodium Methylparaben 0.08 %w/v

Sodium Propylparaben 0.02 %w/v

Penerangan Produk

Cecair berwarna coklat *tortilla* dengan bau madu

Farmakodinamik

Paracetamol bertindak sebagai penahan sakit (analgesik) dan melegakan demam di samping bertindak secara minimum sebagai anti-radang.

Analgesik

Mekanisma sebagai penahan sakit masih belum difahami secara keseluruhan. *Paracetamol* bertindak dengan mengurangkan penghasilan *prostaglandin* dengan cara menghalang enzim *cyclooxygenase (COX)-2* di sistem saraf tunjang, dan memberi kesan secara periferal dengan cara menghalang penghasilan rasa sakit.

Kesan secara periferal juga adalah kerana terhalangnya penghasilan *prostaglandin* atau bahan-bahan lain yang merangsang deria sakit disebabkan oleh rangsangan kimia dan mekanikal.

Anti-piretik

Paracetamol bertindak secara berpusat ke atas pusat kawalan haba di *hypothalamus* dengan menghasilkan pengembangan saluran darah sekali gus melancarkan aliran darah ke kulit, menyebabkan berpeluh dan pengeluaran haba.

Paracetamol melegakan demam dengan cara menghalang penghasilan dan pelepasan *prostaglandin* ke sistem saraf tunjang dan juga menghalang aktiviti *pyrogen-pyrogen* di pusat kawalan haba yang terletak di *hypothalamus*.

Farmakokinetik

Penyerapan

Paracetamol diserap dengan cepat sejurus selepas pengambilannya.

Penyerapan *paracetamol* berlaku terutamanya di dalam usus kecil dan kadar penyerapan bergantung kepada kadar pengosongan usus dan perut (gastrik). Ubat yang melambatkan pengosongan gastrik juga melambatkan penyerapan *paracetamol*, sementara ubat *metoclopramide* (ubat yang meningkatkan kadar pengosongan gastrik), meningkatkan kadar penyerapan *paracetamol*.

Makanan di dalam perut juga mengurangkan kadar penyerapan *paracetamol*. Perubahan pH perut tidak memberi kesan kepada penyerapan *paracetamol*.

Semasa proses penyerapan, jumlah *paracetamol* yang dinyahaktif boleh diabaikan dan ianya tidak memberi kesan kepada ketelapan lapisan mukosa perut dan juga tidak menyebabkan pendarahan mukosa.

Paras kandungan ubat di dalam darah yang paling tinggi dicapai dalam anggaran 10-60 minit selepas penyerapan. Jangka separuh hayatnya ialah satu ke tiga jam.

Pengedaran

Paracetamol menembusi lapisan otak dan boleh terkandung dalam susu ibu.

Metabolisma

Sistem enzim mikrosomal hati bertanggungjawab terhadap metabolisma *paracetamol*, terutamanya melalui penggabungan glukoronik (49%) dan sulfat (26%) daripada jumlah dos yang diambil. Sebanyak 4% *paracetamol* dikumuh menjadi partikel bebas. Lain-lain alternatif termasuklah penghasilan terbitan *catechol* dan penggabungan *cysteine* (melalui *glutathione*).

Perkumuhan

Paracetamol dikumuh dengan cepat melalui air kencing.

Indikasi

Melegakan demam, sakit akibat selesema, sakit gigi, ketidakselesaian gigi dan demam selepas vaksinasi.

Dos yang disarankan

Untuk dos yang lebih tepat, disarankan untuk menggunakan berat badan anak anda untuk pengiraan dos yang diperlukan. Pengiraan adalah berdasarkan saranan dos 15mg *Paracetamol* bagi setiap kg berat badan . Cara pengiraan adalah seperti berikut:

Dos (ml) = Berat (kg) x 15mg x $\frac{5ml}{250mg}$

Panduan di bawah adalah berdasarkan kepada purata berat-umur kanak-kanak.

Berat (kg)	Umur	Dos (mg)	Dos (ml)
20	6	300	6.0
22-28	7-9	330-420	6.5-8.5
32-40	10-12	480-600	9.5-12.0

Jangan beri ubat ini melebihi 4 kali sehari

Cara pengambilan

Ambil secara *oral*.

Kontraindikasi

Alahan teruk kepada *paracetamol* atau mana-mana bahan-bahan / komponen lain produk. Kemerosotan buah pinggang atau hati yang teruk.

Amaran dan Pencegahan

Ubat ini mengandungi *PARACETAMOL*. Jangan ambil ubat lain yang mengandungi *PARACETAMOL* pada masa yang sama.

- Dilarang ambil jika ada alahan terhadap *paracetamol*.
- Amaran Alahan: *Paracetamol* boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk. Gejala mungkin termasuk kemerahan kulit, lepuh atau ruam. Ini boleh menjadi tanda keadaan yang serius. Sekiranya tindak balas ini berlaku, hentikan penggunaan dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera.
- Kesan Buruk: Reaksi kulit hipersensitiviti termasuk ruam kulit, *angioedema*, *Steven Johnson* / nekrosis epidermis toksik telah dilaporkan.
- Ubat ini melegakan gejala simptomatik sahaja. Ubat tambahan untuk merawat penyebab kesakitan atau demam boleh diambil jika perlu.

- Jika gejala masih berlarutan, pesakit harus berjumpa doktor (jika kesakitan masih berlarutan lebih daripada 10 hari, dan jika kemerahan atau demam berlarutan lebih dari 3 hari).
- Perkara yang perlu diberi perhatian. *Paracetamol* boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk. Simptom termasuklah kemerahan, lecur atau keradangan. Simptom-simptom ini boleh membawa kepada masalah yang lebih serius.Jika reaksi ini berlaku, segera dapatkan nasihat doktor.
- Ubat ini harus digunakan secara berhati-hati kepada pesakit yang mempunyai kegagalan buah pinggang dan hati. Pesakit yang memiliki kegagalan hati harus mengelakkan daripada mengambil dos *paracetamol* yang banyak. Gejala dos berlebihan boleh membahayakan hati.
- Jangan melebihi dos yang disarankan.
- Segera jumpa doktor jika terambil dos ubat ini secara berlebihan walaupun kanak-kanak tidak menunjukkan gejala dos berlebihan.
- Jauhi ubat ini dari kanak-kanak.

Interaksi dengan Ubatan Lain

Paracetamol tidak boleh diambil bersama dengan alkohol, *cholestyramine* (mengurangkan penyerapan *Paracetamol*), *Warfarin* (penggunaan berpanjangan *Paracetamol* meningkatkan *Warfarin*), dan *Metoclopramide* dan *Domperidone* (mempercepatkan penyerapan *Paracetamol* (kesan yang dipertingkatkan)).

Pernyataan Penggunaan Semasa Hamil dan Menyusu

Data klinikal pada wanita hamil dan menyusu adalah terhad. Keselamatan untuk penggunaannya belum disahkan sepenuhnya. Oleh itu, potensi manfaat produk perlu dipertimbangkan dengan risiko yang mungkin berlaku kepada para ibu dan janin.

Kesan Sampingan

IKOP® *Paracetamol* Honey Suspension 250mg/5mL boleh menyebabkan:

- Hipersensitiviti kulit, termasuklah ruam, bengkak,sindrom Steven Johnson/ Epidermal Necrolysis Toksik
- Gangguan darah seperti *thrombocytopenia* dan *leukopenia*
- Kerosakan hati dan buah pinggang, jika diambil secara berlebihan – Hal ini boleh menyebabkan maut dalam kes-kes yang kronik

Gejala Dos Berlebihan dan Rawatannya

Gejala Dos Berlebihan

Gejala dos berlebihan termasuklah : muntah, sakit perut, berpeluh, rangsangan system saraf tunjang yang menyebabkan kegembiraan dan sawan pada kanak-kanak, mengantuk, kesukaran bernafas, sianosis (perubahan warna biru yang tidak normal pada kulit) dan kegagalan hati. Gejala yang paling serius untuk dos akut berlebihan adalah dos kebergantungan, berkemungkinan menyebabkan nekrosis hati yang membawa maut. Bukti klinikal dan makmal untuk keracunan hepatic mungkin mengambil masa satu minggu. Manifestasi utama untuk kegagalan hati termasuklah demam kuning, hipoglisemia dan asidosis metabolik yang mungkin mengambil masa paling kurang 3 hari untuk terjadi.

Jika anda fikir anda atau orang lain mungkin terlebih mengambil IKOP® *Paracetamol* Honey Suspension 250mg/5mL, hubungi doktor anda untuk mendapatkan nasihat atau pergi ke bahagian kecemasan hospital yang terdekat dengan segera. Ini mesti dilakukan walaupun tiada tanda ketidakselesaian atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan dengan segera.

Rawatan

Perut hendaklah dikosongkan dengan lavaj atau administrasi karbon teraktif. Jika terdapat sejarah pengambilan 15 g *Paracetamol* atau lebih, penawar seperti berikut boleh digunakan:

Acetylcysteine 20% iv: melalui administrasi intravena, 20% *acetylcysteine* diberi dengan segera tanpa menunggu keputusan positif ujian air kencing atau ujian darah. Dos permulaan adalah 150 mg/kg selama 15 minit, diikuti dos berterusan iaitu 50 mg/kg dalam 500 mL 5% glukosa/*dextrose* selama 4 jam dan 100 mg/kg dalam 1L 5% glukosa/*dextrose* selama 16 jam; atau

Methionine Oral: 2.5 g dengan segera diikuti dengan tiga dos seterusnya iaitu 2.5 g selang 4 jam. Untuk kanak-kanak berusia 3 tahun, 1 g *methionine* diberikan setiap 4 jam untuk 4 dos; atau

Acetylcysteine 5% *oral*: 140 mg/kg sebagai dos pukal, selepas itu 70 mg/kg setiap 4 jam untuk jumlah 17 dos pengekalan. Jika lebih dari 10 jam sejak dos berlebihan diambil, penawar mungkin tidak berkesan.

Cara Penyimpanan

Pastikan bekas ubat tertutup rapat. Simpan di bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya.

Pembungkusan/Kemasan

Suspensi di dalam botol 100 mL.

Pemegang Pendaftaran Produk dan Pengilang:

IKOP® Sdn. Bhd.,
Jalan Sultan Ahmad Shah,
Bandar Indera Mahkota,
25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur,
Malaysia.

Tarikh Kemaskini Risalah Ubat

21/05/2019

