

FRONT



3

V1 18 - Dec - 2024		Artwork Information Panel				HALEON	
Non Production Artwork ☐		Production Artwork ☒				Component No: 62000000215784 AWP No: TR3400170/A	
Total Number of Colours including Varnish & Foils: 1						Manufacturing Site: Kuala Lumpur Other South American Artwork will have Mark in this field	
						Approving Market: Malaysia	
Black 1.						Technical Drawing No: IMA_C80_INS_131X208	
						Material Spec No: N/A Other South American Artwork will have Mark in this field	
						Body Text Size: 8.0pt Smallest Text Size: 5.7pt For all other artwork, please refer to the artwork specification	
Total Special Finishes: 0						Electronic Verification Code: 2162	
						Printer and User notes: N/A	
Studio Location: Asia							

Barcode Info	
Barcode Type	Pharmacode Standard
Barcode Number:	2162
Magnification:	100
BWR:	0 Micrometre

NOTE: FLIP PAGES
ON LONG EDGE

BACK

131.0

10.0

10.0

7.0

208.0

25.5

7.0

2.0

8.0

PHARMA CODE REF. IS:
2
1
6
2

VARIA/BLE

Penyesuaian

Paracetamol dikeluarkan dalam susu ibu tetapi tidak dalam kuantiti yang ketara secara klinikal dengan dos yang disyorkan. Data yang diterbitkan tidak menghalang penyesuaian.

Kesan Sampingan

Hentikan pengambilan ubat ini dan beritahu doktor serta-merta jika anda:
• mengalami reaksi alahan seperti ruam kulit atau gatal-gatal, adakala beserta masalah pernafasan atau bengkak bibir, lidah, tekak atau muka
• mengalami ruam kulit atau pengelupasan atau ulser dalam mulut
• pernah mengalami masalah pernafasan dengan aspirin atau ubat anti-radang tanpa steroid, dan mengalami reaksi yang serupa dengan produk ini
• mengalami lebam atau pendarahan yang tidak diketahui puncanya

Reaksi-reaksi ini jarang berlaku.

Daripada data pasca pemasaran, reaksi-reaksi di bawah ini sangat jarang berlaku:
Trombositopenia, Anafilaksis, reaksi hipersensitiviti kulit termasuk, antara lain, ruam kulit, angioedema, sindrom *Stevens-Johnson* dan Nekrolisis Epidemis Toksik, Bronkospasme pada pesakit yang sensitif terhadap aspirin dan NSAID lain, disfungsi hepatic.

Gejala-gejala dan Rawatan Terlebih Dos

Jika terambil dos berlebihan, dapatkan nasihat doktor dengan segera walaupun anda tidak mengalami sebarang gejala kerana risiko kerosakan hati.

Gejala dan Tanda

Pengambilan dos paracetamol yang berlebihan boleh menyebabkan kegagalan hati yang mungkin memerlukan pemindahan hati atau menyebabkan kematian. Pankreatitis akut telah diperhatikan, biasanya dengan disfungsi hati dan keracunan hati.

Rawatan

Tindakan rawatan perubatan diperlukan segera sekiranya berlaku dos berlebihan, walaupun tidak ada gejala akibat terlebih dos. Sekiranya berlebihan dos disahkan atau disyaki, dapatkan nasihat segera daripada Pusat Racun Negara dan rujuk pesakit ke Pusat Perubatan Kecemasan terdekat untuk rawatan pakar. Ini harus dilakukan walaupun pada pesakit tanpa gejala dan tanda terlebih dos kerana risiko kerosakan hati yang tertunda.

Penglibatan N-acetylcysteine atau methionine mungkin diperlukan.

Dos tinggi *sodium bicarbonate* dijangka dapat mendorong gejala-gejala gastrointestinal termasuk bersendawa dan loya. Di samping itu, dos tinggi *sodium bicarbonate* boleh menyebabkan hipernatraemia; elektrolit perlu dipantau dan pesakit harus diuruskan dengan rawatan yang sewajarnya.

Pusat Racun Negara (Telefon (Isnin-Jumaat 8am-10pm & Sabtu, Ahad, Cuti Umum 8am-5pm): +604-6536999; Laman web: <https://prn.usm.my/>).

Kesan Keupayaan Memandu dan Menggunakan Mesin

Kurang berkemungkinan memberi kesan kepada keupayaan memandu dan menggunakan mesin.

Farmakodinamik

Mekanisme Tindakan

Paracetamol adalah sejenis analgesik dan antipiretik. Mekanisme tindakannya dipercayai termasuk perencatan sintesis prostaglandin, terutamanya di dalam pusat sistem saraf.

Kesan-kesan Farmakodinamik

Kekurangan perencatan prostaglandin periferal menghasilkan sifat farmakologi yang penting seperti pemeliharaan prostaglandin pelindung di dalam saluran gastrousus.

Oleh itu, paracetamol adalah sangat sesuai untuk pesakit yang mempunyai sejarah penyakit atau yang sedang mengambil ubat bersamaan, di mana perencatan prostaglandin periferal tidak diperlukan (seperti, sebagai contoh, mereka yang mempunyai sejarah pendarahan gastrousus atau orang-orang tua). *Sodium Bicarbonate* tidak mempunyai aktiviti analgesik yang diketahui.

Farmakokinetik

Penyerapan

Paracetamol diserap dengan pantas dan hampir keseluruhannya daripada saluran gastrousus.

Pengagihan

Pautan kepada protein plasma adalah minimum pada kepekatan terapeutik.

Metabolisme

Paracetamol dimetabolismekan di dalam hati dan dikeluarkan melalui air kencing terutamanya sebagai konjugat glukuronida dan sulfat.

Penyingkiran

Kurang daripada 5% dikeluarkan sebagai paracetamol yang tidak diubahsuai.

Dalam kajian farmakokinetik sukarelawan manusia, min kepekatan plasma maksimum dapat dicapai sekurang-kurangnya dua kali lebih cepat dengan tablet yang pantas diuraikan berbanding dengan tablet paracetamol standard dengan pengambilan kedua-dua pada dos satu dan dua tablet, dan ini adalah signifikan secara statistik.

Tahap penyerapan untuk tablet cepat larut adalah bersamaan dengan tablet paracetamol standard seperti yang ditunjukkan oleh AUC (kawasan di bawah lengkung) pada dos satu dan dua tablet.

Cara Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C.

Saiz Pek

10, 20, 30, 100 dan 120 kaplet.

Bukan semua saiz pek dipasarkan.

Tarikh Dikemaskini

September 2024

Dikilangkan oleh:

Haleon (Suzhou) Pharmaceutical Co., Ltd.
699 Gangpu Road, Wusongjiang Science and Technology Industrial Park
Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou Jiangsu Province 215124
People's Republic of China

Untuk Pemegang Pendaftaran Produk:

Haleon Malaysia Sdn. Bhd. (Registration No: 195901000115 (3467-XI), Lot 89, Jalan Enggang, Ampang/Hulu Kelang Industrial Estate, 68000 Ampang, Selangor, Malaysia.

Diedarkan di Brunei oleh

Kingston Beverage & Creamery Sdn. Bhd.
Plot 73, Lot 3, 4, 5 & 6, Beribi Industrial Complex, Jalan Gadong BE1118, Negara Brunei Darussalam

  mystory.my@haleon.com  1800 88 3225

Cap dagangan adalah dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kumpulan Syarikat Haleon.
©2024 kumpulan Syarikat Haleon atau pemberi lesennya.

6200000215784

SPECIFICATION NO. TO BE PLACED HERE

ITEMCODE TO BE PLACED HERE

V1		Artwork Information Panel				HALEON	
18 - Dec - 2024							
Non Production Artwork		☐	Production Artwork		☒	Component No: AWP No: 62000000215784TR3400170/A	
Total Number of Colours including Varnish & Foils:		1		Manufacturing Site: Kuala Lumpur		Approving Market: Malaysia	
1. Black						Technical Drawing No: IMA_C80_INS_131X208	
						Material Spec No: N/A	
						Body Text Size: 8.0pt	
						Smallest Text Size: 5.7pt	
Total Special Finishes:		0		Electronic Verification Code: 2162		Printer and User notes: N/A	
Studio Location: Asia							

Barcode Info	
Barcode Type	Pharmacode Standard
Barcode Number	2162
Magnification	100
BWR	0 Micrometre

TECHNICAL INFORMATION

TEXT FREE AREA

R

PHARMACODE AREA

TEXT / GRAPHICS FREE

AREA BEHIND PHARMACODE TO BE TEXT/GRAPHICS FREE.

CODE LENGTH: VARIABLE

BAR HEIGHT: 08.0

CUT LINE

NOTE:

GSK LOGO AREA IS MARKET REQUIREMENT. IT CAN BE PLACED ANYWHERE DURING THE ARTWORK CREATION.

AMENDMENTS

1

FIRST ISSUE. CO-0102263.

2

AMENDED PHARMACODE. CO-0127693.

3

ORIENTATION TEXT ADDED FOR LANDSCAPE ORIENTATION. CO-0018150.

DRAWING OWNER (SITE)

KUALA LUMPUR

PAN EXTRA CAPLET INSERT;
PAN COLD INSERT U/F(S);
PAN ACT INSERT(S);
PAN ACT INSERT(HK);
PAN C&F INSERT U/F(HK);
P.EXTRA ADVANCE INSERT(HK);
BPI INSERT (HK);
PANADOL C&F EXTRA INSERT (HK);
PAN EXTRA INSERT TAIWAN;
PAN ACT INSERT(TWN);
BPI INSERT(TWN)

PACKAGING MATERIAL DRAWING
PACK ARTWORK SHARED SERVICE

gsk

DRAWING No.

VERSION

3

COPYRIGHT AND DESIGN RIGHT IS THE PROPERTY OF THE GLAXOSMITHKLINE GROUP OF COMPANIES

IMA_C80_INS_131X208_DRW

SCALE: 1:1

GENERAL DRAWING TOLERANCE UNLESS STATED OTHERWISE

ALL DIMS. IN MILLIMETRES

N/A

champs

HALEON

Production Artwork Workflow

03-JAN-2025 2:29

EASTERN TIME ZONE (GMT-4)