

田七风油

田七风油是一种含有 3 种活性成分的制剂，即水杨酸甲酯、薄荷冰和樟脑。

这种特殊的制剂可以缓解疼痛和酸痛，涂抹后可以产生清爽凉爽的感觉。

配方：活性成分：水杨酸甲酯25%，薄荷冰16%，樟脑5%。

产品描述：无色易挥发油，具有强烈的特征芳香气味。

给药途径：局部

适应症：用于缓解肌肉和关节的轻微疼痛和疼痛。

用法：将油涂抹在患处，每天揉搓 3 至 4 次。此药仅供外用。

禁忌：

此产品可引起抽搐。2岁以下儿童也禁用。治疗年龄较大的儿童时必须谨慎。避免直接应用到鼻孔。

警告与注意事项：将含有樟脑的产品放入儿童鼻孔是很危险的。少量涂抹之中可能会导致立即崩溃。剧烈摩擦是不可取的。避免接触眼睛或开放性伤口。此产品含有水杨酸甲酯，当使用或涂抹在皮肤上时，可通过皮肤吸收进入血液

药物相互作用：对于服用华法林的患者，因肌肉或关节疼痛而过度涂抹在皮肤上可能会增加出血的机会。

怀孕和哺乳期：尚未确定在怀孕期间使用的安全性，因此应权衡产品的潜在益处与对母亲和孩童的可能风险。

副作用：此产品会引起轻微的皮肤刺激或皮肤红疹，但这些都是此产品的预期效果。由于搽剂是一种抗刺激剂和发红剂，因此刺激和红疹是预期的作用。

过量服用的症状和治疗：过量使用可能会导致皮肤过敏刺激。
误用：吞服药油可能会导致呕吐和腹泻等胃肠道症状。治疗应是对症的。大量误食后出现急性中毒，表现为恶心、呕吐、腹痛、头痛、眩晕、潮热、抽搐、呼吸抑制和昏迷。对有严重胃肠道或神经系统中毒症状的患者应进行观察和对症处理。不要催吐。

储存条件：储存于30°摄氏度以下干燥处。请将本产品放在远离儿童接触不到的地方

包装尺寸：5ml、10ml、30ml 玻璃瓶。

保质期：4年。

修订日期 2022 年 6 月 24 日

注册号码：MAL19963263X

产品注册持有人 / 制造商：

安全药行
门牌48-2 & 50-2, 13/34A路
甲洞鸿图园工业区
甲洞路52100吉隆坡
吉隆坡联邦直辖区 马来西亚

THIANCHIK MEDICATED OIL

Thianchik Medicated Oil is a preparation with 3 active ingredients namely Methyl Salicylate, Menthol and Camphor.

This special preparation relieves pains and aches and can produce a refreshing and cool feeling after application.

Formula: Active Ingredients: Methyl Salicylate.... 25% Menthol....16% Camphor....5%

Product Description: Colourless volatile oil with a strong characteristic aromatic odour.

Route of Administration: Topical

Indications: For the symptomatic relief of minor aches and pains of muscles and joints.

Administration: Apply the oil on to the affected part with rubbing 3 to 4 times daily. This medication is for external use only.

Contraindications:

This product can cause Convulsion. It is also contraindicated in children below 2 years of age. Caution must be exercised when older children are treated. Avoid direct application into the nostrils.

Warnings and Precautions: It is dangerous to place any camphor containing product into the nostrils of children. A small amount applied in this way may cause immediate collapse. Vigorous rubbing is not desirable. Avoid contact with the eyes or open wounds. This product contains methyl salicylate and when applied or rub on to the skin, can be absorbed through the skin into the blood.

Drug Interactions: For patients taking warfarin, excessive application on to the skin for muscle or joint pains may increase the chances of bleeding.

Pregnancy and Lactation: Safety for use in pregnancy has not been established, therefore the potential benefit of the product should be weighed against the possible risks to the mother and child.

Side Effects: This product can induce a mild irritation or erythema of the skin, however, these are the desired effects of the product. Since the liniment is a counter-irritant and rubefacient, irritation and erythema are expected actions.

Symptoms and Treatment of Overdose: Over dosage may result in skin irritation. Misuse: Swallowing of the medicated oil might cause gastrointestinal symptoms like vomiting and diarrhoea. Treatment is symptomatic. Acute poisoning was observed after significant accidental consumption, with nausea, vomiting, abdominal pain, and headache, vertigo, feeling hot flushing, convulsions, respiratory depression and coma. Patients with severe gastrointestinal or neurological symptoms of poisoning should be observed and treated symptomatically. Do not induce vomiting.

Storage Condition: Store in a dry place below 30° Celcius. Keep out of reach of children.

Pack Size: 5 ml, 10 ml and 30 ml glass bottle

Shelf Life: 4 years

Date of Revision: 24 June 2022

Registration Number: MAL19963263X

Product Registration Holder/Manufactured By:
SYARIKAT SAFETY MEDICAL
No. 48-2 & 50-2, Jalan 13/34A, Kepong Entrepreneur's Park, Off Jalan Kepong,
52100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia.

MINYAK ANGIN THIANCHIK

Minyak Angin Thianchik adalah satu persediaan yang mengandungi 3 bahan aktif iaitu Metil Salisilat, Mentol dan Kamfor.

Persediaan istimewa ini melegakan sakit-sakit otot dan sendi dan menghasilkan rasa segar dan dingin selepas disapu.

Formula: Bahan Aktif: Metil Salisilat.... 25% Mentol....16% Kamfor....5%

Deskripsi Produk: Minyak meruap tidak berwarna yang mempunyai bau aromatik yang kuat.
Cara Penggunaan: Topikal

Indikasi: Untuk melegakan gejala sakit-sakit otot dan sendi yang ringan.

Penggunaan: Sapukan minyak pada bahagian badan yang sakit dengan menggosok 3 hingga 4 kali sehari. Persediaan ini adalah untuk kegunaan luar sahaja

Kontraindikasi:

Produk ini boleh menyebabkan kekejangan. Dilarang untuk kegunaan pada kanak-kanak berumur kurang dari 2 tahun. Berhati-hati ketika digunakan untuk merawat kanak-kanak dewasa. Elakkan dari menggunakan minyak terus ke dalam lubang hidung.

Amaran dan Perhatian: Adalah berbahaya sekiranya produk yang mengandungi kamfor digunakan terus ke dalam lubang hidung kanak-kanak. Kuantiti kecil yang digunakan dengan cara ini boleh menyebabkan rebah dengan serta-merta (immediate collapse). Menggosok kuat tidak digalakkan. Elakkan dari terkena mata atau pada luka terbuka. Keluaran ini mengandungi metil salisilat. Jika disapu atau digosokan pada kulit, minyak boleh diserap melalui kulit ke dalam aliran darah.

Interaksi Ubat-ubatan: Untuk pesakit yang mengambil ubat "warfarin", penggunaan yang berlebihan pada kulit untuk sakit otot dan sendi, boleh meningkatkan risiko pendarahan

Penggunaan dikalangan wanita hamil: Tiada kepastian mengenai keselamatan penggunaan dikalangan wanita hamil, oleh itu manfaat yang didapati dari produk ini harus dibanding dengan kemungkinan menyebabkan bahaya kepada ibu dan anaknya.

Kesan Sampingan: Produk ini boleh menyebabkan eritema kulit atau iritasi kulit yang ringan, namun ini adalah kesan produk yang diingini. Oleh kerana, ubat gosok ini adalah 'counter-irritant dan rubefacient', iritasi dan eritema kulit adalah tindakan yang diharapkan.

Gejala-Gejala dan Rawatan Terlebih Dos: Terlebih dos mungkin boleh menyebabkan iritasi kulit. Salah Guna: Menelan minyak angin mungkin boleh menyebabkan gejala-gejala gastro-usus seperti muntah dan cirit-birit. Rawatannya adalah simptomatik. Keracunan akut diperhatikan selepas penggunaan tidak sengaja yang ketara, dengan kemunculan pening, muntah, sakit perut dan sakit kepala, rasa berpusing (vertigo), rasa panas memerah, sawan, pernafasan menyusut dan koma. Pesakit-pesakit dengan gejala-gejala keracunan gastrousus atau neurologi yang teruk harus diawasi dan dirawat secara simptomatik. Jangan memaksa muntah.

Cara Penyimpanan: Simpan di tempat kering dibawah suhu 30° Celcius. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.

Saiz Bungkusan: 5 ml, 10 ml dan 30 ml botol kaca

Tempoh Jangkahayat: 4 tahun

Tarikh Penyemakan: 24 Jun 2022

Nombor Pendaftaran: MAL19963263X

Pemegang Pendaftaran Produk/Dikilang oleh:
SYARIKAT SAFETY MEDICAL
No. 48-2 & 50-2, Jalan 13/34A, Kepong Entrepreneur's Park, Off Jalan Kepong,
52100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia.