

Main Side / Adverse Effects / 主要副作用/反作用 / Kesan Sampingan Utama:
Vitamin E is usually well tolerated. Large doses greater than 400 to 800 units per day for prolonged periods may cause:
- Flu-like symptoms.
- Stomach pain, tiredness, weakness.
- Breast enlargement in males and females.
- Pain in lower legs (thrombophlebitis)
- Blurred vision.
- Diarrhoea, dizziness, headache and nausea.

NOTE:
Very high doses of Vitamin E (greater than 800 units per day for prolonged periods) have also been associated with increased bleeding tendencies in Vitamin K deficient patients, altered metabolism of hormones (thyroid, pituitary and adrenal), altered immunity, impaired sexual function and may increase the risk of thrombophlebitis or thromboembolism in susceptible patients (although this is controversial)

一般上人体对维生素E的承受度相当高。若长期每天服用高剂量400至800单位维生素E将会引起：
—感冒性症状。
—腹部疼痛，疲劳和虚弱。
—男女胸部增大。
—腿下部疼痛（血栓性静脉炎）。
—视觉模糊。
—腹泻、头昏眼花、头痛和作呕。

注意：
高剂量维生素E（长期每天服用超过800单位）容易引致；增加缺乏维生素K病人的出血倾向、改变荷尔蒙的新陈代谢（甲状腺，脑垂体和肾上腺），改变人体免疫力、削弱性功能及增加血栓性静脉炎的风险或易受血栓栓塞影响的病人（虽然这是具争论性的）。

Vitamin E selalunya diterima dengan baik. Pengambilan berlebihan dari 400 hingga 800 unit setiap hari untuk jangka masa panjang mungkin menyebabkan:
- Simptom-simptom selsema.
- Sakit perut, keletihan dan kelemahan.
- Pembesaran payudara untuk lelaki dan wanita.
- Kesakitan di kaki (thrombophlebitis).
- Penglihatan kabur.
- Cirit-birit, pening, sakit kepala dan perasaan loya.

NOTA:
Sukatan tinggi Vitamin E (lebih dari 800 unit setiap hari untuk jangka masa yang lama) juga telah dikaitkan dengan kecenderungan berlakunya pendarahan pada pesakit yang kekurangan Vitamin K, metabolisme hormon yang berubah (thyroid, pituitary dan adrenal), perubahan keimunan, fungsi seksual yang terganggu dan mungkin meningkatkan risiko thrombophlebitis atau thromboembolism pada pesakit-pesakit yang mudah terpengaruh. (walaupun ia masih diselubungi kontroversi)

Recommended Dosage / 推荐用量 / Dos Cadangan:
Vitamin E 200 Soft Gelatin Capsule:
Adults and adolescents: 1 to 4 softgels daily.
成人及青少年，每天一至四粒。
Dewasa dan remaja: 1 hingga 4 biji kapsul sehari

Storage Conditions / 储存方法 / Cara Penyimpanan:
Store below 30°C
Protect from light and moisture.
存放在摄氏三十度以下。
避免光线及潮湿。
Simpan di bawah suhu 30°C
Lindungi dari cahaya dan lembapan.

Shelf Life / 有效期 / Tarikh Luput:
3 years from the date of manufacture.
三年自生产日期计算。
3 tahun dari tarikh pengilangan

Pack Sizes / 包装 / Saiz Pembungkusan:
Vitamin E 200IU:
Bottle of 60's, 180's.
每罐60粒，180粒。
60 biji, 180 biji dalam setiap botol.

Revision Date: November 2021

Manufactured by:
HOVID Bhd. (58476-A)
121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar),
30010 Ipoh, Perak, Malaysia.

Product Registration Holder:
Hovid Pharmacy Sdn. Bhd.
121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar),
30010 Ipoh, Perak.



VITAMIN E 200 SOFT GELATIN CAPSULE

Composition / 成分 / Komposisi:
Vitamin E 200 Soft Gelatin Capsule:
d-alpha tocopherol 200 IU.

Hovid 维生素 E 200 IU 软胶囊
d-alpha 生育酚 200 IU.

Hovid kapsul lembut Vitamin E 200 IU:
d-alpha tocopherol 200 IU.

Actions / 作用 / Tindakan:
Vitamin E is considered as an essential nutritional element. As an antioxidant, it prevents the actions of peroxidase on unsaturated bonds in cell membranes and protects red blood cells against haemolysis. Vitamin E is well absorbed from the gastrointestinal tract. It is metabolised in the liver and is excreted in the bile and urine.

维生素E被认为是一种重要的营养素。维生素E是抗氧化剂，它除了阻止过氧化物酶破坏细胞膜里不饱和键，它也能保护红血球免受破坏。维生素E很容易被肠胃吸收。维生素是在肝里新陈代谢然后随着胆汁和尿一起排泄。

Vitamin E dianggap sebagai suatu elemen pemakanan yang penting. Sebagai suatu

antioksidan, ia menghalang tindakbalas peroksidaan terhadap ikatan tak tepu dalam sel membran dan melindungi sel-sel darah merah dari hemolisis. Vitamin E mudah diserap dari saluran pencernaan. Ia dimetabolismekan di dalam hati dan dikumuhkan di dalam hempedu dan air kencing.

Indication / 指示 / Indikasi:
Vitamin E is indicated for the treatment of Vitamin E deficiency.

维生素E已被认同，并用于治疗维生素的缺乏。

Vitamin E disyorkan untuk merawat pesakit yang kekurangan Vitamin E.

Precautions / 提防 / Perhatian:
Safety for use in pregnancy and lactation has not been established.

怀孕及授乳妇女是否可以安全服用维生素E还待确认

Keselamatan digunakan semasa mengandung dan laktasi belum diwujudkan.

Drug Interactions / 药性交互作用 / Tindakbalas Ubat:
- Concurrent use with iron supplements should be avoided since Vitamin E impairs the haematologic response in patients with iron deficiency anaemia.
- Vitamin E should not be used concurrently with Vitamin A since large doses of Vitamin E deplete Vitamin A stores.
- Concurrent use with Vitamin K is not recommended since Vitamin E antagonises the effect of Vitamin K.

- 避免同时服用维生素E和含铁质补品，因为维生素E会影响缺乏铁贫血症病人血液的正常反应。(haematologic response).
- 避免同时服用维生素E和A，因为超高剂量的维生素E能减少维生素A的储存。
- 同时服用维生素E和K也不被推荐，因为维生素E会抵抗维生素K的良好作用。

- Penggunaan bersama dengan zat besi patut dielakkan kerana Vitamin E mengganggu tindakbalas haematologik pesakit yang menghadapi anemia kekurangan zat besi.
- Vitamin E tidak patut digunakan bersama dengan Vitamin A kerana pengambilan

berlebihan Vitamin E akan mengurangkan Vitamin A yang disimpan di dalam badan.
- Penggunaan bersama dengan Vitamin K tidak digalakkan kerana Vitamin E mengurangkan keberkesanan Vitamin K.

Overdose / 过量 / Dos Lebihan:
Clinical Features:
Diarrhoea, abdominal pain and other gastrointestinal disturbances, flu-like symptoms, pain in lower legs, fatigue and weakness.
Treatment:
Discontinue immediately.
Seek advice from your doctor.

临床特征：
腹泻、腹部疼痛和其他的肠胃不适、感冒性症状、腿下部疼痛、疲劳和虚弱。
治疗：
立刻停止服用维生素E。寻求医生的建议。

Ciri-ciri klinikal:
Cirit-birit, sakit abdomen, gangguan gastrointestinal, simptom-simptom selsema, kesakitan di kaki, keletihan dan kelemahan
Rawatan:
Hentikan dengan serta-merta. Dapatkan rawatan dari doktor.

