



● SWKD
○ WKMS
○ WKMM
○ HU
○ HU (KK)

File Name: Tolnaftate Cream 10g_Leaflet-25-01-2021

Received : 15.11.2018

Amended : 25.01.2021

Output : 25.01.2021

Request : Shuying

Designer : Syafiq

Opened : 100w x 160h MM

Closed : -

Finished: -

Colour : 1C



THREE LEGS TOLNAFTATE CREAM 1%w/w UBAT KURAP TOLNAFTATE 1%w/w CAP KAKI TIGA 三脚标癣药膏 1%w/w

THREE LEGS

TOLNAFTATE CREAM 1%w/w

COMPOSITION:

Tolnaftate 1%w/w, Chlorocresol 0,2%w/w

DESCRIPTION:

White colour, smooth application, sticky and phenolic odour cream.

PHARMACODYNAMIC:

Tolnaftate inhibits the growth of Epidermophyton, Microsporum, Trichophyton spp, and Malassezia furfur but it is not active against Candida spp. or bacteria. Tolnaftate is effective in the treatment superficial fungus infections of the skin. It is not active systematically, virtually non-sensitizing, and does not ordinarily sting or irritate intact or broken skin, even in the presence of acute inflammatory reactions. It does not stain or discolor skin, hair, nails or clothing. Topical application does not seem to give any significant systemic absorption.

INDICATION:

For the treatment of fungal infections including Ringworm, Athlete's Foot, Tinea Capitis, Tinea Corporis, Tinea Barbae, Tinea Versicolor and Tinea Cruris.

DIRECTION FOR USE:

Wash and dry the affected area. Apply small amount of the cream on the area two to three times daily for 2 - 3 weeks. In cases where thickening of the skin has occurred, treatment may be extended to 4 - 6 weeks. Treatment can be continued to help maintain remission in patients susceptible to tinea.

ROUTE OF ADMINISTRATION: Topical

Hypersensitivity to Tolnaftate or any component of the base.

WARNING AND PRECAUTION:

If skin sensitization or irritation occurs, discontinue use. Keep away from eyes and mucous membranes. If no improvement after 10 days of treatment or if the skin disease becomes worse, discontinued use and consult your doctor.

INTERACTIONS WITH OTHER

For external use only. Not to be taken.

MEDICAMENTS: Not known

PREGNANCY AND LACTATION:

Not known

SIDE EFFECTS:

Skin irritation, dermatitis and pruritus may occur. However, the incident is rare.

SYMPTOMS AND TREATMENT OF OVERDOSE:

Treatment should be discontinued if skin sensitization or irritation occurs.

EFFECTS ON ABILITY TO DRIVE AND USE MACHINE: Not known

STORAGE CONDITION:

Store below 30°C. Keep out of reach of children.

SHELF LIFE:

Please refer to the packaging. Do not use beyond the expiry date.

PACKING:

10g, 15g in aluminium tube.

The information contained in this leaflet is limited. For further information, please consult your doctor or pharmacist.

UBAT KURAP TOLNAFTATE

1%w/w CAP KAKI TIGA

KOMPOSISI:

Tolnaftate 1%w/w, Chlorocresol 0,2%w/w

DESKRIPSI:

Krim berwarna putih, mudah disapu, melekit dan berbau fenolik.

FARMAKODINAMIK:

Sila rujuk kepada penerangan Bahasa Inggeris.

INDIKASI:

Untuk rawatan jangkitan kulat termasuk kurap, kulap air pada kaki, tinea kapitis, tinea korporis, tinea barbae, panau dan tinea cruris.

CARA PENGGUNAAN:

Bersihkan dan keringkan bahagian yang dijangkiti. Sapu krim ini di bahagian yang dijangkiti 2-3 kali sehari selama 2-3 minggu. Untuk kes di mana penebalan kulit berlaku, rawatan boleh dilanjutkan selama 4-6 minggu. Rawatan boleh diteruskan oleh pesakit yang mudah dijangkiti oleh Tinea untuk melegakan ketidakselesaan.

LALUAN PEMBERIAN UBAT: Topikal

KONTRAINDIKASI:

Hipersensitiviti kepada Tolnaftate atau mana-mana komponen dalam produk ini.

AMARAN DAN PERHATIAN:

Berhenti menggunakan ubat ini sekiranya iritasi kulit atau dermatitis berlaku. Jauhkan daripada mata dan membran mukus. Jika tidak ada kesan pemulihan selepas 10 hari rawatan atau keadaan menjadi semakin teruk, berhenti menggunakan ubat ini dan jumpa doktor anda.

Untuk kegunaan luar sahaja. Tidak boleh dimakan.

INTERAKSI DENGAN UBAT LAIN: Tidak diketahui

KEHAMILAN DAN LAKTASI: Tidak diketahui

KESAN SAMPINGAN:

Iritasi kulit dan dermatitis. Walau bagaimanapun, ubat ini biasanya jarang memberi kesan sampingan.

SYMPTOM DAN RAWATAN OVERDOS:

Rawatan harus dihentikan sekiranya berlaku iritasi kulit dan dermatitis.

KESAN TERHADAP KEBOLEHAN MEMANDU DAN MENGENDALIKAN MESIN: Tidak diketahui

KEADAAN PENYIMPANAN:

Simpan di bawah 30°C. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.

TEMPOH HAYAT:

Sila rujuk kepada bungkusan. Jangan guna selepas tamat tarikh luput.

SAIZ BUNGKUSAN:

10g, 15g dalam tub aluminium.

Maklumat dalam risalah ini adalah terhad. Untuk informasi selanjut, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

三脚标癣药膏 1%w/w

成份:

Tolnaftate 1%w/w, Chlorocresol 0,2%w/w

外观:

白色, 容易涂抹, 有粘性及具有酚醛味的药膏。

药物作用:

请参阅英文版本

主治:

用于治疗真菌感染, 包括钱状癣、香港脚、头癣、汗斑、体癣、花斑癣和头癣。

用法:

先将患处洗净擦干, 将此药搽在患处, 每日二至三次, 需持续二至三个星期。若皮肤有增厚现象, 疗程可延长至四至六个星期。容易被癣感染的患者可持续使用, 以缓解不适。

给药途径: 局部

禁忌:

对Tolnaftate或其他成份敏感者。

注意和防范:

若皮肤过敏或刺激情况出现, 请停止使用。不可搽在眼睛和粘膜。若经十天治疗后情况仍未改善或病情恶化, 请停止使用并咨询您的医生。

仅供外用。请勿食用。

与其它药物的相互作用: 未知

怀孕和哺乳: 未知

副作用:

可能会引起皮肤刺激、皮炎和瘙痒。但是是很罕见的。

过量症状及治疗:

如果发生皮肤过敏或刺激, 应停止治疗。

对于驾驶及使用机器的影响: 未知

贮存:

置于 30 °C 以下。远离儿童。

有效期:

请参阅盒子。超出有效期时, 请勿使用。

包装:

铝管装, 10克、15克

此说明书仅属略述, 欲知更详细资料, 可询问您的医生或药剂师。

Manufactured by Product Registration Holder:
Syarikat Wen Ken Drug Sdn Bhd
24, Jalan Lambak, Taman Johor,
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Singapore Distributor:
Wen Ken Marketing (S) Pte Ltd
2, Alexandra Road, #02-08, Delta House,
Singapore 159919.

Date of Revision: 25.01.2021
...