



Activ-C 500 (Orange)

Product Registration Holder and Manufacturer:



Kotra Pharma (M) Sdn. Bhd.
No.1, 2 & 3, Jalan TTC 12, (90062-V)
Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka, Malaysia.

MAL19991202XZ

Appeton Essentials Activ-C 500 (Orange)

COMPOSITION :

Each tablet contains
Vitamin C 500mg (833.3% USRDA)

PRESENTATION :

Light orangey brown coloured, flat, round, chewable
orange flavoured tablet, 16mm in diameter.

INDICATION :

As a dietary supplement.

DOSAGE :

To be sucked or chewed.

Adult: To be taken 1 - 2 tablets daily or as directed by
physician.

CONTRAINDICATIONS :

None.

SIDE EFFECTS :

Large doses may cause diarrhoea, formation of renal
calculi and will alter the excretion of certain other
drugs administered concurrently.

PRECAUTION :

It should be given with care to patients with
hyperoxaluria. Tolerance may be induced in patients
taking high doses. Unsuitable for phenylketonurics.

SYMPTOMS AND TREATMENT OF OVERDOSAGE:

Dosage of 600mg or more daily have a diuretic
action. Treatment for overdosage is symptomatic.

DRUG INTERACTION :

Large supplement of vitamin C may convert a
low-oestrogen oral contraceptive to a high-dose oral
contraceptive.

PACKING:

Available in amber glass bottle of 30's.

STORAGE:

Keep container well closed. Store below 30°C.
Protect from light.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Further information can be obtained from pharmacist,
doctor or the manufacturer.

Appeton Essentials Activ-C 500 (Orange)

KANDUNGAN :

Setiap tablet mengandungi
Vitamin C 500mg (833.3% USRDA)

CIRI-CIRI FIZIKAL :

Tablet kunyah yang berwarna oren muda kecoklatan,
berbentuk bulat dan rata, berperisa oren, berdiameter
16mm.

INDIKASI :

Sebagai makanan tambahan.

SUKATAN :

Dihisap atau dikunyah.

Dewasa: Ambil 1 - 2 biji sehari atau sepertimana yang
disyorkan oleh doktor.

KONTRAINDIKASI :

Tiada.

KESAN SAMPINGAN :

Sukatan yang berlebihan boleh menyebabkan cirit-birit,
pembentukan kalkuli renal dan akan mengubah
pembuangan beberapa jenis dadah lain yang diambil
serentak.

PERHATIAN :

Ia mesti diberi secara berhati-hati kepada pesakit yang
menghidap hyperoxaluria. Ketahanan akan
meningkatkan pada pesakit yang mengambil Vitamin C
pada sukatan yang tinggi. Tidak sesuai untuk
phenylketonurics.

SIMPTOM DAN RAWATAN BAGI DOS BERLEBIHAN:

Sukatan melebihi 600mg atau lebih sehari memberi
kesan diuretic. Rawatan adalah secara simptomatik.

INTERAKSI DENGAN UBAT LAIN :

Pengambilan suplemen Vitamin C yang tinggi akan
menjadikan ubat pencegahan hamil yang rendah
oestrogen kepada ubat pencegahan hamil yang tinggi
oestrogen.

PEMBUNGKUSAN :

Terdapat di dalam botol kaca sebanyak 30 biji.

PENYIMPANAN :

Bekas mesti ditutup rapi. Simpan di bawah suhu 30°C.
Lindungi dari cahaya.

JAUIH DARI KANAK-KANAK

Keterangan lanjut boleh didapati dari ahli farmasi,
doktor atau pengilang.

Appeton Essentials Activ-C 500 (Orange)

成份:

每粒含 Vitamin C 500mg (833.3% USRDA)。

外形:

浅橙棕色, 扁平, 圆形, 橙味口嚼锭。直径16毫米。

适应:

营养补充剂。

剂量:

含在口里或咀嚼。

成人: 每天1 - 2粒或遵照医生的指示服用。

禁忌:

无禁忌。

副作用:

大剂量产生腹泻, 肾结石及改变同时服食之其他药
物之排泄作用。

注意:

草酸盐尿过多病患者须小心。高剂量会产生耐受性。
。苯酮尿症患者不适合服用。

服用过量之徵状及疗法:

一天剂量600mg或超过600mg有利尿作用, 并采用对微
疗法。

与其他药物之相互作用:

大量的维他命C会导致低剂量的动情激素口服避孕药
成为剂量高的口服避孕药。

包装:

30粒玻璃瓶装。

贮藏:

瓶盖盖紧。贮藏于30°C以下, 避免阳光照射。

置於儿童取不到之处。

欲知详情, 请问药剂师, 医生或製造商。

Date of revision : 05/10/21

REGN-051021