

処方せん医薬品^(注)
 日本薬局方 生理食塩液
生食MP

ISOTONIC SODIUM CHLORIDE SOLUTION MP

貯 法：室温保存

使用期限：3年(外箱、容器に表示の使用期限内に使用すること。)

注 意：取扱上の注意の項参照

注)注意一医師等の処方せんにより使用すること

承認番号	20500AMY00339
薬価収載	1994年7月
販売開始	1997年10月

【組成・性状】

本剤は1管(20mL)中に塩化ナトリウム0.18gを含有する。

性 状	無色澄明の液で、弱い塩味がある。	
pH	4.5～8.0	
電解質組成 (mEq/L)	Na ⁺	Cl ⁻
	154	154

【効能・効果】

注 射：細胞外液欠乏時、ナトリウム欠乏時、クロール欠乏時、注射剤の溶解希釈剤

外 用：皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布、含そう・噴霧吸入剤として気管支粘膜洗浄・喀痰排出促進

その他：医療用器具の洗浄

【用法・用量】

注 射：1) 通常20～1000mLを皮下、静脈内注射または点滴静注する。
 なお、年齢、症状により適宜増減する。

2) 適量を取り注射用医薬品の希釈、溶解に用いる。

外 用：1) 皮膚、創傷面、粘膜の洗浄、湿布に用いる。

2) 含そう、噴霧吸入に用いる。

その他：医療用器具の洗浄に用いる。

【使用上の注意】

1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

1) 心臓、循環器系機能障害のある患者

[循環血液量を増すことから心臓に負担をかけ、症状が悪化するおそれがある。]

2) 腎障害のある患者

[水分、塩化ナトリウムの過剰投与に陥りやすく、症状が悪化するおそれがある。]

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

副作用が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

大量・急速投与：大量を急速投与すると、血清電解質異常、うつ血性心不全、浮腫、アシドーシスを起こすことがある。

3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので、投与速度を緩徐にし、減量するなど注意すること。

4. 適用上の注意

1) 調製時

注射剤の溶解・希釈液として使用する場合は、生理食塩液が適切であることを確認すること。

2) 投与前

① 投与に際しては感染に対する配慮をすること(患者の皮膚や器具消毒)。

② 寒冷期には体温程度に温めて使用すること。

③ 開封後は直ちに使用し、残液は決して使用しないこと。

3) 投与時

ゆっくり静脈内に投与すること。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：塩化ナトリウム(Sodium Chloride)

分子式：NaCl

分子量：58.44

性 状：・無色又は白色の結晶又は結晶性の粉末である。

・水に溶けやすく、エタノール(99.5)にほとんど溶けない。

【取扱い上の注意】

1. 包装内に水滴が認められるものや内容液が着色又は混濁しているものは使用しないこと。

2. アンブルカット時の手順

1) アンブルの結合部分を前後に切り離して下さい。

2) 頭部を回転させて切り離して下さい。



【包 装】

20mL：100管(プラスチック容器)

(プラスチック容器はポリエチレン製である。)

※ 2013年1月改訂(第11版 販売会社変更)

※ 2010年11月改訂

処方せん医薬品：注意—医師等の処方
せんにより使
用すること

日本薬局方 生理食塩液

生食MP

Isotonic Sodium Chloride Solution MP

日本標準商品分類番号
873311

貯 法：密封容器、室温保存

使用期限：3年

(外箱・容器に表示の使用期限内に
使用すること)

注 意：取扱上の注意の項参照

	20mL	100mL	250・500mL
承認番号	20500AMY00339		
薬価収載	1994年7月	1994年7月	1999年2月
販売開始	1994年7月	1995年7月	1999年7月

【組成・性状】

本剤は100mL中に日局 塩化ナトリウム0.9gを含有する。

性 状	無色澄明の液で、弱い塩味がある。	
pH	4.5～8.0	
電解質組成 (mEq/L)	Na ⁺	Cl ⁻
	154	154

【効能・効果】

注 射：細胞外液欠乏時、ナトリウム欠乏時、クロール
欠乏時、注射剤の溶解希釈剤外 用：皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布、含そう・噴
霧吸入剤として気管支粘膜洗浄・喀痰排出促進
その他：医療用器具の洗浄

【用法・用量】

注 射：(1)通常20～1000mLを皮下、静脈内注射または
点滴静注する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

(2)適量をとり注射用医薬品の希釈、溶解に用
いる。

外 用：(1)皮膚、創傷面、粘膜の洗浄、湿布に用いる。

(2)含そう、噴霧吸入に用いる。

その他：医療用器具の洗浄に用いる。

【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

(1)心臓、循環器系機能障害のある患者〔循環血液量を増
すことから心臓に負担をかけ、症状が悪化するおそれ
がある。〕(2)腎障害のある患者〔水分、塩化ナトリウムの過剰投与
に陥りやすく、症状が悪化するおそれがある。〕

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる
調査を実施していない。副作用が認められた場合には、投与を中止するなど適
切な処置を行うこと。大量・急速投与：大量を急速投与すると、血消電解質
異常、うっ血性心不全、浮腫、アシドーシスを起こす
ことがある。

3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので、投与
速度を緩徐にし、減量するなど注意すること。

4. 適用上の注意

(1)調製時：注射剤の溶解・希釈液として使用する場合は、
生理食塩液が適切であることを確認すること。

(2)投与前：

1) 投与に際しては、感染に対する配慮をすること。
(患者の皮膚や器具消毒)

2) 寒冷期には体温程度に温めて使用すること。

3) 開封後直ちに使用し、残液は決して使用しないこと。

(3)投与时：ゆっくり静脈内に投与すること。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：〔日局〕塩化ナトリウム (Sodium Chloride)

分子式：NaCl



分子量：58.44

性 状：本品は無色または白色の結晶または結晶性の粉
末である。本品は水に溶けやすく、エタノール(99.5)に
ほとんど溶けない。

【取扱上の注意】

1. 20mLの場合の注意：


アンプルカットの手順

(1)アンプルの結合部分を
前後に切り離して下さい。(2)頭部を回転させて切
り離して下さい。

2. 100mL、250mL、500mLの場合の注意：

(1)連結管による混合投与の場合は、Y字管連結にして使
用すること。

(2)開栓時の注意：

1) プルオフリングの支柱部が向こう側になるよう
にボトルを保持する。2) プルオフリングの上から人差し指を入れ、リン
グに指をかける。3) 親指で支え、手前方向へ約45度にゆっくり引く
と開栓できる。

(3)注射針はゴム栓の○印にまっすぐ刺すこと。

品 名	生食 MP	制作日	MC	色	スミ	トラップ
本コード		2013.3.7	③	調		()
仮コード	1979M0212302	3 校	校 作業者印	AC		角度
		3 校	中 科	朝日印刷株式会社	kf8k3	APP.TB

天	真
---	---

- | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|----------|-----|-----------------------|----|--|--|--|--|--|------|-----|
| 品名 | 生食MP | 制作日 | MC | 色調 | スミ | | | | | | トラップ | |
| 本コード | | 2013.3.7 | (C) | | | | | | | | | () |
| 校 | | 作業者印 | AC | | | | | | | | | 角度 |
| 仮コード | 1979M0212302 | 3校 | 中村 | | | | | | | | | |
| | | | | 朝日印刷株式会社 kf8k3 APP.TB | | | | | | | | |

※2008年6月改訂(第7版)
※2008年2月改訂

日本標準商品分類番号
873311

処方せん医薬品※
日本薬局方 生理食塩液
生食MP
ISOTONIC SODIUM CHLORIDE SOLUTION

承認番号	(5AMY)339
薬価収載	1994年7月
販売開始	1994年7月

貯 法：室温保存
使用期限：3年（外箱・容器に表示）
注 意：取扱い上の注意の項参照

※注意—医師等の処方せんにより使用すること

【組成・性状】

生食MPは、1管(20 mL)中に日局塩化ナトリウム0.18gを含有する。

性 状	無色澄明の液で、弱い塩味がある。	
pH	4.5～8.0	
電解質組成 (mEq/L)	Na ⁺	Cl ⁻
	154	154

【効能・効果】

注 射：細胞外液欠乏時、ナトリウム欠乏時、クロール欠乏時、注射剤の溶解希釈剤
外 用：皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布、含そう・噴霧吸入剤として気管支粘膜洗浄・喀痰排出促進
その他：医療用器具の洗浄

【用法・用量】

注 射：(1)通常20～1000mLを皮下、静脈内注射または点滴静注する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。
(2)適量を取り注射用医薬品の希釈、溶解に用いる。
外 用：(1)皮膚、創傷面、粘膜の洗浄、湿布に用いる。
(2)含そう、噴霧吸入に用いる。
その他：医療用器具の洗浄に用いる。

【使用上の注意】

- 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
 - (1)心臓、循環器系機能障害のある患者〔循環血流量を増すことから心臓に負担をかけ、症状が悪化するおそれがある。〕
 - (2)腎障害のある患者〔水分、塩化ナトリウムの過剰投与に陥りやすく、症状が悪化するおそれがある。〕
- 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

副作用が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

大量・急速投与：大量を急速投与すると、血清電解質異常、うっ血性心不全、浮腫、アシドーシスを起こすことがある。

3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので、投与速度を緩徐にし、減量するなど注意すること。

4. 適用上の注意

- (1)調製時：注射剤の溶解・希釈液として使用する場合は、生理食塩液が適切であることを確認すること。
- (2)投与前：
 - 1)投与に際しては、感染に対する配慮をすること（患者の皮膚や器具消毒）。
 - 2)寒冷期には体温程度に温めて使用すること。
 - 3)開封後直ちに使用し、残液は決して使用しないこと。
- (3)投与时：ゆっくり静脈内に投与すること。



【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：〔日局〕塩化ナトリウム (Sodium Chloride)
化学名：Sodium Chloride
分子式：NaCl
分子量：58.44
性 状：無色又は白色の結晶又は結晶性の粉末である。
水に溶けやすく、エタノール(99.5)にほとんど溶けない。

【取扱い上の注意】

・アンプルカットの手順

- 1) アンプルの結合部分を前後に切り離して下さい。
- 2) 頭部を回転させて切り離して下さい。



【包 装】

20mL：100管（プラスチック容器）

※プラスチック容器はポリエチレン製容器である。

※【問い合わせ先】

沢井製薬株式会社 医薬品情報センター
〒532-0003 大阪市淀川区宮原5丁目2-30
☎0120-381-999 TEL:06-6105-5815 FAX:06-6394-7355

発売元
沢井製薬株式会社
※ 大阪市淀川区宮原5丁目2-30

製造販売元（輸入元）
*** マイラン製薬株式会社**
大阪市中央区本町2丁目6番8号