

10.5cm

FireSens

MENTHOLATED RUB

25G

Product Description: Greyish white ointment with characteristic smell of Methyl Salicylate, Menthol, Camphor.

产品叙述: 灰白色软膏，具有水杨酸甲酯、薄荷、樟脑的特有气味。
Deskripsi Produk: Salap yang berwarna putih kelabu dengan sifat bau Methyl Salicylate, Menthol dan Camphor.

Indication

Provides symptomatic relief of muscle and joint pain, rheumatism, backache and sprains

说明

适用于舒缓肌肉疼痛，风湿，背痛及扭伤。

Indikasi

Untuk melegakan sakit otot dan sendi, reumatik, sakit belakang dan sakit urat

Active Ingredients / 活性成分 / Bahan-bahan Aktif
Methyl Salicylate / 水杨酸甲酯 22.0% w/w
Menthol / 薄荷 11.5% w/w
Camphor / 樟脑 5.0% w/w

Excipient Ingredients / 赋形剂成分 / Bahan-bahan Eksipien
Nutmeg Oil / 豆蔻油
Paraffin Wax / 石蜡
Eucalyptus Oil / 桉树油
Petrolatum / 凡士林
Tea Tree Oil / 茶树油
Liquid Paraffin / 石蜡油

Shelf Life / 有效期 / Jangka Hayat
2 years from the date of manufacture
2年保存期 / 2 tahun dari tarikh pengilangan

Directions / 用法 / Arahan Penggunaan
For Adult : Apply to affected area 3 to 4 times per day
适用于成人：每天在患处涂抹3至4次
Untuk dewasa : Sapukan ke bahagian badan yang berkaitan 3 hingga 4 kali sehari

Manufacturer/ Product Registration Holder
Q-PACK (M) SDN BHD 199201022779
No.2, Jalan Perunding U1/17,
Hicom-Glenmarie Industrial Park, Seksyen U1,
40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

5/7/2024
MAL20012778X

10.5cm

Cautions

- Keep out of reach of children
- For external use only
- Avoid contact with eyes
- Do not apply on wound or damaged skin
- It is dangerous to place any product containing camphor into the nostrils of children. A small amount applied this way may cause immediate collapse
- Methyl Salicylate can be absorbed into the blood via the skin when it is applied or rubbed onto the skin
- **Storage condition:** Store at room temperature, dry place (<30°C)
- **Route of administration:** Topical
- **Side effects:** May cause hypersensitivity/allergic reactions, including contact dermatitis in some individuals with sensitive skin
- **Symptoms and treatment of overdose:** You may experience symptoms of discomfort such as dizziness, nausea or vomiting.
- Discontinue use immediately and consult a doctor or go to the nearest hospital emergency department
- **Pregnancy and Lactation:** Do not use during pregnancy or when breastfeeding
- **Interactions:** This product contains Methyl Salicylate and when applied or rubbed onto the skin, can be absorbed through the skin into the blood. For patients taking warfarin, excessive application onto the skin for muscle or joints pains may increase the chances of bleeding

CONTRAINDICATIONS
CAN CAUSE CONVULSION
CONTRAINDICATED IN CHILDREN BELOW 2 YEARS OF AGE
CAUTION MUST BE EXERCISED WHEN OLDER CHILDREN ARE TREATED
AVOID DIRECT APPLICATION INTO THE NOSTRILS

注意事项

- 远离儿童
- 只限外用
- 避免接触眼睛
- 请勿涂抹在伤口或受损皮肤上
- 本产品含有樟脑，涂抹于儿童鼻内是危险的，即使是微量，也可能导致昏迷
- 涂抹或擦拭水杨酸甲酯时，可通过皮肤吸收进入血液中。
- **储存条件：**置于干燥阴凉处(室温<30° C)
- **给药途径：**局部
- **副作用：**可能会引起超敏或过敏反应，包括某些皮肤敏感人士可能会出现接触性皮炎
- **用药过量的症状和治疗：**可能会出现头晕、恶心或呕吐等不适症状。如有，请立即停止使用，咨询医生，或前往邻近医院急诊科就诊
- **怀孕和哺乳期：**请勿在怀孕或哺乳期间使用
- **相互作用：**本产品含有水杨酸甲酯，涂抹或擦拭皮肤后，可通过皮肤吸收进入血液。对于服用华法林的患者，在肌肉或关节疼痛时过度涂抹可能会增加出血的几率。

禁忌
可能引起抽搐
2岁以下儿童禁用
年长儿童慎用
避免直接涂抹鼻孔内

PERINGATAN

- Jauhkan daripada kanak-kanak
- Untuk kegunaan luaran sahaja
- Jauhkan daripada mata
- Jangan sapu di bahagian kulit yang luka
- Merbahaya kepada kanak-kanak jika ubat mengandungi kapur barus (camphor) disapukan pada bahagian lubang hidung. Cara sapuan ini walaupun sedikit mungkin boleh menyebabkan pengsan
- Methyl Salicylate boleh diserap ke dalam darah melalui kulit apabila ia disapu atau digosok pada kulit
- **Penyimpanan:** Simpan di tempat kering pada suhu bilik (<30°C)
- **Arahan penggunaan:** Untuk disapu pada kulit sahaja
- **Kesan sampingan:** Boleh menyebabkan hipersensitiviti / tindak balas alahan, termasuk dermatitis sentuhan pada sesetengah individu dengan kulit sensitif
- **Symptom dan rawatan dos yang berlebihan:** Boleh menimbulkan simptom tidak selesa seperti pening, loya, atau muntah.
- Hentikan penggunaan serta-merta jika mengalami simptom tersebut dan dapatkan nasihat doktor atau pergi ke unit kecemasan di hospital terhampir
- **Hamil atau menyusui badan:** Wanita mengandung dan menyusui badan dilarang menggunakan produk ini
- **Interaksi:** Produk ini mengandungi Methyl Salicylate dan apabila disapu atau digosok pada kulit, ia dapat diserap ke melalui kulit ke dalam darah. Bagi pesakit yang mengambil warfarin, pengambilan yang berlebihan pada kulit untuk sakit otot atau sendi mungkin meningkatkan risiko pendarahan.

KONTRAINDIKASI
BOLEH MENYEBABKAN SAWAN
TIDAK BOLEH DIGUNAKAN OLEH KANAK-KANAK DI BAWAH UMUR 2 TAHUN
GUNAKAN DENGAN BERTAHATI PADA KANAK-KANAK YANG LEBIH DEWASA
JANGAN SAPU PADA BAHAGIAN LUBANG HIDUNG

15cm

15cm