

TEMPORARY RELIEF OF PAIN ASSOCIATED WITH
MUSCULOSKELETAL SORENESS AND DISCOMFORT

Ultimax^{cream}

Fast heat sensation

✓Greaseless

✓Stainless

✓Invisible



hovid

TEMPORARY RELIEF OF PAIN ASSOCIATED WITH
MUSCULOSKELETAL SORENESS AND DISCOMFORT

Ultimax^{cream}

Fast heat sensation

✓Greaseless

✓Stainless

✓Invisible

Description

Pale green, opaque cream.

Composition

Active ingredients:	
Methyl Salicylate	25.50% w/w
Menthol	3.30% w/w
Eucalyptus Oil	10.00% w/w

Preservatives used are chlorocresol 0.10% w/w, methyl paraben 0.10% w/w and propyl paraben 0.01% w/w.

Actions

Ultimax is used for its local action as a rubefacient-counterirritant analgesic when rubbed on the skin. Absorption of methyl salicylate can occur through the skin.

Warning

This product is contraindicated in infants under 2 years of age. Caution must be exercised when older children are treated. This product contains methyl salicylate and when applied or rub on to the skin, can be absorbed through the skin into the blood. For patients taking warfarin, excessive application to the skin for muscle or joint pains may increase the chances of bleeding.

Indications

For temporary relief of pain associated with musculoskeletal soreness and discomfort.

Precautions

* It should not be applied to broken or inflamed skin or near the eyes or mucous membranes.
* For external use only.

Main Side / Adverse Effects

Hypersensitivity reactions, urticaria and angioneurotic oedema may occur in susceptible persons.

Dosage and Administration

Gently massage on intact skin two to three times a day.

Note:

The information given here is limited. For further information, consult your doctor or pharmacist.

Storage:

Store below 30°C. Protect from light and freezing.

Packaging:

Tube of 15g, 30g and 60g.

Manufactured by: **Hovid Bhd.**, 121, Jalan Tunku Abdul Rahman (Jalan Kuala Kangsar), 30010 Ipoh, Perak, Malaysia.

暂缓肌肉疼痛与不适

奥地美霜 快速热度感

✓不含油腻

✓不玷污衣物

✓无色

描述

浅青、不透明霜。

成份

活性成份	
水杨酸甲酯	25.50% 重/重
薄荷醇	3.30% 重/重
桉油	10.00% 重/重

所使用的防腐剂有氯甲酚0.10%重/重, 甲酸甲酯0.10%重/重与对羟基苯甲酸丙酯0.01%重/重。

作用

奥地美乃是涂擦在疼痛的部位, 具有抗刺激性且能透过肌肤抵抗有关疼痛的解痛霜。 水杨酸甲酯是由肌肤吸入人体内。

注意

此产品不适于小过两岁的婴孩使用。至于较年长的小孩需小心应用。此霜存有水杨酸甲酯成份。因此, 当它涂擦在肌肤上, 此成份将会透过肌肤吸入人体血液内。至于那些正在使用华法令的病人, 涂擦过多的奥地美霜可能会导致出血的现象。

功能

它能暂时解除肌肉、骨骼疼痛与不适。

预防措施

— 不适于涂擦在损伤、红肿的肌肤或靠近眼睛、粘膜的部位。
— 只适于外用。

副作用

对于敏感的人, 有可能会有过敏、荨麻疹与血管神经水肿等现象。

用量和使用方法

每日轻柔按摩肌肤二至三次。

注意:

此所提供的资料有限, 有关详情请询问您的医生或药剂师。

贮藏:

存放于摄氏30度以下, 阴暗处, 避免冷藏。

包装:

管装15克、30克与60克。

MEMBERIKAN KELEGAAN SEMENTARA BAGI
KESAKITAN ATAU KETIDAKSELESAAN PADA BAHAGIAN OTOT

Krim Ultimax

Kehangatan segera

✓Tidak berminyak

✓Tidak meninggalkan kesan

✓Tidak kelihatan

Deskripsi

Krim hijau muda dan legap.

Komposisi

Bahan-bahan aktif:	
Metil Salisilik	25.50% w/w
Mentol	3.30% w/w
Minyak Eucalyptus (Minyak kayu putih)	10.00% w/w

Bahan pengawet yang digunakan ialah klorokresol 0.10% w/w, metil paraben 0.10% w/w dan propil paraben 0.01% w/w.

Tindakan

Ultimax bertindak dengan menghilangkan kesakitan pada lokasi sakit apabila digosokkan pada bahagian kulit. Penyerapan metil salisilik boleh berlaku melalui kulit.

Amaran

Produk ini tidak boleh digunakan untuk bayi di bawah 2 tahun. Perhatian perlu diambil semasa digunakan pada kanak-kanak. Produk ini mengandungi metil salisilik dan apabila digosok pada bahagian kulit, ia boleh meresap ke dalam darah. Bagi pesakit yang mengambil warfarin, penggunaan krim yang berlebihan untuk menghilangkan kesakitan otot atau sendi berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian berlakunya pendarahan.

Indikasi

Melegakan kesakitan dan ketidakselesaan otot atau sendi untuk sementara waktu.

Perhatian

* Ia tidak boleh digunakan pada bahagian kulit yang tercedera atau bengkok, berdekatan dengan mata atau membran mukus.
* Untuk kegunaan luar sahaja.

Kesan Sampingan Utama

Reaksi hipersensitif, urtikaria dan oedema angioneurotik mungkin berlaku pada mereka yang sensitif.

Dos dan Penggunaan

Mengurut secara lembut pada bahagian kulit sebanyak dua hingga tiga kali sehari.

Peringatan:

Maklumat yang terkandung di sini adalah terhad. Bagi keterangan lanjut, sila jumpa doktor atau ahli farmasi anda.

Penyimpanan:

Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi dari cahaya dan sejuk beku.

Pembungkusan:

Tiub, 15g, 30g dan 60g.