

**Activ-C
(Blackcurrant)**

**Appeton Activ-C
(Blackcurrant)**

PRESENTATION:

Purplish red coloured, star shaped, blackcurrant flavored, chewable tablet.

COMPOSITION:

Each tablet contains
Vitamin C 100mg (USRDA 167%)

INDICATION:

As a health supplement.

DOSAGE:

Children (7-12 years old) : 1-3 tablets daily before / after meal. To be sucked or chewed.

SIDE EFFECT:

Vitamin C is usually well tolerated. Large doses may cause diarrhoea, gastrointestinal disturbances and renal calculi.

PRECAUTION:

It should be given with care to patients with hyperoxaluria. Tolerance may be induced in patients taking high doses. Unsuitable for phenylketonurics.

PACKING:

Available in amber glass bottle of 20's and 60's.

STORAGE:

Keep container well closed.
Store below 30°C. Protect from light and moisture.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Further information can be obtained from pharmacist, doctor or the manufacturer.

**Appeton Activ-C
(Blackcurrant)**

CIRI-CIRI FIZIKAL:

Tablet kunyah berbentuk bintang, berwarna merah ungu, berperisa anggur.

KANDUNGAN:

Setiap tablet mengandungi
Vitamin C 100mg (USRDA 167%)

INDIKASI:

Sebagai suplemen kesihatan.

SUKATAN:

Kanak-kanak (7-12 tahun) : 1-3 tablet sehari sebelum / selepas makan. Boleh dihisap atau dikunyah.

KESAN SAMPINGAN:

Vitamin C selalunya bertoleransi baik. Sukatan berlebihan boleh menyebabkan cirit-birit, gangguan terhadap gastrointestinal dan renal kalkuli.

PERHATIAN:

Ia mesti diberi secara berhati-hati kepada pesakit yang menghadapi hyperoxaluria. Toleransi akan meningkat pada pesakit yang mengambil sukatan yang tinggi. Tidak sesuai untuk phenylketonurics.

PEMBUNGKUSAN:

Terdapat di dalam botol kaca sebanyak 20 biji dan 60 biji.

PENYIMPANAN:

Bekas mesti ditutup rapi.
Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi dari cahaya dan kelembapan.

JAUHI DARI KANAK-KANAK

Keterangan lanjut boleh didapati dari ahli farmasi, doktor atau pengilang.

**Appeton Activ-C
(Blackcurrant)**

外形:

紫红色, 星形, 黑加仑子口味咀嚼片。

成份:

每粒含
维他命C100毫克(USRDA 167%)

适应:

健康营养补充剂。

剂量:

儿童(七至十二岁): 每天服用1-3粒, 饭前/饭后服用, 可含在口里或咀嚼。

副作用:

高剂量会产生腹泻, 肠胃不适及肾结石。

注意:

高草酸盐尿的病患, 必须小心使用。高剂量会产生耐受性。苯酮尿症患者不适合服用。

包装:

20及60粒玻璃瓶装。

贮藏:

将瓶盖盖紧。贮藏于30°C以下。避免阳光照射和防潮。

置於儿童取不到之处。

欲知详情, 请询问药剂师, 医生或制造商。

Manufactured By & Product Registration Holder:



Kotra Pharma (M) Sdn. Bhd.
No.1, 2 & 3, Jalan TTC 12, (90082-V)
Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka, Malaysia.

MAL20032177XZ