

HemoRid™

MICRONISED TABLET

Kandungan:

Setiap tablet Hemo Rid mengandungi Micronised Diosmin 450 mg dan Micronised Hesperidin 50 mg.

Indikasi:

Tablet Hemo Rid boleh digunakan untuk merawat penyakit buasir yang sudah kronik dan buasir yang teruk tetapi masih baru. Tablet Hemo Rid juga sesuai digunakan untuk rawatan kepada pembuluh darah yang tidak berfungsi dengan sempurna di bahagian bawah kaki yang membawa simptom seperti kaki terasa berat (sukar untuk bergerak), kesakitan dan kekejangan semasa tidur.

Tindakan Mekanisme:

Tablet Hemo Rid mengandungi Bioflavonoids, Diosmin dan Hesperidin. Ianya berguna untuk mempertingkatkan fungsi kapilari dengan mengurangkan kebocoran luar biasa di bahagian berkenaan. Tablet Hemo Rid memperkuat ton pembuluh darah dengan memanjangkan aktiviti parietal noradrenaline, dengan itu ianya akan mengurangkan muatan pembuluh darah, mengurangkan kekembungan pembuluh darah dan mengurangkan masa untuk mengosongkan pembuluh darah. Ia juga akan menghalang pelepasan bahan pengantara seperti radikal bebas dan prostaglandin, seterusnya menormalkan kebolehtelapan kapilari dan menguatkan daya tahannya. Tablet Hemo Rid juga meningkatkan pengaliran limfa dengan meningkatkan aliran dan tekanan sel dalaman limfa, dengan menghasilkan phlebotonic dan perlindungan pembuluh yang akan memperbaiki simptom buasir yang kronik.

Sukatan:

Buasir yang kronik: 2 tablet diambil setiap hari selepas makan.

Buasir teruk yang masih baru: 6 tablet setiap hari selama 4 hari & 4 tablet setiap hari selama 3 hari & 2 tablet setiap hari (Setiap tablet diambil selepas makan).

Pembuluh darah yang tidak berfungsi secara sempurna: 2 tablet diambil selepas makan.

Kesan Sampingan:

Gangguan ringan di bahagian perut dan

autonomik ada dilaporkan, bagaimanapun ia tidak mengakibatkan pemberhentian rawatan.

Perhatian:

Alahan terhadap Diosmin, Hesperidin ataupun kandungan lain di dalam Tablet Hemo Rid. Tablet Hemo Rid tidak boleh diberikan kepada ibu yang menyusukan anak.

Toksikologi:

Kajian makmal tidak mendapati apa-apa kesan teratogenik terhadap haiwan. Kepada manusia, tiada kesan yang boleh mendatangkan keburukan dilaporkan sehingga kini.

Bungkusan:

10 x 10's dan 3 x 10's

Penyimpanan:

- SIMPAN DI TEMPAT KERING DIBAWAH SUHU 30°C.
- LINDUNGI DARIPADA CAHAYA.
- JAUHKAN DARIPADA KANAK-KANAK

Nota:

Mungkin terdapat perbezaan warna pada tablet, oleh disebabkan ciri-ciri semula jadi bahan aktifnya.

Jangka Hayat:

Sila rujuk pada pek luar.

含量：450mg Micronised Diosmin 及 50mg Micronised Hesperidin.

功效：治疗慢性及突发性痔疮，器官性及自发性长期静脉失调而引起的下肢沉重；疼痛及晚间抽筋。

功能：Hemo Rid 含生物黄酮素，Diosmin 及 Hesperidin，深信能增强毛细管功能，减少不正常漏泄。它亦能通过增长体壁内的降肾上腺素活动适而改善静脉活动。减低静脉阻力及张力，并减少静脉腾空时限。此药亦能阻止传递器（例：自由基，前列腺素）之放送，进而正常化毛细管渗透及功能。Hemo Rid 亦能增进淋巴液输送及淋巴腺 oncotic pressure，进而改善长期性痔疮之症状。

剂量：剂量度基于症状严重性而调整。

慢性痔疮：每日 2 片，餐后服食。

突发性痔疮：连续 4 日每日服食 6 片，分 2 次服食；之后 3 日每日服食 4 片，分 2 次服食。再后长期每日 2 片。以上皆餐后服食。

长期静脉失调：每日 2 片，餐后服食。

210mm

100% Black

副作用：轻微肠胃及身体不适，唯不需停止疗程。

禁忌：对 Diosmin, Hesperidin 及其它此药之成份有药物敏感者不可服食此药。

注意事项：喂乳母亲不可服食。

毒性研究：动物研究报告未显示任何胚胎异变，此外亦未有报告显示此药会引起严重人体副作用。因未有足够资料说明此药渗透入人奶之数量，服食此药时切勿哺乳。

包装：10 X 10's 及 3 X 10's

由于：
由于原料天然成份的因素，药片与药片之间的颜色将会有所差异。

贮存：
贮存于干燥并低于30°C处。
贮存于阴凉处。
贮存于孩童不可轻易触及处。

贮存年：
请参阅盒内中文说明

Composition:
Each tablet contains Micronised Diosmin 450 mg and Micronised Hesperidin 50 mg.

Product Description:
An oval shape, pinkish brown tablet

Indications:
For the treatment of chronic hemorrhoids and acute hemorrhoidal attacks. Treatment of organic and idiopathic chronic venous insufficiency of the lower limbs with the following symptoms: heavy legs, pain and nocturnal cramps.

Mechanisms Of Action:
Hemo Rid contains the Bioflavonoids, Diosmin and Hesperidin, which are thought to improve capillary function by reducing abnormal leakage. Hemo Rid reinforces venous tone by prolonging the activity of parietal noradrenaline, thereby decreasing venous capacitance, venous distensibility and venous emptying time. It also inhibits the release of mediators e.g. free radicals and prostaglandins, thus normalising capillary permeability and strengthening capillary resistance. Hemo Rid also improves lymphatic drainage by increasing lymph flow and lymph oncotic pressure, producing phlebotonic and vasculo protective effects which significantly improve the chronic symptoms of hemorrhoidal disease.

Dosage and Administration:

The dosage of Hemo Rid will depend on the severity of the disease.

Chronic Hemorrhoids: 2 tablets daily to be taken after meals.

Acute Hemorrhoidal Attacks: 6 tablets daily in 2 divided doses, for 4 days and then 4 tablets daily in 2 divided doses for 3 days then 2 tablets daily. (Tablets are to be taken after meals)
Chronic Venous Insufficiency: 2 tablets daily to be taken after meals.

Side Effects:

Some cases of minor gastrointestinal and autonomic disorders have been reported, which never required cessation of treatment.

Contraindication:

Hypersensitivity to Diosmin or Hesperidin, or to any of the ingredients in Hemo Rid.

Precaution:

Not to be given to nursing mothers.

Toxicology:

Experimental studies have not shown any teratogenic effect in animals. In human beings, no harmful effect has so far been reported. In the absence of data concerning diffusion into the breast milk, breastfeeding is not recommended during treatment.

Presentation:

10 x 10's and 3 x 10's

Storage Conditions:

- STORE IN A DRY PLACE BELOW 30°C.
- PROTECT FROM LIGHT
- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Route of Administration: Oral

Note:

Due to the natural properties of the materials, there may be variations in colour of tablets from batch to batch.

Shelf life:

Please refer to outer package.

Product Registration Holder :

DUOPHARMA MANUFACTURING (BANGI) SDN. BHD.

Lot No. 2, 4, 6, 8 & 10, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia.

Manufacturer:

DUOPHARMA MANUFACTURING (BANGI) SDN. BHD.

Lot No. 2 & 4, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia.



Revision Date: Sept 2019
1500008807 N.1