

FRONT

hovid

VIMED03-var2 (MY)

HO YAN HOR MEDICATED OIL

DESCRIPTION

Transparent, colourless to slight yellowish liquid.

COMPOSITION

Methyl Salicylate	17.9% w/w
Menthol	16.0% w/w
Camphor	10.1% w/w
Eucalyptus Oil	9.4% w/w

PHARMACODYNAMICS

Hovid Medicated Oil has antipruritic, analgesic, rubefacient and counter irritant effects when rubbed on the skin.

PHARMACOKINETICS

Percutaneous absorption of methyl salicylate can occur.

INDICATIONS

For symptomatic relief of minor aches and pains of muscles and joints.

CONTRAINDICATIONS

Contraindicated in children below 2 years of age. Caution must be exercised when older children are treated.

WARNING AND PRECAUTIONS

This product is contraindicated in children under 2 years of age. Caution must be exercised when older children are treated. It is dangerous to place any camphor-containing product into the nostrils of children. A small amount applied this way may cause immediate collapse. This product contains methyl salicylate and when applied or rub on to the skin, can be absorbed through the skin into the blood. For patients taking warfarin, excessive application on to the skin for muscle or joint pains may increase the chances of bleeding.

PREGNANCY AND LACTATION

None known

INTERACTION WITH OTHER MEDICAMENTS AND OTHER FORMS OF INTERACTION

This product contains methyl salicylate and when applied or rub on to the skin, can be absorbed through the skin into the blood. For patients taking warfarin, excessive application on to the skin for muscle or joint pains may increase the chances of bleeding.

MAIN SIDE/ ADVERSE EFFECTS

Hypersensitivity reactions, urticaria and angioneurotic oedema may occur in susceptible persons.

EFFECTS ON ABILITY TO DRIVE AND USE MACHINES

None known

OVERDOSE

Symptoms:

Hyperventilation, hyperthermia, epigastric pain, nausea, vomiting, vertigo, confusion, muscular excitability, respiratory alkalosis, metabolic acidosis, pulmonary oedema, hepatic and renal failure, convulsions and coma.

Treatment:

Treat poisoning by emesis or gastric lavage. Electrolyte and metabolic abnormalities, if any, should be corrected. Convulsions may be controlled by IV diazepam 5-10 mg.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

Apply to the affected area as needed. For external use only.

Note: The information given here is limited. For further information, consult your doctor or pharmacist.

Storage : Store below 30°C.

Presentation / packing : Bottle of 3ml, 7ml, 14ml, 56ml

Product Registration Holder / Manufactured by: **HOVID Bhd.**

121, Jalan Tunku Abdul Rahman (Jalan Kuala Kangsar), 30010 Ipoh, Perak, Malaysia.

Revision date: January 2022

MINYAK ANGIN HO YAN HOR

DESKRIPSI
Lutsinar, tidak berwarna atau seingga warna kuning muda.

BAHAN-BAHAN KANDUNGAN
Methyl Salicylate 17.9% w/w
Menthol 16.0% w/w
Camphor 10.1% w/w
Eucalyptus Oil 9.4% w/w

FARMAKODINAMIK
Minyak angin Hovid mempunyai kesan antipruritik, analgesik, rubefasian dan kesan kerengsaan apabila disapu pada kulit.

FARMAKOKINETIK
Penyerapan perkutaneus methyl salicylate boleh berlaku.

INDIKASI
Untuk melegakan rasa sakit kecil dan ketidakselesaian pada bahagian otot dan sendi.

KONTRAINDIKASI
Kontraindikasi pada kanak-kanak dibawah usia 2 tahun. Amaran harus diambil jika ia digunakan untuk merawat kanak-kanak dewasa.

AMARAN DAN LANGKAH BERJAGA-JAGA
Kontraindikasi pada kanak-kanak dibawah usia 2 tahun. Amaran harus diambil jika ia digunakan untuk merawat kanak-kanak dewasa. Ia adalah merbahaya untuk meletakkan apa-apa produk yang mengandungi camphor ke dalam hidung kanak-kanak. Sekiranya terjadi, ia akan menyebabkan mangsa pengsan serta merta. Produk ini mengandungi methyl salicylate dan apabila digunakan atau gosokkan pada kulit, ia boleh diserap melalui kulit ke dalam darah. Bagi pesakit yang mengambil warfarin, penggunaan yang berlebihan bagi kesakitan otot atau sendi boleh meningkatkan peluang pendarahan.

KEHAMILAN DAN PENYUSUAN
Tidak diketahui

INTERAKSI ANTARA UBAT-UBATAN LAIN DAN BENTUK-BENTUK INTERAKSI
Produk ini mengandungi methyl salicylate dan apabila digunakan atau gosokkan pada kulit, ia boleh diserap melalui kulit ke dalam darah. Bagi pesakit yang mengambil warfarin, penggunaan yang berlebihan bagi kesakitan otot atau sendi boleh meningkatkan peluang pendarahan.

KESAN SAMPINGAN / KESAN BURUK
Tindak balas berlebihan, urtikaria dan edema angioneurotik mungkin berlaku pada individu sensitif.

KESAN KE ATAS KEUPAYAAN UNTUK MEMANDU DAN PENGGUNAAN JENTERA
Tidak diketahui

DOS BERLEBIHAN
Simptom:
Hiperventilasi, hipertermia, sakit epigastrik, loya, muntah, vertigo, kekeliruan peranan, otot mudah teransang, alkalosis pernafasan, asidosis metabolik edema pulmonari, penyakit hati dan buah pinggang, sawan dan coma.
Rawatan:
Keracunan dirawat dengan cara muntah atau pencucian gastrik. elektrolit dan metabolik yang tidak normal, jika ada, hendaklah diperbetulkan. Sawan boleh dikawal menggunakan diazepam IV 5-10 mg.

DOS DAN PENGURUSAN
Sapu pada bahagian yang diperlukan. Untuk kegunaan luar sahaja.
Nota: Maklumat yang diberikan di sini adalah terhad. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.
Penyimpanan : Simpan di bawah suhu 30°C.
Persembahan / pembungkusan : Botol 3ml, 7ml, 14ml, 56ml
Pemegang Pendaftaran Produk / Dikeluarkan oleh: **HOVID Bhd.**
121, Jalan Tunku Abdul Rahman (Jalan Kuala Kangsar),
30010 Ipoh, Perak, Malaysia.
Tarikh Semakan: Januari 2022

何人可®驅風油

描述
透明、无色至帶黄色油。

成分
冬青油 17.9% 重/重
薄荷醇 16.0% 重/重
樟腦 10.1% 重/重
桉樹油 9.4% 重/重

药效动力学
此产品具有温和的发红和镇痛的作用，涂擦于皮肤后，有微温和热感。

药代动力学
冬青油可透过皮肤被人体所吸收。

功能
能减轻肌肉与关节疼痛。

禁忌症
禁止使用于二岁以下的儿童。二岁以上的儿童之使用必须谨慎处理。

警告和注意事项
禁忌使用于二岁以下的儿童。二岁以上的儿童之使用必须谨慎处理。凡是含有樟脑的产品若涂擦于儿童鼻内是危险的，即使是微量也可能导致昏晕。此产品也含有水杨酸甲酯（冬青油）成分，若涂擦于皮肤上，它可透过皮肤被吸入人体血液内。对于正在使用华法令(Warfarin)的病人，过量涂擦于皮肤或关节疼痛处，将可能会导致出血的现象。

孕期和哺乳期
未知

药物相互作用和其他形式的相互作用
此产品也含有水杨酸甲酯（冬青油）成分，若涂擦于皮肤上，它可透过皮肤被吸入人体血液里。对于正在使用华法令(Warfarin)的病人，过量涂擦于皮肤或关节疼痛处，将可能会导致出血的现象。

副作用
对于敏感的人，有可能会有过敏，荨麻疹与血管神经水肿等现象。

对驾驶能力和机器驱动能力的影响
未知

过量用药
症状
过度换气，体温过高，上腹部疼痛，反胃，呕吐，眩晕，迷乱，肌肉兴奋性，呼吸性碱中毒，代谢性酸中毒，肺水肿，肝功能衰竭，肾衰竭，抽搐，昏迷。
治疗
以呕吐和洗胃治疗中毒症状。如电解质和新陈代谢产生异常则须纠正。抽搐情况下可通过静脉(IV)注射5至10mg地西洋(Diazepam)控制。

储藏: 储藏于30°C以下。
包装: 枝装 3ml, 7ml, 14ml 和 56ml

产品注册持有者/制造商
何人可公司
121, Jalan Tunku Abdul Rahman (Jalan Kuala Kangsar),
30010 Ipoh, Perak, Malaysia.