

Contraindications:

- Patients having a central venous catheter
- Critically ill patients or immunocompromised patients due to a risk of fungaemia (See Section Warnings & Precautions)

Warnings and precautions

There have been very rare cases of fungaemia reported mostly in patients with central venous catheter, critically ill or immunocompromised patients, most often resulting in pyrexia. In most cases, the outcome has been satisfactory after cessation of treatment by *Saccharomyces boulardii*, administration of antifungal treatment and removal of the catheter when necessary. However, the outcome was fatal in some critically ill patients (see Section Contraindications & Section Adverse Effects / Undesirable Effects).

Interactions with other medications:

Unknown

Statement on usage during pregnancy and lactation:

Unknown

Overdose and treatment:

Unknown

(Date of revision of package insert: 15 March 2024)

Adverse effects/ Undesirable effects**Infections and Infestations:**

Very rare: Fungaemia in patients with a central venous catheter and in critically ill or immunocompromised patients (see Section Warnings & Precautions).

Before you use Pylogard:**When you must not take it**

Do not take this product if you are immunocompromised (altered/weakened immune system) or have central venous catheter.

Side effects:

Very rare side effects: Penetration of yeast into blood (fungaemia)

Storage conditions:

Store in a cool dry place below 30°C. Protect from light and moisture.

Pack sizes:

Blister pack of 30 capsules.
PP bottle of 30, 60, and 120 capsules.

MAL21126034NC

Name and address of product registration holder:

Aspen Sarl Sdn Bhd (387356-P),
No. 9, Jalan PJS 11/14, Bandar Sunway,
46150 Subang Jaya, Selangor.

pylogard[®]
Capsule

Probiotic + Prebiotic**Penerangan**

Serbuk berwarna krim dengan rasa dan bau tersendiri di dalam kapsul tumbuhan lutsinar bersaiz "0".

Setiap kapsul tumbuhan mengandungi:

Saccharomyces boulardii.....250mg
Lactobacillus rhamnosus GG.....150mg
Inulin.....50mg

Indikasi:

Sebagai suplemen kesihatan.

Aranan penggunaan & dos disarankan:

Dewasa: Ambil 1 kapsul tumbuhan, dengan makanan, 2 kali sehari.

Kanak-kanak di atas 1 tahun: Ambil 1 kapsul tumbuhan, dengan makanan, sekali sehari. Jika kapsul tidak dapat ditelan, kandungan kapsul boleh dicampurkan bersama makanan atau minuman sejuk. Jangan ambil melebihi dos yang disarankan.

Cara pengambilan:

Oral

Kontraindikasi:

- Pesakit dengan kateter vena pusat
- Pesakit kritikal atau pesakit imuniti lemah oleh sebab risiko fungaemia (Lihat Bahagian Amaran & Langkah Berjaga-jaga)

Amaran dan langkah berjaga-jaga:

Terdapat kes fungaemia yang jarang berlaku dilaporkan terutamanya dalam kalangan pesakit dengan kateter vena pusat, pesakit kritikal atau imuniti lemah, yang kerap menyebabkan pireksia (demam). Kebanyakan kes berakhir dengan kesan yang memuaskan selepas penamatan rawatan menggunakan *Saccharomyces boulardii*, penggunaan ubat antikulat, dan eliminasi kateter jika perlu. Bagaimanapun, terdapat kes maut dalam sesetengah pesakit kritikal (lihat Bahagian Kontraindikasi & Kesan sampingan/Kesan tidak diingini).

Interaksi dengan ubat-ubat lain:

Tidak diketahui

Kenyataan penggunaan semasa mengandung dan menyusukan:

Tidak diketahui

Dos berlebihan dan rawatan:

Tidak diketahui

Kesan sampingan/Kesan tidak diingini:Jangkitan dan infestasi

Jarang jumpa: Fungaemia dalam pesakit dengan kateter vena pusat dan pesakit kritikal atau imuniti lemah (lihat Bahagian Amaran & Langkah Berjaga-jaga).

Sebelum anda menggunakan Pylogard:Waktu anda dilarang ambil

Jangan ambil produk ini sekiranya anda adalah imunokompromi (perubahan/lemah sistem imuniti) atau mempunyai kateter vena pusat.

Kesan sampingan:

Kesan sampingan jarang jumpa: Jangkitan kulat dalam darah (fungaemia)

Cara penyimpanan:

Simpan di tempat dingin, kering di bawah 30°C. Lindungi dari cahaya dan lembapan.

Saiz pek:

Pek blister 30 kapsul.
Botol PP 30, 60, dan 120 kapsul.

MAL21126034NC**Nama dan alamat pemegang pendaftaran produk:**

Aspen Sdn Bhd (387356-P),
No. 9, Jalan PJS 11/14, Bandar Sunway,
46150 Subang Jaya, Selangor.

PYL/PI30/0322/01)

pylogard[®]
Capsule

Probiotic + Prebiotic**Description**

Cream colour powder filled in size "0" transparent vegetable hard capsule with characteristic taste and odour.

Each vegetable capsule contains:

Saccharomyces boulardii.....250 mg
Lactobacillus rhamnosus GG150 mg
Inulin..... 50mg

Indication:

As a health supplement

Direction of use & Recommended dose:

Adults: Take 1 vegetable capsule, with meal, twice daily.

Children above 1 years old: Take 1 vegetable capsule, with meal, once daily. In case of inability to swallow the capsule, the content of the capsule can be mixed with food or cold liquid. Please do not exceed the recommended dose.

Route of administration:

Oral