



Three Legs

Cool-Kare

Muscle Pain Relief Spray 12%w/v

Menthol 12%w/v
This product contains 70%v/v of alcohol

THREE LEGS COOL-KARE MUSCLE PAIN RELIEF SPRAY 12%w/v	SEMBURAN SAKIT OTOT COOL-KARE 12%w/v CAP KAKI TIGA	三脚标COOL-KARE 肌肉酸痛喷剂 12%w/v
ACTIVE INGREDIENT: Menthol 12%w/v This product contains 70%v/v of alcohol	BAHAN AKTIF: Menthol 12%w/v Produk ini mengandungi 70%v/v alkohol	成分: 薄荷醇 12%w/v 此产品含有 70%v/v的酒精
PRODUCT DESCRIPTION: Clear and colourless solution with menthol smell.	PRODUK DESKRIPSI: Larutan yang jernih dan tidak berwarna dengan aroma mentol.	产品描述: 带有薄荷味的透明无色溶液。
INDICATION: For temporary relief from minor aches and pains of sore muscles and joint associated with arthritis, backache, stiff neck, strains, and sprains.	INDIKASI: Untuk memberi kelegaan sementara daripada sakit ringan, sakit otot dan sakit sendi yang berkaitan dengan arthritis, sakit belakang, sakit leher, sengal otot dan seliuh.	主治: 成人及12岁以上儿童：每日2至3次喷于患处。 12岁以下儿童：请咨询医生。
DIRECTION OF USE: Adults and children 12 years old and above: Spray on the affected area 2 to 3 times a day. Children under 12 years of age: Consult a doctor.	CARA PENGGUNAAN: Dewasa dan kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas: Sembur pada kawasan yang terjejas 2 hingga 3 kali sehari. Kanak-kanak di bawah umur 12 tahun: Sila rujuk kepada doktor.	用法: 每日喷于患处2至3次。 给药途径: 外用 禁忌: 已知对产品中任何成份过敏的患者。
ROUTE OF ADMINISTRATION: Topical	LALUAN PEMBERIAN UBAT: Topikal	注意与防范: 如果症状持续，请咨询医生。
CONTRAINDICATIONS: Patient with known hypersensitivity to any of the ingredients in the product.	KONTRAINDIKASI: Pesakit yang diketahui hipersensitif terhadap mana-mana ramuan dalam produk.	避免接触眼睛。
WARNINGS AND PRECAUTIONS: If symptoms persist, please consult doctor. Avoid contact with eye. Do not apply to wounds or damaged or irritated skin. Do not use with other ointments, creams or sprays. Do not use with heating pad or device. Flammable: Store away from heat or flames. Keep out of reach of children. For external use only.	AMARAN DAN PERHATIAN: Sekiranya gejala berterusan, sila jumpa doktor. Elakkan bersentuhan dengan mata. Jangan sapu pada luka atau kulit yang rosak atau merengsa. Jangan gunakan bersama dengan salap krim atau semburan yang lain. Jangan gunakan dengan pad atau alat pemanas. Mudah terbakar: Jauhkan daripada haba atau api. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak. Untuk kegunaan luar sahaja.	不要用于伤口或受损或受刺激的皮肤。 不要与其他软膏、霜剂或喷雾剂一起使用。 请勿与加热垫或设备一起使用。 易燃: 远离热源或火焰。 远离儿童。 仅限于外用。
PHARMACODYNAMICS: Menthol dilates the blood vessels causing a sensation of coldness, followed by an analgesic effect. Menthol also acts as a penetration enhancer, increasing the penetration of drugs when applied on the skin, to give a faster onset of action.	FARMAKODINAMIK: Menthol melebarkan saluran darah dan menyebabkan sensasi kesejukan, diikuti dengan kesan analgesik. Mentol juga bertindak sebagai penambah penembusan, meningkatkan penembusan ubat-ubatan apabila digunakan pada kulit, untuk memberi permulaan tindakan yang lebih cepat.	药效学: 薄荷醇能使血管扩张而引起寒冷感，并起镇痛作用。薄荷醇还可以作为渗透促进剂，增加药物在皮肤上的穿透力，从而加快了药物的起效时间。
EFFECTS ON ABILITY TO DRIVE AND USE MACHINES: Not known	FARMAKOKINETIK: Selepas penyerapan, Menthol diekskresikan dalam urin dan hempedu sebagai glukuronid.	药代动力学: 吸收后，薄荷醇会化作为葡萄糖苷酸并经由尿液和胆汁排出。
INTERACTIONS WITH OTHER MEDICAMENTS: Not known	KESAN KE ATAS KEUPAYAAN MEMANDU DAN PENGGUNAAN MESIN: Tidak diketahui	对驱动和使用机器的能力的影: 未知
STATEMENT ON USAGE DURING PREGNANCY AND LACTATION: Safety for use in pregnancy has not been established; therefore the potential benefit of the product should be weighed against the possible risks to the mother and child.	INTERAKSI DENGAN UBAT LAIN: Tidak diketahui	与其他药物的相互作用: 未知



Three Legs

Cool-Kare

Muscle Pain Relief Spray 12%w/v

Menthol 12%w/v
This product contains 70%v/v of alcohol

THREE LEGS COOL-KARE MUSCLE PAIN RELIEF SPRAY12%w/v	SEMBURAN SAKIT OTOT COOL-KARE 12%w/v CAP KAKI TIGA	三脚标COOL-KARE 肌肉酸痛喷剂 12%w/v
ADVERSE EFFECTS/ UNDESIRABLE EFFECTS: Menthol may cause a hypersensitivity reaction including contact dermatitis, itching or a rash. In the event of an allergic reaction, the product should be washed off the skin with soap and water.	KEHAMILAN DAN PENYUSUAN: Keselamatan untuk kegunaan semasa kehamilan belum diwujudkan; Oleh itu potensi manfaat produk terhadap kemungkinan risiko kepada ibu dan anak harus ditimbangkan.	济失调、嗜睡和昏迷；局部使用薄荷醇在婴儿的鼻孔将导致他们即刻昏倒。
SYMPTOMS AND TREATMENT OF OVERDOSE: Symptoms of menthol overdose Ingestion of significant quantities is reported to cause symptom: severe abdominal pain, nausea, vomiting, vertigo, ataxia, drowsiness and coma; instant collapse in infants after the local application of menthol to their nostrils.	KESAN SAMPINGAN: Menthol boleh menyebabkan reaksi hipersensitiviti termasuk dermatitis, gatal-gatal atau ruam. Sekiranya berlaku tindak balas alahan, produk harus dibersihkan dari kulit dengan sabun dan air.	治疗 应通过洗胃或口服活性炭清空胃。流体和电解质管理是主要治疗方法，用于纠正酸中毒，高热，低钾血症和脱水（如果存在）。
Treatment The stomach should be emptied by gastric lavage or administration of oral activated charcoal. Fluid and electrolyte management is the mainstay of treatment with the immediate aim of correction of acidosis, hyperpyrexia, hypokalemia and dehydration if present.	SIMPTOM DAN RAWATAN UNTUK KELEBIHAN DOS: Simptom dos berlebihan mentol Pengambilan kuantiti yang banyak telah dilaporkan boleh menyebabkan simptom seperti sakit perut yang teruk, loya, muntah, vertigo, ataksia, mengantuk dan koma; Bayi akan pengsan segera selepas aplikasi mentol ke lubang hidung mereka.	任何痉挛必须先通过治疗来控制，包括抗惊厥药物治疗。
Any convulsion must be controlled first through supportive care including anticonvulsant therapy.	Rawatan Perut harus dikosongkan dengan lavaj gaster atau pengambilan arang diaktifkan secara oral. Pengurusan bendalir dan elektrolit adalah sangga rawatan untuk pembetulan asidosis, hiperpireksia, hipokalemia dan penyahhidratan jika hadir.	贮存: 储存低于30°C。远离阳光和热源。将瓶子直立放置。
STORAGE CONDITIONS: Store below 30°C. Away from sunlight and heat. Place the bottle upright.	KEADAAN PENYIMPANAN: Simpan di bawah 30°C. Jauhkan daripada sinaran matahari dan suhu panas. Letakkan botol dengan tegak.	有效期: 请参考包装。勿在有效期限之后使用。
SHELF LIFE: Please refer to the packaging. Do not use beyond the expiry date.	TEMPOH HAYAT: Sila rujuk kepada bungkusan. Jangan guna selepas tamat tarikh luput.	剂型: 喷剂
DOSAGE FORM: Spray	DOS: Semburan	包装: 100毫升
PACKING SIZE: 100ml	SAIZ BUNGKUSAN: 100ml	此说明书仅属略述、欲知更详细资料、可咨询您的药剂师或医生。
The information contained in this leaflet is limited. For further information, please consult your pharmacist or doctor.	Maklumat terkandung di dalam risalah ini adalah terhad. Untuk maklumat yang terperinci, sila hubungi ahli farmasi atau doktor.	

Date of Revision: 17.03.2022

Manufactured by Product Registration Holder:
Syarikat Wen Ken Drug Sdn Bhd
24, Jalan Lambak, Taman Johor,
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Singapore Distributor:
Wen Ken Marketing (S) Pte Ltd
2, Alexandra Road, #02-08, Delta House,
Singapore 159919.

...