

SOLUSOLV

Relief & Treatment of HAEMORRHOIDS

BRAND OR PRODUCT NAME:

SOLUSOLV Tablet

NAME AND STRENGTH OF ACTIVE SUBSTANCE(S):

Hesperidin (Micronised) 50 mg
Diosmin (Micronised) 450 mg

DESCRIPTION:

A brown oblong shaped film coated tablet.

PHARMACODYNAMICS:

SOLUSOLV contains the Bioflavonoids, Diosmin and Hesperidin, to improve capillary function by reducing abnormal leakage. SOLUSOLV reinforces venous tone by prolonging the activity of parietal noradrenaline, thereby decreasing venous capacitance, venous distensibility and venous emptying time. It also inhibits the release of mediators e.g. free radicals and prostaglandins, thus normalising capillary permeability and strengthening capillary resistance. SOLUSOLV also improves lymphatic drainage by increasing lymph flow and lymph oncotic pressure, producing phlebotonic and vasculo protective effects which significantly improve the chronic symptoms of hemorrhoids – the swollen and inflamed vascular structure in the anal canal/lower rectum. This reduces and prevents anal bleeding, pain, itching, rectal inflammation and discomfort due to piles and anal fissures.

PHARMACOKINETICS:

- In humans, following oral administration of Diosmin:
- Excretion is essentially faecal and urinary excretion is on average 14% of the administered quantity.
 - The elimination half-life is of 11 hours.
 - The product is highly metabolised, this metabolism is revealed by the presence of different phenol acids in the urine.

INDICATIONS:

For the treatment of chronic haemorrhoids and acute hemorrhoidal attacks.

DOSAGE & ADMINISTRATION:

- Acute haemorrhoidal attacks: 3 tablets twice daily for 4 days, then 2 tablets twice daily for 3 days.
- Chronic haemorrhoids: 1 tablet twice daily after meals - midday and evening.

ROUTE OF ADMINISTRATION:

Oral administration

CONTRAINDICATIONS:

Hypersensitivity to any of the components of SOLUSOLV Tablet.

WARNING AND PRECAUTIONS:

Acute haemorrhoidal attack: Administration of this medicine is no substitute for the specific treatment of other anal disorders. The treatment must be short-term. If the symptoms do not disappear rapidly, proctological examination should be performed and the treatment reviewed.

INTERACTIONS WITH OTHER MEDICATIONS:

No data available.



PREGNANCY AND LACTATION:

No adverse effects have been reported to date in humans. In the absence of data concerning the diffusion into breast milk, breastfeeding is not recommended during treatment.

ADVERSE /UNDESIRABLE EFFECTS:

Nervous system disorders
Rare: dizziness, headache, malaise.

Gastrointestinal disorders
Common: diarrhea, dyspepsia, nausea, vomiting.
Uncommon: colitis
Unknown frequency: abdominal pain.

Skin and subcutaneous tissue disorders
Rare: rash, pruritus, urticaria
Frequency unknown: isolated edema of the face, eyelids, lips.
Exceptionally, angioedema.

OVERDOSE AND TREATMENT:

No data available.

STORAGE CONDITIONS:

Store below 30°C.

PRESENTATION:

PVC/Aluminium blister of 10 tablets.
Pack Size: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 300, 500, and 1000 tablets

PRODUCT REGISTRATION HOLDER:

Live-well Nutraceuticals Sdn. Bhd. Registration No. 200501028942 (711077-D) 22-1, Jalan PJU 5/20D, The Strand, 47810 Kota Damansara, Selangor, Malaysia.
INFOline: 603-6142 6570 (Mon-Fri; 9am-5pm)
Email: info@livewell2u.com

MANUFACTURER:

Noripharma Sdn. Bhd. Registration No. 200701034604 (792633-A) Lot 5030, Jalan Teratai, 5 ½ Mile off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor.

Date of Revision:

27 January 2022



SoluSolv

JENAMA ATAU NAMA PRODUK:

Tablet SOLUSOLV

NAMA DAN KEKUATAN BAHAN AKTIF:

Hesperidin (Microniz) 50 mg

Diosmin (Microniz) 450 mg

PENERANGAN PRODUK:

Tablet bersalut filem berbentuk bujur berwarna perang.

FARMAKODINAMIK:

SOLUSOLV mengandungi Bioflavonoids - Diosmin dan Hesperidin, untuk mempertingkatkan fungsi kapilari dengan mengurangkan kebocoran tidak normal. SOLUSOLV memperkuat ton pembuluh darah dengan memanjangkan aktiviti parietal noradrenaline, justeru, mengurangkan kekembongan pembuluh darah dan mengurangkan masa untuk mengosongkan pembuluh darah. Ia juga akan menghalang pelepasan bahan pengantara seperti radikal bebas dan prostaglandin, seterusnya menormalkan kebolehtelapan kapilari dan menguatkan daya tahannya. SOLUSOLV juga meningkatkan pengaliran limfa dengan meningkatkan aliran dan tekanan sel dalaman limfa, dengan menghasilkan phlebotonic dan perlindungan pembuluh yang akan memperbaiki symptom hemoroid yang kronik - struktur vaskular bengkak dan radang di saluran dubur / rektum bawah. Ini mengurangkan dan mencegah pendarahan, sakit, gatal di dubur, keradangan rektum dan ketidakselesaian akibat buasir dan fisur dubur.

FARMAKOKINETIK:

Pada manusia, berikut pengambilan secara oral Diosmin:

- Perkumuhan pada dasarnya adalah najis dan perkumuhan kencing rata-rata 14% dari kuantiti yang diambil.
- Penghapusan separuh hayat adalah selama 11 jam.
- Produk ini sangat dimetabolismekan, metabolisme ini ditunjukkan dengan adanya asid fenol yang berlainan dalam air kencing.

INDIKASI:

Untuk rawatan hemoroid kronik dan serangan hemoroid akut.

ARAHAN:

Serangan hemoroid akut:

3 tablet 2 kali sehari untuk 4 hari, selepas itu, 2 tablet 2 kali sehari untuk 3 hari

Hemoroid kronik:

1 tablet 2 kali sehari selepas makan - tengah hari dan malam

CARA PENGAMBILAN:

Oral

KONTRAINDIKASI:

Hipersensitiviti terhadap komponen Tablet SOLUSOLV.

AMARAN DAN LANGKAH BERJAGA-JAGA:

Serangan hemoroid akut: Pengambilan ubat ini adalah bukan pengganti rawatan khusus untuk gangguan dubur yang lain. Rawatan mestilah jangka pendek. Sekiranya gejala tidak hilang dengan cepat, pemeriksaan proktologi harus dilakukan dan rawatannya dikaji semula.

INTERAKSI DENGAN UBAT-UBATAN LAIN:

Tiada maklumat yang tersedia.

KEHAMILAN DAN PENYUSUAN:

Tiada kesan buruk pada manusia yang dilaporkan setakat ini.

Kerana tiada data mengenai peresapan ke dalam susu ibu, penyusuan susu ibu tidak digalakkan semasa rawatan.

KESAN BURUK / KESAN YANG TIDAK DIINGINI:

Gangguan sistem saraf

Jarang berlaku: pening, sakit kepala, malais.

Gangguan saluran gastrousus

Biasa: cirit-birit, dispepsia, mual, muntah.

Tidak biasa: kolitis.

Kekerapan tidak diketahui: sakit perut.

Gangguan tisu kulit dan subkutan

Jarang berlaku: ruam, pruritus, urtikaria

Kekerapan tidak diketahui: edema muka, kelopak mata dan bibir yang terpencil.

Sangat luar biasa, angioedema.

LEBIHAN DOS DAN RAWATAN:

Tiada maklumat yang tersedia.

SYARAT PENYIMPANAN:

Simpan di bawah 30°C.

PEMBUNGKUSAN:

PVC / Aluminium lepuh 10 tablet.

Saiz Pek: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 300, 500, dan 1000 tablet

PEMEGANG PENDAFTARAN PRODUK:

Live-well Nutraceuticals Sdn. Bhd. Registration No. 200501028942 (711077-D)

22-1, Jalan PJU 5/20D, The Strand, 47810 Kota Damansara, Selangor, Malaysia.

INFOnline: 603-6142 6570 (Isnin-Jumaat; 9pagi-5petang)

Emel: info@livewell2u.com

PENGILANG:

Noripharma Sdn. Bhd. Registration No. 200701034604 (792633-A)

Lot 5030, Jalan Teratai, 5 ½ Mile off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor.

TARIKH SEMAKAN:

27 Januari 2022

品牌或药品名称:

SOLUSOLV 片

活性物质名称与剂量:

橘皮苷（微粒化）50 mg

地奥司明（微粒化）450 mg

产品描述:

本品为椭圆形棕色薄膜包衣片。

药效学:

SOLUSOLV含生物黄酮素，橘皮苷及地奥司明, 能增强毛细血管功能，减少不正常漏泄。它亦能通过增长体壁内的降肾上腺素活动适而改善静脉活动。减低静脉阻力及张力，并减少静脉腾空时限。此药亦能阻止传递器（例如：自由基，前列腺素）之放送，进而正常化毛细血管渗透及功能。SOLUSOLV 亦能增进淋巴液输送及淋巴腺oncotic pressure, 进而改善长期性痔疮。肛管或下直肠的血管结构肿胀发炎。这减少及预防因痔疮和肛裂引起的肛门出血、疼痛、瘙痒、直肠炎症和不适。

药物动力学:

在人体试验中、口服地奥司明后:

- 主要是通过粪便排泄、平均有 14% 服用剂量随尿排泄。
- 消除半衰期是 11 小时。
- 药物代谢广泛、在尿中存在的各种酚酸证实了这一点。

功能:

治疗慢性和急性痔疮发作。

使用方法:

- 急性痔疮: 首四天每日服用2次、每次3片; 之后三日每日服用2次、每次2片。

- 长期性痔疮: 每日中午和晚上餐后各服用1片。

用法:

口服

禁忌:

对 SOLUSOLV 片任何成份过敏者禁用。

警告与注意事项:

急性痔疮发作: 服用此药不能替代其他肛门疾病所需的特殊治疗。本治疗方法必须是短期的。如果症状没有迅速消除、应进行肛肠检查并对本治疗方案进行重新审查。

药物相互作用:

无可用数据。

怀孕和哺乳期:

到目前为止、对人类尚无不良反应的报告。

虽然尚无有关药物随母乳分泌的数据、但治疗期间不推荐母乳喂养。

不良反应 / 不良影响:

神经系统疾病

罕见: 头晕、头痛和乏力。

肠胃系统疾病

常见: 腹泻、消化不良、恶心和呕吐。

不常见: 结肠炎。

未知频率: 腹痛。

皮肤和皮下组织疾病

罕见: 皮疹、瘙痒和荨麻疹

频率未知: 面部、眼睑和嘴唇孤立性水肿。异常、血管性水肿。

药物过量与治疗:

无可用数据。

保存方法:

置温度低于 30°C 处储存。

包装:

聚氯乙烯 / 铝箔、10 片装。

包装规格: 10、20、30、40、50、60、100、300、500 和 1000 片

经销商:

Live-well Nutraceuticals Sdn. Bhd. Registration No. 200501028942

(711077-D) 22-1, Jalan PJU 5/20D, The Strand, 47810 Kota Damansara,

Selangor, Malaysia.

资讯专线: 603-6142 6570 (星期一至五; 上午9时至下午5时)

电邮: info@livewell2u.com

制造商:

Noripharma Sdn. Bhd. Registration No. 200701034604 (792633-A)

Lot 5030, Jalan Teratai, 5 ½ Mile off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor.

修订日期:

2022 年 1 月 27 日