



● SWKD

○ WKMS

○ WKMM

○ HU

○ HU (KK)

File Name: 7007-0062-00-Antiseptic-Cream-Leaflet

Received : 12.01.2022

Amended : 16.06.2025

Output :

Request : Shuying

Designer : Shuying

Opened : 100w x 160h MM

Closed : 100w x 40h MM

Finished: -

Colour : 1Cx1C

K



Three Legs

Antiseptic

Cream

Chloroxylenol 0.3%w/w, Triclosan 0.3%w/w Preservative: Chlorocresol 0.2%w/w

THREE LEGS
ANTISEPTIC CREAM

ACTIVE INGREDIENTS:
Chloroxylenol 0.3%w/w, Triclosan 0.3%w/w
Preservative: Chlorocresol 0.2%w/w

PRODUCT DESCRIPTION:
White colour, smooth application and sticky cream with characteristic odour.

INDICATION:
As an antiseptic for skin lesions, cuts, abrasions, infected wounds and burns.

DIRECTION OF USE:
Apply gently onto the affected area 2-3 times daily; wash hands thoroughly before and after each application.

ROUTE OF ADMINISTRATION: Topical

CONTRAINDICATIONS:
Patient with known hypersensitivity to any of the ingredients in the product.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:
Stop using if irritation occurs and seek medical advice immediately.

For external use only.

Keep out of reach of children.

PHARMACODYNAMICS:
Chloroxylenol is an antiseptic agent whose activity is principally against Streptococci, but also has some activity against Staphylococci. Triclosan is bacteriostatic Gram- positive and most Gram- negative organisms. It has a little activity against Pseudomonas spp., yeasts or fungi.

PHARMACOKINETICS:
Animal studies have shown that following dermal application of chloroxylenol is rapidly absorbed (Cmax = 1 – 2 hours), extensively metabolised and excreted via the kidney with almost complete elimination within 24 hours. In man, similar application of triclosan resulted in only minimal percutaneous absorption (around 5%) following 24 hours occlusion to the skin.

EFFECTS ON ABILITY TO DRIVE AND USE MACHINES: Not known

INTERACTIONS WITH OTHER MEDICAMENTS:
Not known

STATEMENT ON USAGE DURING PREGNANCY AND LACTATION:
There is inadequate evidence of the safety of the drug in human pregnancy and lactation.

ADVERSE EFFECTS/ UNDESIRABLE EFFECTS:
Not known

KRIM ANTISEPTIK
CAP KAKI TIGA

BAHAN AKTIF:
Chloroxylenol 0.3%w/w, Triclosan 0.3%w/w
Bahan Pengawet:Chlorocresol 0.2%w/w

DESKRIPSI PRODUK:
Krim berwarna putih, mudah disapu, melekit dan mempunyai ciri-ciri bau.

INDIKASI:
Sebagai antiseptik bagi kecederaan kulit seperti luka, melecet, luka terinfeksi dan luka akibat terbakar.

CARA PENGGUNAAN:
Sapu krim ini di bahagian yang dijangkiti 2-3 kali sehari. Bersihkan tangan sebelum dan selepas setiap penggunaan.

CARA PENGAMBILAN: Topikal

KONTRAINDIKASI:
Pesakit yang diketahui hipersensitif kepada mana-mana ramuan dalam produk ini.

AMARAN DAN PERHATIAN:
Hentikan penggunaan jika kerengsaan berlaku dan dapatkan nasihat perubatan dengan serta-merta.

Untuk kegunaan luar sahaja.

Jauhkan daripada capaian kanak- kanak.

FARMAKODINAMIK:
Chloroxylenol adalah agen antiseptik yang aktif menentang Streptococci, tetapi ia juga mempunyai aktiviti menentang Staphylococci. Triclosan adalah bakterostatik Gram-positif dan kebanyakan organisma Gram-negatif. Ia mempunyai sedikit aktiviti terhadap Pseudomonas spp. ragi atau kulat.

FARMAKOKINETIK:
Pengujaan haiwan menunjukkan bahawa penggunaan chloroxylenol pada kulit boleh diserap dengan cepat (Cmax = 1 - 2 jam), ia boleh dimetabolismekan dan dikeluarkan melalui buah pinggang dengan penghapusan hampir lengkap dalam tempoh 24 jam. Dalam manusia, aplikasi triclosan yang serupa hanya menghasilkan penyerapan percutaneous yang minimum (kira-kira 5%) berikutan oklusi 24 jam ke kulit.

KESAN KE ATAS KEUPAYAAN MEMANDU DAN PENGGUNAAN MESIN:
Tidak diketahui

INTERAKSI DENGAN UBAT LAIN:
Tidak diketahui

KEHAMILAN DAN PENYUSUAN:
Tiada bukti yang mencukupi tentang keselamatan untuk penggunaan ubat ini semasa kehamilan dan laktasi.

三脚标消毒膏

活性成份：
氯二甲酚0.3 %w/ w，三氯生0.3 %w/w
防腐剂：氯甲酚0.2 %w/w

产品描述：
白色药膏，容易涂抹，有粘性且具有特殊味道。

主治：
作为皮肤损伤、割伤、擦伤、伤口感染和烧伤的消毒剂。

用法：
将此药轻轻涂抹于患处，每日二至三次。使用前后需将双手洗净。

给药途径：外用

禁忌：
已知对产品中任何成份过敏的患者。

注意与防范：
如有不适，请停止使用并就医诊治。

仅限于外用。
远离儿童。

药效学：
氯二甲酚是一种抗菌剂，其活性主要针对链球菌，但对葡萄球菌也有一定的活性。三氯生可抑制革兰氏阳性菌和大多数革兰阴性菌。它对假单胞菌属，酵母菌或真菌有一点活性。

药代动力学：
动物研究表明，涂抹氯二甲酚在皮肤将迅速被吸收（Cmax = 1-2小时），经过肾脏的代谢与排泄，可在24小时内几乎完全消除。涂抹三氯生于人类皮肤上，仅有少量可经皮吸收（约5%），且皮肤将在24小时后闭塞。

对驱动和使用机器的能力的影响：
未知

与其他药物的相互作用：
未知

怀孕及哺乳：
此药物对怀孕及哺乳期妇女的安全性使用数据不足。

副作用：
未知

过量的症状和治疗：
摄取足量的乳膏不太可能引起任何医疗问题。若乳膏不小心接触眼睛，请用温水清洗。

贮存：
储藏低于30°C。避免阳光直射处。



Three Legs

Antiseptic

Cream

Chloroxylenol 0.3%w/w, Triclosan 0.3%w/w Preservative: Chlorocresol 0.2%w/w

THREE LEGS
ANTISEPTIC CREAM

SYMPTOMS AND TREATMENT OF OVERDOSE:
It is unlikely that a sufficient volume of the cream could be ingested to cause any medical problems. In the event of accidental eye contact, wash with lukewarm water.

STORAGE CONDITIONS:
Store below 30°C. Protect from direct sunlight.

SHELF LIFE: Please refer to the packaging. Do not use beyond the expiry date.

DOSAGE FORM: Cream

PACKING SIZE: 10g, 15g, and 30g in aluminum tube

The information contained in this leaflet is limited. For further information, please consult your pharmacist or doctor.

KRIM ANTISEPTIK
CAP KAKI TIGA

KESAN SAMPINGAN:
Tidak diketahui.

SIMPTOM DAN RAWATAN UNTUK KELEBIHAN DOS:
Pengambilan krim yang mencukupi tidak mungkin akan menyebabkan masalah perubatan. Sekiranya krim terkena pada mata, basuh dengan air suam.

KEADAAN PENYIMPANAN:
Simpan di bawah 30°C. Lindungi daripada pancaran matahari.

TEMPOH HAYAT: Sila rujuk kepada bungkusan. Jangan guna selepas tamat tarikh luput.

DOS: Krim

SAIZ BUNGKUSAN: 10g, 15g dan 30g dalam tiub aluminium

Maklumat terkandung di dalam risalah ini adalah terhad. Untuk maklumat yang terperinci, sila hubungi ahli farmasi atau doktor.

三脚标消毒膏

保质期：请参考包装。勿在有效期限之后使用。

剂型：乳膏

包装：10克、15克和30克铝管

此说明书仅属略述，欲知更详细资，可咨询您的药剂师或医生。

Date of Revision: JUNE 2025

Manufactured by Product Registration Holder:
Syarikat Wen Ken Drug Sdn Bhd
24, Jalan Lambak, Taman Johor,
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Singapore Distributor:
Wen Ken Marketing (S) Pte Ltd
2, Alexandra Road, #02-08, Delta House,
Singapore 159919.