



Cálculo Diferencial Aplicado  
Grado en Ingeniería Informática  
Primer examen de evaluación continua  
11 Noviembre 2019

Nombre		Grupo	
--------	--	-------	--

**Cuestión 1 (1 punto)** Dada la siguiente ecuación diferencial ordinaria (EDO)

$$\cos(x) \cos(y) + 4x^3 + 2xy^2 + (4y^3 + 2x^2y - \sin(x) \sin(y))y' = 0,$$

se pide:

- [0.2 puntos] Clasificar la ecuación, razonando la respuesta.
- [0.7 puntos] Hallar la solución general de la EDO.
- [0.1 puntos] Comprobar la solución obtenida en el apartado anterior.

**Solución:**

- Es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden (la máxima derivada de la función incógnita es la derivada primera), no lineal (la ecuación tiene términos no lineales, por ejemplo  $y^2$ ).

Por otro lado, la EDO es de la forma  $M(x, y) + N(x, y)y' = 0$ , donde:

$$M(x, y) = \cos(x) \cos(y) + 4x^3 + 2xy^2 \text{ y } N(x, y) = 4y^3 + 2x^2y - \sin(x) \sin(y).$$

Se verifica que:

$$\frac{\partial M}{\partial y}(x, y) = 4xy - \cos(x) \sin(y) = \frac{\partial N}{\partial x}(x, y) \implies \text{la EDO es exacta.}$$

- Como la EDO es exacta, existe una función  $F(x, y)$  que satisface:

$$(1) \quad \frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = M(x, y) = \cos(x) \cos(y) + 4x^3 + 2xy^2$$

$$(2) \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = N(x, y) = 4y^3 + 2x^2y - \sin(x) \sin(y)$$

Integrando la ecuación (1) en la variable  $x$  se obtiene:  $F(x, y) = \sin(x) \cos(y) + x^4 + x^2y^2 + g(y)$ .  
Derivando  $F$  parcialmente respecto de  $y$  e igualando el resultado al proporcionado por la ecuación (2) se tiene que:  $\frac{dg}{dy}(y) = 4y^3 \implies g(y) = y^4$ , donde hemos tomado la constante de integración igual a cero.

Por tanto,  $F(x, y) = \sin(x) \cos(y) + x^4 + x^2 y^2 + y^4$  y la solución general, en forma implícita, pedida es:

$$\boxed{\sin(x) \cos(y) + x^4 + x^2 y^2 + y^4 = C},$$

donde  $C$  es una constante.

- iii) Teniendo en cuenta que  $y = y(x)$ , derivamos la ecuación implícita respecto de la variable independiente  $x$  y se obtiene:

$$\cos(x) \cos(y) - \sin(x) \sin(y) y' + 4x^3 + 2xy^2 + 2x^2 y y' + 4y^3 y' = 0,$$

por tanto:

$$\cos(x) \cos(y) + 4x^3 + 2xy^2 + (4y^3 + 2x^2 y - \sin(x) \sin(y)) y' = 0.$$

**Cuestión 2 (1 punto)** Dado el siguiente problema de valor inicial (PVI)

$$y'' - 4y' + 5y = 5e^{2t}; \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1,$$

Se pide:

- [0.5 puntos]** Hallar la solución del PVI utilizando la transformada de Laplace.
- [0.5 puntos]** Hallar la solución del PVI obteniendo una solución particular por el método de los coeficientes indeterminados.

**Solución:**

- i) Sea  $\mathcal{L}\{y\} = F(s)$ , la transformada de Laplace (TL) de la incógnita. Aplicando la TL a la ecuación, se tiene:  $(s^2 - 4s + 5)F(s) = \frac{s+3}{s-2}$ , por tanto,

$$F(s) = \frac{s+3}{(s^2 - 4s + 5)(s-2)} = \frac{Ms + N}{s^2 - 4s + 5} + \frac{A}{(s-2)},$$

Sumando las fracciones

$$\frac{s+3}{(s^2 - 4s + 5)(s-2)} = \frac{(M+A)s^2 + (-2M+N-4A)s - 2N+5A}{(s^2 - 4s + 5)(s-2)},$$

e identificando numeradores se obtiene:  $M = -5, N = 11, A = 5$ . Por tanto:

$$F(s) = 5 \frac{1}{s-2} - 5 \frac{s-2}{(s-2)^2 + 1} + \frac{1}{(s-2)^2 + 1}$$

Finalmente, tomando la transformada inversa  $\mathcal{L}^{-1}$ ,

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}(F(s)) = 5\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s-2}\right) - 5\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{s-2}{(s-2)^2 + 1}\right) + \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{(s-2)^2 + 1}\right) =$$

y la solución del PVI es,

$$\boxed{y(t) = 5e^{2t} + e^{2t} \sin(t) - 5e^{2t} \cos(t) = (5 + \sin(t) - 5 \cos(t))e^{2t}}$$

- ii) Se trata de una ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea con coeficientes constantes. Su solución general es de la forma  $y(t) = y_h(t) + y_p(t)$ , donde  $y_h$  es la solución general de la ecuación homogénea,  $y'' - 4y' + 5y = 0$ , e  $y_p$  es una solución particular de la ecuación diferencial no homogénea.

Cálculo de  $y_h(x)$ :

La ecuación característica,  $\lambda^2 - 4\lambda + 5 = 0$ , tiene por soluciones,  $\lambda_1 = 2 + i$ , y  $\lambda_2 = 2 - i$ , que son raíces complejas conjugadas, por tanto un conjunto fundamental de soluciones es de la forma  $\mathcal{B} = \{e^{2t} \cos(t), e^{2t} \sin(t)\}$ .

Concluimos que

$$y_h(t) = c_1 e^{2t} \cos(t) + c_2 e^{-2t} \sin(t),$$

donde  $c_1$  y  $c_2$  son dos constantes reales.

Cálculo de  $y_p(t)$ :

Dado que el lado derecho de la ecuación diferencial es de la forma  $g(t) = 5e^{2t}$  y que además no forma parte del conjunto de soluciones de la ecuación homogénea, aplicamos el método de los coeficientes indeterminados proponiendo una solución particular de la forma:  $y_p(t) = Ae^{2t}$ .

Sustituyendo  $y_p$  en la ecuación diferencial e identificando términos del lado izquierdo con el lado derecho se obtiene que:  $Ae^{2t} = 5e^{2t} \implies A = 5$

Con esto se obtiene la solución general de la ecuación:

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t) = c_1 e^{2t} \cos(t) + c_2 e^{2t} \sin(t) + 5e^{2t}$$

Ahora calculamos las constantes  $c_1$  y  $c_2$  imponiendo las condiciones iniciales y se obtiene:  $y(0) = c_1 + 5 = 0$ ,  $y'(0) = 2c_1 + c_2 + 10 = 1$ , por tanto  $c_1 = -5$ ;  $c_2 = 1$ . Finalmente, la solución del PVI es

$$y(t) = 5e^{2t} + e^{2t} \sin(t) - 5e^{2t} \cos(t) = (5 + \sin(t) - 5 \cos(t))e^{2t}$$

---