

## Ejercicios

1. Comprobar que la siguiente deducción no es correcta utilizando el método de Resolución.

$$\forall x \exists y P(x, y) \Rightarrow \exists y \forall x P(x, y)$$

- (1)  $\forall x \exists y P(x, y) \wedge \sim \exists y \forall x P(x, y)$
- (2)  $\forall x \exists y P(x, y) \wedge \forall y \exists x \sim P(x, y)$
- (3)  $\forall x (\exists y P(x, y) \wedge \forall y \exists u \sim P(u, y))$
- (4)  $\forall x \exists y (P(x, y) \wedge \forall v \exists u \sim P(u, v))$
- (5)  $\forall x \exists y \forall v (P(x, y) \wedge \exists u \sim P(u, v))$
- (6)  $\forall x \exists y \forall v \exists u (P(x, y) \wedge \sim P(u, v))$  (Prenex)
- (7)  $\forall x \forall v \exists u (P(x, f(x)) \wedge \sim P(u, v))$
- (8)  $\forall x \forall v (P(x, f(x)) \wedge \sim P(g(x, v), v))$  (Skolem)

Cláusula 1:  $P(x, f(x))$

Cláusula 2:  $\sim P(g(x, v), v)$

No se puede hacer ninguna sustitución que unifique las dos cláusulas anteriores. Es importante ver que hay que sustituir una variable cada vez que aparece en una cláusula: es decir, en  $P(x, f(x))$  la sustitución debe hacerse igual en los dos sitios donde aparece  $x$ . En las dos cláusulas sí que se puede reemplazar la  $x$  por variables distintas si se desea.

2. Comprobar, mediante el método de Resolución, si la siguiente deducción es correcta.

$$\exists x \forall y (A(x, y) \rightarrow B(y, x) \vee C(y))$$

$$\forall x \forall y (D(x, y) \rightarrow \sim C(x))$$

$$D(a, b) \wedge \forall x \forall y A(x, y)$$

$$\text{-----}$$

$$\exists x B(a, x)$$

Premisa 1:

$$(1) \exists x \forall y (A(x, y) \rightarrow B(y, x) \vee C(y)) \quad \leftrightarrow \text{Interdef.}$$

$$(2) \exists x \forall y (\sim A(x, y) \vee B(y, x) \vee C(y))$$

Premisa 2:

$$(1) \forall x \forall y (D(x, y) \rightarrow \sim C(x)) \quad \leftrightarrow \text{Interdef.}$$

$$(2) \forall x \forall y (\sim D(x, y) \vee \sim C(x))$$

Premisa 3: No requiere más transformación.

Conclusión:

$$(1) \sim \exists x B(a, x) \leftrightarrow \text{Interdef}$$

$$(2) \forall x \sim B(a, x)$$

Pasamos a forma PRENEX la fórmula  $P1 \wedge P2 \wedge P3 \wedge \sim Q$ , que comprobaremos si es insatisfacible:

$$(1) \exists x \forall y (\sim A(x,y) \vee B(y,x) \vee C(y)) \wedge \forall x \forall y (\sim D(x,y) \vee \sim C(x)) \wedge D(a,b) \wedge \forall x \forall y A(x,y) \wedge \forall x \sim B(a,x)$$

$$(2) \exists x \forall y (\sim A(x,y) \vee B(y,x) \vee C(y)) \wedge \forall u \forall v (\sim D(u,v) \vee \sim C(u)) \wedge D(a,b) \wedge \forall r \forall s A(r,s) \wedge \forall t \sim B(a,t)$$

$$(3) \exists x \forall y \forall u \forall v \forall r \forall s \forall t ((\sim A(x,y) \vee B(y,x) \vee C(y)) \wedge (\sim D(u,v) \vee \sim C(u)) \wedge D(a,b) \wedge A(r,s) \wedge \sim B(a,t))$$

Transformamos a forma de Skolem y extraemos las cláusulas. No hay que hacer cierre existencial porque no hay variables libres. Luego sustituir los existenciales que están en cabeza por constantes:

$$(1) \exists x \forall y \forall u \forall v \forall r \forall s \forall t ((\sim A(x,y) \vee B(y,x) \vee C(y)) \wedge (\sim D(u,v) \vee \sim C(u)) \wedge D(a,b) \wedge A(r,s) \wedge \sim B(a,t))$$

$$(2) \forall y \forall u \forall v \forall r \forall s \forall t ((\sim A(c,y) \vee B(y,c) \vee C(y)) \wedge (\sim D(u,v) \vee \sim C(u)) \wedge D(a,b) \wedge A(r,s) \wedge \sim B(a,t))$$

Cláusula 1:  $\sim A(c,y) \vee B(y,c) \vee C(y)$

Cláusula 2:  $\sim D(u,v) \vee \sim C(u)$

Cláusula 3:  $D(a,b)$

Cláusula 4:  $A(r,s)$

Cláusula 5:  $\sim B(a,t)$

Resolventes:

Cláusula 6:  $B(s,c) \vee C(s)$  Cambios y/s r/c en 1 y 4

Cláusula 7:  $C(a)$  Cambios s/a t/c en 6 y 5

Cláusula 8:  $\sim D(a,v)$  Cambios u/a en 2 y 7

Cláusula vacía: Cambios v/b en 3 y 8

La deducción es correcta porque la fórmula que comprobamos es insatisfacible.

3. Comprobar, mediante el método de Resolución, si la siguiente deducción es correcta.

$$\forall x \exists y ((\sim P(x,a) \vee P(y,x)) \rightarrow (Q(y) \wedge \sim P(y,x))) \wedge [Q(y) \rightarrow R(x)]$$

---


$$\exists x \sim (R(x) \rightarrow P(x,a))$$

a) Obtenemos la forma Prenex correspondiente a la premisa, y la ponemos en forma conjuntiva de cara a la transformación en Skolem.

1.  $\forall x \exists y ((\sim P(x,a) \vee P(y,x)) \rightarrow (Q(y) \wedge \sim P(y,x))) \wedge [Q(y) \rightarrow R(x)]$
2.  $\forall x \exists y ([\sim(\sim P(x,a) \vee P(y,x)) \vee (Q(y) \wedge \sim P(y,x))] \wedge [\sim Q(y) \vee R(x)])$
3.  $\forall x \exists y ((P(x,a) \wedge \sim P(y,x)) \vee (Q(y) \wedge \sim P(y,x))) \wedge [\sim Q(y) \vee R(x)]$
4.  $\forall x \exists y ((P(x,a) \vee Q(y)) \wedge \sim P(y,x)) \wedge [\sim Q(y) \vee R(x)]$  (Distributiva  $A \wedge (B \vee C)$ )
5.  $\forall x \exists y ([P(x,a) \vee Q(y)] \wedge \sim P(y,x) \wedge [\sim Q(y) \vee R(x)])$  (Asociativa)

b) Obtenemos la forma Prenex correspondiente a la conclusión negada:

1.  $\sim \exists x \sim (R(x) \rightarrow P(x,a))$
2.  $\forall x (R(x) \rightarrow P(x,a))$
3.  $\forall x (\sim R(x) \vee P(x,a))$

c) Pasamos a skolem  $P \wedge \sim Q$

1.  $\forall x \exists y ([P(x,a) \vee Q(y)] \wedge \sim P(y,x) \wedge [\sim Q(y) \vee R(x)]) \wedge \forall x [\sim R(x) \vee P(x,a)]$
2.  $\forall x (\exists y ([P(x,a) \vee Q(y)] \wedge \sim P(y,x) \wedge [\sim Q(y) \vee R(x)]) \wedge \forall z [\sim R(z) \vee P(z,a)])$
3.  $\forall x \exists y ([P(x,a) \vee Q(y)] \wedge \sim P(y,x) \wedge [\sim Q(y) \vee R(x)] \wedge \forall z [\sim R(z) \vee P(z,a)])$
4.  $\forall x \exists y \forall z ([P(x,a) \vee Q(y)] \wedge \sim P(y,x) \wedge [\sim Q(y) \vee R(x)] \wedge [\sim R(z) \vee P(z,a)])$
5.  $\forall x \exists y \forall z ([P(x,a) \vee Q(y)] \wedge \sim P(y,x) \wedge [\sim Q(y) \vee R(x)] \wedge [\sim R(z) \vee P(z,a)])$  (Prenex)
6.  $\forall x \forall z ([P(x,a) \vee Q(f(x))] \wedge \sim P(f(x),x) \wedge [\sim Q(f(x)) \vee R(x)] \wedge [\sim R(z) \vee P(z,a)])$   
("y" cambia a la función "f(x)")

Cláusulas de la forma de Skolem

$$P(x, a) \vee Q(f(x)), \sim P(f(x), x), \sim Q(f(x)) \vee R(x), \sim R(z) \vee P(z, a)$$

d) Resolución

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| (1) $P(x, a) \vee Q(f(x))$   | Cláusula 1                             |
| (2) $\sim P(f(x), x)$        | Cláusula 2                             |
| (3) $\sim Q(f(x)) \vee R(x)$ | Cláusula 3                             |
| (4) $\sim R(z) \vee P(z, a)$ | Cláusula 4                             |
| (5) $P(x, a) \vee R(x)$      | Resolución 1,3                         |
| (6) $P(x, a)$                | Resolución (z/x) 4,5                   |
| (7) $P(f(a), a)$             | Resolución (x/a en 2, x/f(a) en 6) 2,6 |
| (8) Cláusula vacía           | Resolución (x/a) 2,7                   |

En la línea 7 se usa una sustitución diferente para la “x” en la cláusula 2 (x2) y en la cláusula 6 (x6). Como es posible obtener la cláusula vacía, la deducción original es correcta.

4. Comprobar, mediante el método de Resolución, si la siguiente deducción es correcta.

$$\forall x \exists y (E(x) \rightarrow E(y) \wedge M(y, x))$$

$$\forall x (\sim \exists y M(y, x) \rightarrow \sim E(x))$$

- (1)  $\forall x \exists y (E(x) \rightarrow E(y) \wedge M(y, x)) \wedge \sim \forall x (\sim \exists y M(y, x) \rightarrow \sim E(x))$
- (2)  $\forall x \exists y (E(x) \rightarrow E(y) \wedge M(y, x)) \wedge \exists x \sim (\sim \exists y M(y, x) \rightarrow \sim E(x))$
- (3)  $\forall x \exists y (E(x) \rightarrow E(y) \wedge M(y, x)) \wedge \exists x (\sim \exists y M(y, x) \wedge E(x))$
- (4)  $\forall x \exists y (\sim E(x) \vee (E(y) \wedge M(y, x))) \wedge \exists x (\sim \exists y M(y, x) \wedge E(x))$
- (5)  $\forall x \exists y ((\sim E(x) \vee E(y)) \wedge (\sim E(x) \vee M(y, x))) \wedge \exists x (\forall y \sim M(y, x) \wedge E(x))$
- (6)  $\exists u (\forall x \exists y ((\sim E(x) \vee E(y)) \wedge (\sim E(x) \vee M(y, x))) \wedge \forall y \sim M(y, u) \wedge E(u))$
- (7)  $\exists u \forall x (\exists y ((\sim E(x) \vee E(y)) \wedge (\sim E(x) \vee M(y, x))) \wedge \forall y \sim M(y, u) \wedge E(u))$
- (8)  $\exists u \forall x \exists y ((\sim E(x) \vee E(y)) \wedge (\sim E(x) \vee M(y, x)) \wedge \forall v \sim M(v, u) \wedge E(u))$
- (9)  $\exists u \forall x \exists y \forall v ((\sim E(x) \vee E(y)) \wedge (\sim E(x) \vee M(y, x)) \wedge \sim M(v, u) \wedge E(u))$  (Prenex)
- (10)  $\forall x \exists y \forall v ((\sim E(x) \vee E(y)) \wedge (\sim E(x) \vee M(y, x)) \wedge \sim M(v, a) \wedge E(a))$
- (11)  $\forall x \forall v ((\sim E(x) \vee E(f(x))) \wedge (\sim E(x) \vee M(f(x), x)) \wedge \sim M(v, a) \wedge E(a))$  (Skolem)

Cláusulas:

$$C1: \sim E(x) \vee E(f(x))$$

$$C2: \sim E(x) \vee M(f(x), x)$$

$$C3: \sim M(v, a)$$

$$C4: E(a)$$

$$C5: \sim E(a) \vee M(f(a), a) \quad x/a \text{ en } C2$$

$$C6: M(f(a), a) \text{ resolución } C4 \text{ y } C5$$

$$C7: \text{vacía } v/f(a) \text{ en } C3 \text{ y resolución con } C6$$

5. Compruebe, mediante el método de resolución, si la siguiente deducción es correcta.

$$\sim (\exists x (P(x) \wedge \sim Q(x))), \forall x (Q(x) \rightarrow R(x)), \forall x (\sim P(x) \rightarrow S(x)) \Rightarrow \forall x (\sim R(x) \rightarrow S(x))$$

1.  $\sim (\exists x (P(x) \wedge \sim Q(x))) \wedge \forall x (Q(x) \rightarrow R(x)) \wedge \forall x (\sim P(x) \rightarrow S(x)) \wedge \sim \forall x (\sim R(x) \rightarrow S(x))$
2.  $\sim (\exists x (P(x) \wedge \sim Q(x))) \wedge \forall x ((\sim Q(x) \vee R(x)) \wedge \forall x (P(x) \vee S(x)) \wedge \sim \forall x (R(x) \vee S(x)))$
3.  $\forall x (\sim P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall x (\sim Q(x) \vee R(x)) \wedge \forall x (P(x) \vee S(x)) \wedge \exists x (\sim R(x) \wedge \sim S(x))$
4.  $\forall x (\sim P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall y (\sim Q(y) \vee R(y)) \wedge \forall z (P(z) \vee S(z)) \wedge \exists w (\sim R(w) \wedge \sim S(w))$
5.  $\exists w [\forall x (\sim P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall y (\sim Q(y) \vee R(y)) \wedge \forall z (P(z) \vee S(z)) \wedge \sim R(w) \wedge \sim S(w)]$
6.  $\exists w [\forall x \forall y \forall z (\sim P(x) \vee Q(x)) \wedge (\sim Q(y) \vee R(y)) \wedge (P(z) \vee S(z)) \wedge \sim R(w) \wedge \sim S(w)]$

$$7. \quad \forall x \forall y \forall z (\sim P(x) \vee Q(x)) \wedge (\sim Q(y) \vee R(y)) \wedge (P(z) \vee S(z)) \wedge \sim R(a) \wedge \sim S(a)$$

Cláusulas

C1:  $\sim P(x) \vee Q(x)$

C2:  $\sim Q(y) \vee R(y)$

C3:  $P(z) \vee S(z)$

C4:  $\sim R(a)$

C5:  $\sim S(a)$

C6:  $\sim Q(a)$       y/a en C2 y Resol a C2 y C4

C7:  $\sim P(a)$       x/a en C1 y resol C1 y C6

C8:  $S(a)$       z/a en C3 y resol a C3 y C7

C9: vacía      Resol C5 y C8