

ALJABAR  
LINEAR



K  
E  
L  
O  
M  
P  
O  
K  
2

PERKALIAN  
SILANG DAN  
PENGAPLIKASI  
ANNYA



01

YEHEZKIEL  
( 19102028 )

02

SYIFA WIDI  
( 19102261 )

03

RANGGA  
( 19102248 )

04

KAKA  
( 19102100 )

05 Raik


( 19102072 )



# Perkalian silang dan pengaplikasianya

PERKALIAN SILANG DUA VEKTOR atau biasa disebut dengan *cross product*. Operasi perkalian silang dua vektor ( cross product ) merupakan kelanjutan dari operasi lain pada vektor , perkalian silang dua vektor menghasilkan vektor lain tegak lurus dengan kedua vektor yang dikalikan. Berbeda dengan perkalian dot yang menghasilkan skalar . PERKALIAN SILANG DUA VEKTOR memiliki aplikasi yang cukup luas diantaranya menentukan jarak titik garis , menentukan luas bangun datar , volume bangun ruang , dan jarak dua garis.

# DEFINISI PERKALIAN SILANG (CROSS PRODUCT)



Perhatikan ilustrasi gambar di atas. Jika  $\vec{a} \neq \vec{0}$  dan  $\vec{b} \neq \vec{0}$  dalam ruang dapat diputar tanpa mengubah besar atau arah masing-masing sehingga titik pangkalnya berimpit, dengan kaidah tangan kanan (ulir kanan) didefinisikan bahwa:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{e} |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

dengan :

$\vec{e}$  = vektor satuan yang tegak lurus  $\vec{a}$  dan  $\vec{b}$

$\theta$  = sudut antara vektor  $\vec{a}$  dan vektor  $\vec{b}$

$\vec{a} \times \vec{b}$  dibaca "vektor  $\vec{a}$  kros vektor  $\vec{b}$ " atau cukup " $\vec{a}$  kros  $\vec{b}$ "

(Thomas, 1986 : 727 - 730)



## MENENTUKAN HASIL PERKALIAN SILANG 2

# crossproduct

Misalkan terdapat vektor  $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$  dan  $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ , hasil perkalian silang kedua vektor dapat kita tentukan dengan cara :

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1) \text{ atau}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2) \vec{i} + (a_3 b_1 - a_1 b_3) \vec{j} + (a_1 b_2 - a_2 b_1) \vec{k}$$

Bentuk penghitungan di atas dapat kita tuliskan dengan bentuk lainnya yang kita namakan "rumus determinan cross vektor" sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\vec{a} \times \vec{b} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \begin{matrix} | \\ | \\ | \end{matrix} \begin{matrix} i \\ a_1 \\ b_1 \\ j \\ a_2 \\ b_2 \\ k \\ a_3 \\ b_3 \end{matrix} \\ &= (a_2 b_3 - a_3 b_2) \vec{i} + (a_3 b_1 - a_1 b_3) \vec{j} + (a_1 b_2 - a_2 b_1) \vec{k}\end{aligned}$$

- 1).  $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$  (**sifat anti komutatif**)
  
- 2).  $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$  (**sifat distributif**)

---

- 3).  $(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}$  (**sifat distributif**)
- 4).  $k(\vec{a} \times \vec{b}) = (k\vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (k\vec{b})$
- 5). Jika  $\vec{a} \neq 0$ ,  $\vec{b} \neq 0$  dan  $\vec{a} \times \vec{b} = 0$ , maka  $\vec{a}$  sejajar  $\vec{b}$



CONTOH  
SOAL





## CONTOH SOAL KE 1

1. Hitunglah hasil perkalian silang antara dua vektor berikut.

a)  $A = (2i + k)$  dan  $B = (4i + 5j)$

penyelesaian :

Hasil perkalian silang antara vektor A dan B adalah sebagai berikut.

$$A \times B = (2i + k) \times (4i + 5j)$$

$$\Rightarrow A \times B = (2)(4)(i \times i) + (2)(5)(i \times j) + (1)(4)(k \times i) + (1)(5)(k \times j)$$

$$\Rightarrow A \times B = (8)(0) + (10)(k) + (4)(j) + (5)(-i)$$

$$\Rightarrow A \times B = 10k + 4j - 5i$$

$$\Rightarrow A \times B = -5i + 4j + 10k$$



## CONTOH SOAL KE 2

Dua buah vektor memiliki komponen 3D pada sumbu kartesian. Jika vektor  $A = 2\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + \mathbf{k}$  dan vektor  $B = 5\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 7\mathbf{k}$ . Tentukan hasil perkalian silang (Cross Product) antara vektor A . B.

## PENYELESAIAN SOAL KE 2

$$\mathbf{A} = 2\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + \mathbf{k} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{B} = -5\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 7\mathbf{k} = \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 5 & 1 \\ -5 & 4 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 7 \end{vmatrix} \mathbf{i} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 7 & -5 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ -5 & 4 \end{vmatrix} \mathbf{k}$$

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = [(5)(7) - (1)(4)]\mathbf{i} + [(1)(-5) - (2)(7)]\mathbf{j} + [(2)(4) - (5)(-5)]\mathbf{k}$$

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = [35 - 4]\mathbf{i} + [-5 - 14]\mathbf{j} + [8 + 25]\mathbf{k} = 31\mathbf{i} - 19\mathbf{j} + 33\mathbf{k}$$



## CONTOH SOAL KE 3

Jika diketahui vektor  $a = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 5\mathbf{k}$  dan  $b = -\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$ , maka nilai  
 $b \times a = \dots$



$$\vec{a} = 3i - 2k = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\vec{b} = 2i - j = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{b} \times \vec{a} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & -3 & 0 \\ 2 & -1 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= i \begin{vmatrix} -3 & 0 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} - j \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= -15i + 5j + 7k$$

Jadi  $\vec{b} \times \vec{a} = -15i + 5j + 7k.$



## CONTOH SOAL KE 4

5. Diketahui vektor  $A = 2i + 5j + k$  dan vektor  $B = 5i + 4j + 7k$ . Tentukan hasil perkalian silang antara vektor A dan B.  
Penyelesaiannya :

# Penyelesaiannya :

\*). Menentukan hasil perkalian silang (Metode Sarrus) :

$$\begin{aligned}\vec{a} \times \vec{b} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix} \mid \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} \\ 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= (-1 \cdot -2\vec{i} + 1 \cdot 3\vec{j} + 2 \cdot 2\vec{k}) - (2 \cdot 3\vec{i} + 2 \cdot (-2)\vec{j} + 1 \cdot (-1)\vec{k}) \\ &= (2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}) - (6\vec{i} - 4\vec{j} - \vec{k}) \\ &= 2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k} - 6\vec{i} + 4\vec{j} + \vec{k} \\ &= -4\vec{i} + 7\vec{j} + 5\vec{k}\end{aligned}$$

Jadi, hasil dari  $\vec{a} \times \vec{b} = -4\vec{i} + 7\vec{j} + 5\vec{k}$ .

## CONTOH SOAL KE 5

Jika hasil penjumlahan silang antara  $\vec{a} = (p, 2, r)$  dan  $\vec{b} = (-1, 4, 3)$  adalah  $(2, 5, -6)$ , maka tentukan nilai  $(-p-r)^{2019} + 2020$  !

Jawab:  $\vec{a} \times \vec{b} = (2, 5, -6)$

$$(2, 5, -6) = (6-4r, -r-3p, 4p+2)$$

Menentukan  $\vec{a} \times \vec{b} =$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ p & 2 & r \\ -1 & 4 & 3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} \\ p & 2 \\ -1 & 4 \end{vmatrix}$$
$$2 = 6-4r, r=1$$
$$-6 = 4p+2, p=-2$$

Maka :

$$\begin{aligned} & (-p-r)^{2019} + 2020 = \\ & (-(-2)-1)^{2019} + 2020 = \\ & (1)^{2019} + 2020 \end{aligned}$$

$$= 1 + 2020 \Rightarrow 2021$$



THANKYOU

