

Chapter 4 Series

定义. 幂级数

$$\sum_{n=0}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n$$

定义. Fourier 级数

$$\sum_{n=0}^{+\infty} C_n e^{in\theta} = \sum_{n=0}^{+\infty} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta)$$

定义. Taylor 级数

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$

定义. Laurent 级数

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n$$

定理. Abel 定理 若 $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} C_n z^n$ 在 z_0 收敛, 则 $\forall z$ 有 $|z| < |z_0|$ 时 $f(z)$ 绝对收敛. 若存在 z_0 , $f(z)$ 在 z_0 发散, 则 $\forall z$ 有 $|z| > |z_0|$ 时 $f(z)$ 发散. (即幂级数的收敛域是圆盘)

定义. 收敛半径 若存在常数 $R > 0$, 当 $|z| < R$ 时, $f(z)$ 绝对收敛, 而当 $|z| > R$ 时, $f(z)$ 发散, 这时 R 称为 $f(z)$ 的收敛半径.

定理. 若

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{C_n}{C_{n+1}} \right| = \lambda$$

则 $R = \lambda$

定理. 若

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{\sqrt{n} C_n} \right| = \lambda$$

则 $R = \lambda$

定理. 若 $f(z)$ 只有有限个奇点, 则离原点最近的奇点 z_0 的模即为收敛半径.

定理. 若 $f(z)$ 在 z_0 处条件收敛, 则 $R = |z_0|$

定理. 若 $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} C_n z^n$ 满足 $C_n = a_n + b_n$ $a_n, b_n \in \mathbb{R}$ 且 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ 的收敛半径是 R_1 , $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n$ 的收敛半径是 R_2 , 则 $R = \min\{R_1, R_2\}$

Problem 1

将 $\frac{1}{z-b}$ 在 $z_0 = a$ 处展成 Laurent 级数, $a \neq b$

Solution

$$\begin{aligned}
\frac{1}{z-b} &= \frac{1}{-(b-a) + (z-a)} \\
&= \frac{1}{a-b} \frac{1}{1 - \frac{z-a}{b-a}} \\
&= \frac{1}{a-b} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z-a)^n}{(b-a)^n} \\
&= \frac{1}{a-b} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)(z-a)^n}{(b-a)^{n+1}}
\end{aligned}$$

条件

$$\left| \frac{z-a}{b-a} \right| < 1$$

即

$$0 \leq |z-a| < |b-a|$$

Problem 2

求

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$$

的 Laurent 级数 **Solution**

1. 当 $0 < |z-1| < 1$ 时

$$\begin{aligned}
f(z) &= \frac{(z-1) - (z-2)}{(z-1)(z-2)} \\
&= \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} \\
&= \frac{1}{z-1-1} - \frac{1}{z-1} \\
&= -\frac{1}{1-(z-1)} - \frac{1}{z-1} \\
&= -\sum_{n=0}^{+\infty} (z-1)^n - \frac{1}{z-1} \\
&= \sum_{n=-1}^{+\infty} -(z-1)^n \quad 0 < |z-1| < 1
\end{aligned}$$

2. 当 $|z - 1| > 1$ 时

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} \\ &= \frac{1}{z-1-1} - \frac{1}{z-1} \\ &= \frac{1}{z-1} \frac{1}{1 - \frac{1}{z-1}} - \frac{1}{z-1} \\ &= \frac{1}{z-1} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{z-1}\right)^n - \frac{1}{z-1} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{z-1}\right)^{n+1} - \frac{1}{z-1} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{z-1}\right)^{n+1} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{-2} \left(\frac{1}{z-1}\right)^n \end{aligned}$$