

Problems

Problem 1

求证

$$\oint_{|z|=r>1} \frac{1}{1+z^n} dz = \oint_{|z|=r>1} \frac{z^{2n}}{1+z^n} dz = \begin{cases} 2\pi i & n=1 \\ 0 & n \geq 2 \end{cases}$$

Solution 1

$$\begin{aligned} \oint_{|z|=r>1} \frac{1}{1+z^n} dz &= 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}\left[\frac{1}{1+z^n}, z_k\right] \\ &= 2\pi i \sum_{k=1}^n \frac{1}{nz_k^{n-1}} \\ &= \frac{2\pi i}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{z_k^{n-1}} \end{aligned}$$

注意到

$$z_k^n = 1$$

则

$$-z_k = \frac{1}{z_k^{n-1}}$$

因此

$$\begin{aligned} \oint_{|z|=r>1} \frac{1}{1+z^n} dz &= \frac{2\pi i}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{z_k^{n-1}} \\ &= -\frac{2\pi i}{n} \sum_{k=1}^n z_k \end{aligned}$$

若 $n=1$, 即

$$1+z^n = 1+z = 0$$

解得

$$z = -1$$

因此

$$\oint_{|z|=r>1} \frac{1}{1+z^n} dz = 2\pi i$$

否则

$$\sum_{k=1}^n z_k = 0$$

即

$$\oint_{|z|=r>1} \frac{1}{1+z^n} dz = 0$$

又

$$\begin{aligned}\oint_{|z|=r>1} \frac{z^{2n}}{1+z^n} dz &= \oint_{|z|=r>1} \frac{(z^{2n}-1)+1}{1+z^n} dz \\ &= \oint_{|z|=r>1} \frac{(z^n-1)(z^n+1)}{1+z^n} dz + \oint_{|z|=r>1} \frac{1}{1+z^n} dz \\ &= \oint_{|z|=r>1} (z^n-1) dz + \oint_{|z|=r>1} \frac{1}{1+z^n} dz\end{aligned}$$

由 Cauchy-Goursat 定理

$$\oint_{|z|=r>1} (z^n-1) dz = 0$$

所以

$$\oint_{|z|=r>1} \frac{1}{1+z^n} dz = \oint_{|z|=r>1} \frac{z^{2n}}{1+z^n} dz$$

综上,

$$\oint_{|z|=r>1} \frac{1}{1+z^n} dz = \oint_{|z|=r>1} \frac{z^{2n}}{1+z^n} dz = \begin{cases} 2\pi i & n=1 \\ 0 & n \geq 2 \end{cases}$$

Solution 2

令 $z = re^{i\theta}$ $0 \leq \theta < \pi, t = \frac{1}{z}$, 则

$$|t| = \frac{1}{r} < 1$$

$$t = \frac{1}{r} e^{-i\theta}$$

$$dz = d\left(\frac{1}{t}\right) = -\frac{1}{t^2} dt \quad 0 \leq \theta < \pi \quad \text{积分方向为顺时针}$$

此时原积分

$$\begin{aligned}\oint_{|z|=r>1} \frac{1}{1+z^n} dz &= -\oint_{|t|=\frac{1}{r}<1} \frac{1}{1+\frac{1}{t^2}} \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt \\ &= \oint_{|t|=\frac{1}{r}<1} \frac{t^{n-2}}{1+t^n} dt\end{aligned}$$

只有一个奇点 $t=0$ 。因此

$$\begin{aligned}I_n &= \oint_{|t|=\frac{1}{r}<1} \frac{t^{n-2}}{1+t^n} dt \\ &= \begin{cases} 0 & n \geq 2 \\ \oint_{|t|=\frac{1}{r}<1} \frac{1}{t(t+1)} dt = 2\pi i & n=1 \end{cases} \quad (\text{Cauchy-Goursat 定理})\end{aligned}$$

Problem 2

求积分

$$\oint_{|z|=r>0} \frac{1 - \cos 4z^3}{z^n} dz \quad n \in \mathbb{Z}$$

Solution

当 $n \leq 0$ 时

$$\oint_{|z|=r>0} \frac{1 - \cos 4z^3}{z^n} dz = 0$$

当 $n > 0$ 时

$$\begin{aligned} \frac{1 - \cos 4z^3}{z^n} &= z^{-n} \left(1 - \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{(4z^3)^{2k}}{(2k)!} \right) \\ &= z^{-n} \left(1 - \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{4^{2k} z^{6k}}{(2k)!} \right) \\ &= z^{-n} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{4^{2k} z^{6k}}{(2k)!} \end{aligned}$$

$\frac{1 - \cos 4z^3}{z^n}$ 在奇点 $z = 0$ 的 Laurent 级数 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n z^n$ 中, C_{-1} 对应上式中

$$6k - n = -1$$

此时

$$\begin{aligned} C_{-1} &= (-1)^{k-1} \frac{4^{2k}}{(2k)!} \quad k = \frac{n-1}{6} \\ &= (-1)^{\frac{n-7}{6}} \frac{4^{\frac{n-1}{3}}}{(\frac{n-1}{3})!} \end{aligned}$$

所以 $n > 0$ 时

$$\begin{aligned} \oint_{|z|=r>0} \frac{1 - \cos 4z^3}{z^n} dz &= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{1 - \cos 4z^3}{z^n}, 0\right] \\ &= 2\pi i C_{-1} \\ &= 2\pi i (-1)^{\frac{n-7}{6}} \frac{4^{\frac{n-1}{3}}}{(\frac{n-1}{3})!} \end{aligned}$$

综上,

$$\oint_{|z|=r>0} \frac{1 - \cos 4z^3}{z^n} dz = \begin{cases} 2\pi i (-1)^{\frac{n-7}{6}} \frac{4^{\frac{n-1}{3}}}{(\frac{n-1}{3})!} & n = 6k + 1, k \in \mathbb{N} \\ 0 & n \neq 6k + 1, k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Problem 3

求积分

$$\oint_{|z|=r>1} \frac{z^3 e^{\frac{1}{z}}}{1+z} dz$$

Solution

令 $t = \frac{1}{z}$, 则

$$|t| = \frac{1}{r} < 1$$

$$t = \frac{1}{r} e^{-i\theta}$$

$$dz = d\left(\frac{1}{t}\right) = -\frac{1}{t^2} dt \quad 0 \leq \theta < \pi \quad \text{积分方向为顺时针}$$

原积分

$$\begin{aligned} \oint_{|z|=r>1} \frac{z^3 e^{\frac{1}{z}}}{1+z} dz &= - \oint_{|t|=\frac{1}{r}<1} \frac{e^t}{t^2(t+1)} \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt \\ &= \oint_{|t|=\frac{1}{r}<1} \frac{e^t}{t^4(t+1)} dt \\ &= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{e^t}{t^4(t+1)}, 0\right] \end{aligned}$$

又

$$\frac{e^t}{t^4(t+1)} = t^{-4} \left(1 + t + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^3}{3!} + \dots\right) (1 - t + t^2 - t^3 + \dots)$$

其中, t^{-1} 的系数为

$$-1 + 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} = -\frac{1}{3}$$

因此

$$\oint_{|z|=r>1} \frac{z^3 e^{\frac{1}{z}}}{1+z} dz = 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{e^t}{t^4(t+1)}, 0\right] = 2\pi i \left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{2}{3}\pi i$$

Problem 4

求积分

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta} \quad a > |b| \quad a, b \in \mathbb{R}$$

Solution

令 $z = e^{i\theta}$, $\theta \in [0, 2\pi)$, 注意到:

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} = \frac{z + \frac{1}{z}}{2} = \frac{z^2 + 1}{2z} \\ d\theta &= \frac{dz}{ie^{i\theta}} = \frac{dz}{iz} \end{aligned}$$

则原积分

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta} &= \oint_{|z|=1} \frac{\frac{dz}{iz}}{a + b\left(\frac{z^2+1}{2z}\right)} \\ &= \frac{2}{i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{bz^2 + 2az + b} \end{aligned}$$

当 $b = 0$ 时, 原积分

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta} = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a} = \frac{2\pi}{a}$$

当 $b \neq 0$ 时, 原积分

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta} &= \frac{2}{i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{bz^2 + 2az + b} \\ &= \frac{2}{ib} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 + \frac{2a}{b}z + 1} \end{aligned}$$

对方程

$$z^2 + \frac{2a}{b}z + 1 = 0$$

其两根

$$z_1 z_2 = 1$$

且

$$z_{1,2} = -\frac{a}{b} \pm \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{b}$$

可设 $b > 0$, 则

$$z_2 = -\frac{a}{b} \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{b} < -\frac{a}{b} < -1$$

即只有一个奇点 z_1 。所以原积分

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta} &= \frac{2}{ib} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 + \frac{2a}{b}z + 1} \\ &= \frac{2}{ib} 2\pi i \frac{1}{2z_1 + \frac{2a}{b}} \\ &= \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}} \end{aligned}$$

Problem 5

求积分

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \sin \theta} \quad a > |b| \quad a, b \in \mathbb{R}$$

Solution

定理. 若 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可积, 则 $\int_0^{2\pi} f(\cos x) d\theta = \int_0^{2\pi} f(\sin x) d\theta$

所以

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \sin \theta} = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}$$

Problem 6

求积分

$$I_p = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 - 2p \cos \theta + p^2} \quad p \in (-1, 1)$$

Solution

令

$$\begin{aligned} a &= 1 + p^2 \\ b &= -2p \end{aligned}$$

则

$$a > b \quad a, b \in (-1, 1)$$

因此

$$\begin{aligned} I_p &= \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 - 2p \cos \theta + p^2} \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta} \\ &= \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}} \\ &= \frac{2\pi}{1 - p^2} \end{aligned}$$

Problem 7

求积分

$$I_{A,B} = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{A^2 \cos^2 \theta + B^2 \sin^2 \theta} \quad A, B \in \mathbb{R} > 0$$

Solution

令

$$\begin{aligned} \cos^2 \theta &= \frac{\cos 2\theta + 1}{2} \\ \sin^2 \theta &= \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}
 I_{A,B} &= \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{A^2 \cos^2 \theta + B^2 \sin^2 \theta} \\
 &= \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{A^2 \frac{\cos 2\theta + 1}{2} + B^2 \frac{1 - \cos 2\theta}{2}} \\
 &= \int_0^{4\pi} \frac{dt}{(A^2 + B^2) + (A^2 - B^2) \cos t} \\
 &= 2 \int_0^{2\pi} \frac{dt}{(A^2 + B^2) + (A^2 - B^2) \cos t} \\
 &= 2 \frac{2\pi}{\sqrt{(A^2 + B^2)^2 - (A^2 - B^2)^2}} \\
 &= \frac{2\pi}{AB}
 \end{aligned}$$

Problem 8

求积分

$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx$$

Solution

$\frac{1}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)}$ 是偶函数, 因此

$$\begin{aligned}
 I_n &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx \\
 &= \frac{1}{2} \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^{+R} \frac{1}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx
 \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}
 &\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^{+R} \frac{1}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx + \int_{|z|=R, \operatorname{Im}[z]>0} \frac{1}{(z^2 + a^2)(z^2 + b^2)} dz \\
 &= 2\pi i (\operatorname{Res}[\frac{1}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)}, i|a|] + \operatorname{Res}[\frac{1}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)}, i|b|]) \\
 &= 2\pi i (\frac{1}{4(i|a|)^3 + 2i|a|(a^2 + b^2) + ab} + \frac{1}{4(i|b|)^3 + 2i|b|(a^2 + b^2) + ab})
 \end{aligned}$$

定理. 若 $P_n(z), Q_m(z)$ 是多项式, 且 $\deg P_n = n \leq \deg Q_m - 2 = m - 2$, $Q_m(z)$ 在实轴 $z = x$ 上没有零点, 即 $Q_m(x) \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$, 则 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{|z|=R, \operatorname{Im}[z]>0} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} dz = 0$

所以

$$\begin{aligned}
 I_n &= \pi i (\operatorname{Res}[\frac{1}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)}, i|a|] + \operatorname{Res}[\frac{1}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)}, i|b|]) \\
 &= \pi i (\frac{1}{4(i|a|)^3 + 2i|a|(a^2 + b^2) + ab} + \frac{1}{4(i|b|)^3 + 2i|b|(a^2 + b^2) + ab})
 \end{aligned}$$

Problem 9

求积分

$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^{2n}} \quad n \in \mathbb{N}$$

Problem 10

求积分

$$I_{n,r} = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{r^{2n} + x^{2n}} \quad n \in \mathbb{N}$$

Problem 11

求积分

$$J_n = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n} \quad n \in \mathbb{N}$$

Problem 12

求积分

$$J_n = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(r^2 + x^2)^n} \quad n \in \mathbb{N}$$

Problem 13

求积分

$$I_{a,b,k} = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin kx}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx$$

Problem 14

求积分

$$I_{a,b,k} = \int_0^{+\infty} \frac{x^2 \cos kx}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx$$