

Cálculo
1ºA Grado en Ingeniería Informática
Primer Parcial (I)
Curso 2013/2014

1. (2.5 puntos) Se define la sucesión $\{x_n\}$ por recurrencia como:

$$x_1 = 0$$
$$x_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{1+x_n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

- a) Comprueba que $\{x_n\}$ es una sucesión monótona y acotada.
- b) Calcula el límite de $\{x_n\}$.

Solución:

a) Aplicando la fórmula de recurrencia, comprobamos que $x_2 = \sqrt{2+1/2} = \sqrt{5/2} > x_1 = 1$. Para comprobar que la sucesión dada es monótona creciente, lo vemos por inducción:

- Para $n = 1$, acabamos de ver que $x_1 < x_2$.
- Hipótesis de inducción: Suponemos que $x_n < x_{n+1}$.
- Comprobamos que $x_{n+1} < x_{n+2}$. En efecto, si partimos de la hipótesis de inducción:

$$x_n < x_{n+1} \Rightarrow 2+x_n < 2+x_{n+1} \Rightarrow \sqrt{2+x_n} < \sqrt{2+x_{n+1}}$$
$$\Rightarrow x_{n+1} < x_{n+2}$$

Por tanto, la sucesión es monótona creciente.

b) Al ser creciente ya sabemos que la sucesión está acotada inferiormente por el $x_1 = 1/2$. Veamos que está acotada superiormente por 2. Esto es, que $x_n \leq 2$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Otra vez lo hacemos por inducción:

- Para $n = 1$, es evidente que $x_1 = 1 \leq 2$.
- Hipótesis de inducción: Suponemos que $x_n \leq 2$.
- Comprobamos que $x_{n+1} \leq 2$. En efecto, si partimos de la hipótesis de inducción:

$$x_n \leq 2 \Rightarrow 2+x_n \leq 4 \Rightarrow \sqrt{2+x_n} \leq \sqrt{4}$$
$$\Rightarrow x_{n+1} \leq 2$$

Por tanto, la sucesión dada es monótona y acotada, por lo que entonces es convergente.

- c) Para calcular el límite de $\{x_n\}$ partimos de la fórmula de recurrencia y tomamos límite. Supongamos que $\lim\{x_n\} = x$ con lo que nos queda: $x = \sqrt{2+x}$. Resolvemos la ecuación:

$$x = \sqrt{2+x} \Rightarrow x^2 = 2+x \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \frac{1 \pm 3}{2}$$

Obtenemos dos soluciones: $x = 2$ y $x = -1$, pero descartamos la segunda solución, ya que el límite ha de ser mayor o igual que $1/2$. El motivo es que $1/2 \leq x_n \leq 2$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Por tanto, $\lim\{x_n\} = 2$.

- d) Observamos que en el cálculo de $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n^2 - 3)^{\frac{1}{2x_n - 4}}$ tenemos una indeterminación del tipo “ 1^∞ ”, ya que la base tiende a 1 y el exponente a infinito. Entonces, aplicando el criterio del número e :

$$\frac{1}{2x_n - 4} [x_n^2 - 3 - 1] = \frac{x_n^2 - 4}{2x_n - 4} = \frac{(x_n - 2)(x_n + 2)}{2(x_n - 2)} = \frac{x_n + 2}{2} \rightarrow \frac{4}{2} = 2$$

Por tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n^2 - 3)^{\frac{1}{2x_n - 4}} = e^2$.

2. (2.5 puntos) Calcula el límite de la siguiente sucesión:

$$\left\{ \frac{1! + 3! + 5! \dots (2n-1)!}{(2n-1)!} \right\}$$

3. (2.5 puntos) Calcula el límite de la siguiente sucesión:

$$\left\{ n^2 \log \left(\frac{n^3 + 7n}{n^3 + 4} \right) \right\}$$

Como consecuencia, analiza el carácter de la serie

$$\sum \log \left(\frac{n^3 + 7n}{n^3 + 4} \right)$$

4. (2.5 puntos) Estudia la posible convergencia de las siguientes series:

a) $\sum_{n \geq 1} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$

b) $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{4^n} - \frac{2^n}{3^{n+1}}$. Si es convergente, calcula su suma.