ANEXO:

1. **Eliminar los NA de las variables para evitar posibles errores.**

Variable P1

```
BD[,11]<-factor(BD[,11],levels=c("Muy grandes","Bastante grandes","Pequeñas","Casi inexistentes"),ordered=FALSE)
```

Variable P901

```
BD[,57]<-factor(BD[,57],levels=c("Buscan controlar a las mujeres","No pueden controlar sus impulsos sexuales","No aceptan un rechazo por parte de una mujer","Tienen problemas mentales","No identifican sus acciones como una agresión sexual","Disfrutan sometiendo sexualmente a las mujeres","Por el consumo de alcohol y/o drogas","Sufrieron abusos sexuales en la infancia","Repiten los comportamientos observados en programas de telev","Tienen un bajo nivel educativo"), ordered=FALSE)
```

Variable P10

```
BD[,59]<-factor(BD[,59],levels=c("Siempre que sucede","En la mayor parte de las ocasiones","En pocas ocasiones","Casi nunca"),ordered=FALSE)
```

Variable P11

```
BD[,60]<-factor(BD[,60],levels=c("A menudo son falsas","Algunas veces son falsas","Raramente son falsas","Nunca son falsas"),ordered=FALSE)
```

Variable P28

```
BD[,84]<-factor(BD[,84],levels=c("Católico/a","Creyente de otra religión","No creyente","Ateo/a"),ordered=FALSE)
```

Variable ESTUDIOS

```
BD[,165]<-factor(BD[,165],levels=c("Sin estudios","Primaria","Secundaria 1ª etapa","Secundaria 2ª etapa","F.P.","Superiores","Otros"),ordered=FALSE)
```

2. **Crear una nueva base de datos seleccionando las variables utilizadas.**

```
attach(BD)
DF=data.frame(P1,P901,P10,P11,P22,ESTUDIOS,P28)
```

3. **Pedir las frecuencias de la nueva tabla a partir del paquete "Deducer".**

```
install.packages("Deducer")
library(Deducer)
frequencies(DF,r.digits=1)
```

```
$`P1`
-----------------------------------------------------------------
--                       Frequencies                           --
--                                                             --
             Value # of Cases       % Cumulative %
1       Muy grandes        384    16.0         16.0
2  Bastante grandes       1310    54.5         70.5
3          Pequeñas        561    23.4         93.9
4 Casi inexistentes        147     6.1        100.0
--                                                             --
--                       Case Summary                          --
--                                                             --
           Valid Missing Total
# of cases  2402      63  2465
--                                                             --
--                                                             --
-----------------------------------------------------------------
```

```
$P10
------------------------------------------------------------
--                      Frequencies                       --
--                                                        --
                              Value # of Cases       % Cumulative %
1                Siempre que sucede         37     1.6          1.6
2 En la mayor parte de las ocasiones        563    24.0         25.6
3                En pocas ocasiones        1521    64.9         90.5
4                        Casi nunca         222     9.5        100.0
--                                                        --
--                      Case Summary                      --
--                                                        --
           Valid Missing Total
# of cases  2343     122  2465
--                                                        --
--                                                        --
------------------------------------------------------------
```

```
$P11
------------------------------------------------------------
--                      Frequencies                       --
--                                                        --
                     Value # of Cases       % Cumulative %
1      A menudo son falsas         36     1.5          1.5
2 Algunas veces son falsas        682    28.9         30.4
3     Raramente son falsas       1376    58.3         88.7
4          Nunca son falsas       267    11.3        100.0
--                                                        --
--                      Case Summary                      --
--                                                        --
           Valid Missing Total
# of cases  2361     104  2465
--                                                        --
--                                                        --
------------------------------------------------------------
```

```
$P22
------------------------------------------------------------
--                      Frequencies                       --
--                                                        --
   Value # of Cases       % Cumulative %
1 Hombre       1196    48.5         48.5
2  Mujer       1269    51.5        100.0
--                                                        --
--                      Case Summary                      --
--                                                        --
           Valid Missing Total
# of cases  2465       0  2465
--                                                        --
--                                                        --
------------------------------------------------------------
```

```
$P28
--------------------------------------------------------------
--                        Frequencies                       --
--                                                          --
                       Value # of Cases       % Cumulative %
1                  Católico/a       1609    67.2         67.2
2 Creyente de otra religión          103     4.3         71.5
3               No creyente          432    18.1         89.6
4                    Ateo/a          249    10.4        100.0
--                                                          --
--                        Case Summary                      --
--                                                          --
           Valid Missing Total
# of cases  2393      72  2465
--                                                          --
--                                                          --
--------------------------------------------------------------
```

```
$P901
------------------------------------------------------------
--                       Frequencies                      --
--                                                        --
                                                          Value # of Cases
1                                Buscan controlar a las mujeres        398
2                    No pueden controlar sus impulsos sexuales         255
3                 No aceptan un rechazo por parte de una mujer         353
4                                      Tienen problemas mentales       521
5          No identifican sus acciones como una agresión sexual        171
6               Disfrutan sometiendo sexualmente a las mujeres         235
7                         Por el consumo de alcohol y/o drogas         283
8                      Sufrieron abusos sexuales en la infancia         51
9  Repiten los comportamientos observados en programas de telev         44
10                               Tienen un bajo nivel educativo         54
        % Cumulative %
1     16.8         16.8
2     10.8         27.6
3     14.9         42.5
4     22.0         64.6
5      7.2         71.8
6      9.9         81.7
7     12.0         93.7
8      2.2         95.9
9      1.9         97.7
10     2.3        100.0
--                                                        --
--                       Case Summary                     --
--                                                        --
           Valid Missing Total
# of cases  2365     100  2465
```


4. Instalamos el paquete "FactorMineR" para realizar el análisis de correspondencias.

```
install.packages("FactoMineR")
 library(FactoMineR)
```

5. Procedemos a hacer el ACM, destacando las variables suplementarias (P22,ESTUDIOS, P28), y considerando los NA como a "Average" o mediana. A continuación demandamos algunos datos a tener en cuenta.

```
ACM=MCA(DF,ncp=2,quali.sup=5:7,na.method="Average")
ACM
ACM$eig
ACM$var
```

```
> ACM$eig #Valores propios (eigen values)
       eigenvalue percentage of variance cumulative percentage of variance
dim 1   0.3155247                7.302474                           7.302474
dim 2   0.2714455                6.282311                          13.584785
dim 3   0.2590846                5.996231                          19.581016
dim 4   0.2579962                5.971040                          25.552056
dim 5   0.2538576                5.875257                          31.427313
dim 6   0.2445994                5.660985                          37.088299
dim 7   0.2444361                5.657206                          42.745505
dim 8   0.2406675                5.569988                          48.315493
dim 9   0.2399753                5.553967                          53.869459
dim 10  0.2390571                5.532716                          59.402175
dim 11  0.2350868                5.440827                          64.843002
dim 12  0.2297451                5.317201                          70.160203
dim 13  0.2291981                5.304539                          75.464742
dim 14  0.2234102                5.170586                          80.635328
dim 15  0.2215223                5.126892                          85.762220
dim 16  0.2099305                4.858612                          90.620831
dim 17  0.2063380                4.775468                          95.396299
dim 18  0.1989163                4.603701                         100.000000
```



6. Como la dimensión 12 no llega al 70% de la varianza explicada, es necesario realizar la transformación de los valores propios (eigen) i calcular la inercia/varianza explicada corregida.

variables (p) 4
categories (m) 22
factors (k) m-p=18
umbral 1/p = 0,25

7. A partir de este cálculo del umbral seleccionamos las dimensiones que superen el valor de 0,25 (destacados en azul), de manera que el 31,42% pasará a ser el 100%.

Como podemos observar, los dos primeros factores "explican" el 96,72%, muy por encima del 70% necesario, de manera que seguimos con solo 2 dimensiones.

Factor	Valor propio	% Inercia	Valor propio corregido (*)	% Inercia	% Acumulado
1	0,315525	7,30%	0,007633	87,36%	87,36%
2	0,271446	6,28%	0,000818	9,36%	96,72%
3	0,259085	6,00%	0,000147	1,68%	98,40%
4	0,257996	5,97%	0,000114	1,30%	99,70%
5	0,253858	5,88%	0,000026	0,30%	100,00%
Suma	**4,321710**	**100%**	**0,008737**	**100%**	**100,0%**


8. Seguimos pidiendo otros datos interesantes (redondeados): las Coordenadas, las Contribuciones Absolutas, Contribuciones Relativas, V Test y el valor de l'ETA2.

```
> round(ACM$var$cos2,2)
                                                          Dim 1 Dim 2
Muy grandes                                                0.16  0.13
Bastante grandes                                           0.07  0.12
Pequeñas                                                   0.16  0.00
Casi inexistentes                                          0.19  0.05
Buscan controlar a las mujeres                             0.12  0.01
No pueden controlar sus impulsos sexuales                  0.05  0.00
No aceptan un rechazo por parte de una mujer               0.04  0.03
Tienen problemas mentales                                  0.06  0.02
No identifican sus acciones como una agresión sexual       0.00  0.00
Disfrutan sometiendo sexualmente a las mujeres             0.02  0.10
Por el consumo de alcohol y/o drogas                       0.07  0.02
Sufrieron abusos sexuales en la infancia                   0.00  0.03
Repiten los comportamientos observados en programas de telev 0.00  0.01
Tienen un bajo nivel educativo                             0.00  0.00
Siempre que sucede                                         0.06  0.09
En la mayor parte de las ocasiones                         0.17  0.00
En pocas ocasiones                                         0.09  0.09
Casi nunca                                                 0.04  0.16
A menudo son falsas                                        0.04  0.04
Algunas veces son falsas                                   0.23  0.01
Raramente son falsas                                       0.11  0.25
Nunca son falsas                                           0.05  0.34
```

```
> round(ACM$var$v.test,2)
                                                        Dim 1  Dim 2
Muy grandes                                           -19.58  17.64
Bastante grandes                                      -12.59 -16.81
Pequeñas                                               19.77  -1.96
Casi inexistentes                                      21.19  11.42
Buscan controlar a las mujeres                        -17.13   5.50
No pueden controlar sus impulsos sexuales              11.13  -1.99
No aceptan un rechazo por parte de una mujer           -9.30  -8.95
Tienen problemas mentales                              11.98  -6.48
No identifican sus acciones como una agresión sexual    0.00  -0.45
Disfrutan sometiendo sexualmente a las mujeres         -6.60  14.99
Por el consumo de alcohol y/o drogas                   12.44   7.09
Sufrieron abusos sexuales en la infancia               -1.80  -7.87
Repiten los comportamientos observados en programas de telev  -2.07  -5.08
Tienen un bajo nivel educativo                         -1.48  -2.69
Siempre que sucede                                     11.47  14.51
En la mayor parte de las ocasiones                     19.68  -1.66
En pocas ocasiones                                    -14.35 -14.23
Casi nunca                                            -10.20  19.43
A menudo son falsas                                     9.10  10.10
Algunas veces son falsas                               23.05   3.66
Raramente son falsas                                  -16.34 -24.12
Nunca son falsas                                      -11.06  28.41
```

```
> round(ACM$var$eta2,2)
     Dim 1 Dim 2
P1    0.45  0.21
P901  0.29  0.19
P10   0.24  0.25
P11   0.28  0.43
```

9. El programa nos genera el siguiente gráfico con los resultados.




10. Para obtener nuevos gráficos instalaremos los paquetes "devtools", "kassambara/factoextra", "factoexta" y "bindr".


```
install.packages("devtools")
library("devtools")
install_github("kassambara/factoextra")
library("factoextra")
install.packages("bindr")
library("bindr")
```

Gráficos sobre las variables:

```
fviz_mca_var(ACM,axes=c(1,2),labelsize=2,repel=TRUE, title="Gráfico factorial ACM: categorías")
```




fviz_mca_var(ACM,axes=c(1,2),geom=c("arrow","text"))




11. A continuación podemos representar las contribuciones (absolutas y relativas) de cada variable.


fviz_contrib(ACM, choice="var", axes=1)




fviz_contrib(ACM, choice="var", axes=2)




fviz_cos2(ACM,choice="var", axes=1)



fviz_cos2(ACM,choice="var", axes=2)



12. Por último, un gráfico con los individuos y las variables a la vez.
fviz_mca_biplot(ACM)



13. R nos ofrece la posibilidad de realizar un informe de forma automática a partir del paquete "FactoInvestigate" donde encontramos datos interesantes.
install.packages("FactoInvestigate")
library(FactoInvestigate)
Investigate(ACM)

Multiple Correspondence Analysis

Dataset DF

This dataset contains 2465 individuals and 25 variables, 3 qualitative variables are considered as illustrative.

1. Study of the outliers

The analysis of the graphs leads to detect outliers that strongly influence the results. First we will describe these outliers and then we will suppress them from the analysis. Looking at the graph, we can note that 435 particular individuals strongly contribute to the construction of the plane. The cumulative contribution of these individuals to the construction of the plane equals **41%**.




Figure 1.1 - Individuals factor map (MCA) before correction. *Highlighting of 435 outliers.*

Figure 1.1 - Individuals factor map (MCA) before correction. *Highlighting of 435 outliers.*





Figure 1.2 - Individuals factor map (MCA) after correction. *Highlighting of 435 outliers.*



2. Inertia distribution

The inertia of the first dimensions shows if there are strong relationships between variables and suggests the number of dimensions that should be studied.

The first two dimensions of MCA express **12.59%** of the total dataset inertia ; that means that 12.59% of the individuals (or variables) cloud total variability is explained by the plane. The inertia observed on the first plane is smaller than the reference value that equals **12.69%**, therefore low in comparison (the reference value is the 0.95-quantile of the inertia percentages distribution obtained by simulating 405 data tables of equivalent size on the basis of a uniform distribution). However, the inertia related to the first dimension is greater than the reference value **6.46%**. Even if the inertia projected on the first plane is not significant, these explained by the first dimension is significant.




Figure 2 - Decomposition of the total inertia on the components of the MCA

An estimation of the right number of axis to interpret suggests to restrict the analysis to the description of the first 1 axis. These axis present an amount of inertia greater than those obtained by the 0.95-quantile of random distributions (6.48% against 6.46%). This observation suggests that only this axis is carrying a real information. As a consequence, the description will stand to these axis.

3. Description of the dimension 1




Figure 3.1 - Individuals factor map (MCA) *The labeled individuals are those with the higher contribution to the plane construction.*

The Wilks test p-value indicates which variable factors are the best separated on the plane (i.e. which one explain the best the distance between individuals).

```
##          P22          P28     ESTUDIOS
## 4.271565e-21 2.191221e-04 6.667886e-01
```

The best qualitative variable to illustrate the distance between individuals on this plane is : *P22*.

The best qualitative variable to illustrate the distance between individuals on this plane is : *P22*.




Figure 3.2 - Individuals factor map (MCA) *The labeled individuals are those with the higher contribution to the plane construction. The individuals are coloured after their category for the variable* P22.




Figure 3.3 - Variables factor map (MCA) *The factors in red are considered as active whereas those in green are illustrative. The labeled variables are those the best shown on the plane.*

4. Classification




Figure 4 - Ascending Hierarchical Classification of the individuals. *The classification made on individuals reveals 3 clusters.*

The cluster 1 is made of individuals sharing :

- high frequency for the factors *P1=Muy grandes*, *P11=Raramente son falsas*, *P901=Buscan controlar a las mujeres*, *P10=En pocas ocasiones*, *P901=No aceptan un rechazo por parte de una mujer*, *P22=Mujer*, *P901=Tienen un bajo nivel educativo*, *P10=P10.NA*, *P28=No creyente* and *ESTUDIOS=Superiores* (factors are sorted from the most common).
- low frequency for the factors *P901=Tienen problemas mentales*, *P1=Pequeñas*, *P10=En la mayor parte de las ocasiones*, *P11=Nunca so falsas*, *P11=Algunas veces son falsas*, *P901=Por el consumo de alcohol y/o drogas*, *P22=Hombre*, *P11=P11.NA*, *P28=Católico/a* and *ESTUDIOS=Primaria* (factors are sorted from the rarest).


The cluster 2 is made of individuals sharing :


- high frequency for the factors *P1=Bastante grandes*, *P11=Nunca son falsas*, *P901=Tienen problemas mentales*, *P901=Por el consumo d alcohol y/o drogas*, *P10=En la mayor parte de las ocasiones*, *P11=P11.NA*, *P10=Casi nunca* and *ESTUDIOS=Primaria* (factors are sorted from the most common).
- low frequency for factors like *P1=Pequeñas*, *P1=Muy grandes*, *P11=Raramente son falsas*, *P901=No pueden controlar sus impulsos sexuales*, *P10=En pocas ocasiones*, *P901=No aceptan un rechazo por parte de una mujer*, *P901=Buscan controlar a las mujeres*, *P901=Tienen un bajo nivel educativo*, *P10=P10.NA* and *ESTUDIOS=Superiores* (factors are sorted from the rarest).

The cluster 3 is made of individuals sharing :

- high frequency for the factors *P1=Pequeñas*, *P11=Algunas veces son falsas*, *P22=Hombre*, *P901=No pueden controlar sus impulsos sexuales*, *P10=En la mayor parte de las ocasiones*, *P901=Repiten los comportamientos observados en programas de telev* and *P28=Católico/a* (factors are sorted from the most common).
- low frequency for factors like *P1=Bastante grandes*, *P22=Mujer*, *P10=Casi nunca*, *P1=Muy grandes*, *P901=Buscan controlar a las mujeres*, *P11=Nunca son falsas*, *P11=P11.NA*, *P11=Raramente son falsas*, *P28=Ateo/a* and *P901=P901.NA* (factors are sorted from the rarest).

14. En este informe se nos presentan 3 clusters o grupos diferentes y nos detalla sus características, pero nosotros elaboramos nuestro propio análisis de clasificación.
Primero usamos el método "ward" y el programa nos selecciona directamente los clusters y nos los representará gráficamente, y para confirmar la elección, utilizamos otra comanda que nos seleccionará el número óptimo de grupos a seleccionar.
hcpc=HCPC(ACM,min=2,method="ward",nb.clus=-1)


Hierarchical Clustering
inertia gain
Hierarchical Classification
height
Hierarchical clustering on the factor map
cluster 1
cluster 2
Dim 1 (7.3%)
Dim 2 (6.28%)




```
> round(hcpc$call$t$quot,2)
[1] 0.67 0.70 0.79 0.78 0.79 0.88 0.89 0.89 0.88
```

```
> hcpc$call$t$nb.clust
[1] 2
```

Por lo tanto, a diferencia del informe anterior, R nos diferencia entre 2 grupos en vez de 3. Para conocer sus características, le pedimos la información siguiente:

```
> hcpc$desc.var$test.chi2
                p.value df
P1       6.456451e-177  4
P11      2.578290e-121  4
P901      3.078013e-92 10
P10       4.500415e-92  4
P22       3.354162e-29  1
P28       1.471699e-04  4
ESTUDIOS  1.728261e-02  6
```

```
> hcpc$desc.axes

Link between the cluster variable and the quantitative variables
================================================================
           Eta2      P-value
Dim.1 0.6573868 0.000000e+00
Dim.2 0.0128782 1.607751e-08

Description of each cluster by quantitative variables
=====================================================
$`1`
         v.test Mean in category  Overall mean sd in category Overall sd
Dim.2  -5.633106      -0.04718085 -1.296067e-16       0.5379482  0.5210043
Dim.1 -40.246752      -0.36343266 -5.722265e-17       0.3068235  0.5617158
           p.value
Dim.2 1.769928e-08
Dim.1 0.000000e+00

$`2`
         v.test Mean in category  Overall mean sd in category Overall sd
Dim.1 40.246752       0.57072950 -5.722265e-17       0.3605954  0.5617158
Dim.2  5.633106       0.07409213 -1.296067e-16       0.4840281  0.5210043
           p.value
Dim.1 0.000000e+00
Dim.2 1.769928e-08
```

Pero la información "más importante"la obtenemos con la siguiente comanda:
hcpc$desc.var$category
Y obtenemos:

GRUPO 1

$`1`

	Cla/Mod	Mod/Cla	Global	p.value	v.test
P11=Raramente son falsas	77.10756	70.451527	55.821501	4.669384e-76	18.455966
P1=Bastante grandes	76.25954	66.334661	53.144016	1.197253e-61	16.567487
P10=En pocas ocasiones	73.37278	74.103586	61.703854	1.240872e-56	15.857841
P1=Muy grandes	89.58333	22.841965	15.578093	3.245198e-41	13.446105
P22=Mujer	71.78881	60.491368	51.480730	2.198939e-29	11.254571
P901=Buscan controlar a las mujeres	83.66834	22.111554	16.146045	3.127138e-26	10.595486
P901=No aceptan un rechazo por parte de una mujer	79.60340	18.658699	14.320487	1.361248e-15	7.988921
P901=Disfrutan sometiendo sexualmente a las mujeres	78.72340	12.284197	9.533469	1.623383e-09	6.031606
P11=Nunca son falsas	76.77903	13.612218	10.831643	1.020460e-08	5.727293
P10=Casi nunca	76.12613	11.221780	9.006085	7.601589e-07	4.945328
P901=No identifican sus acciones como una agresión sexual	76.60819	8.698539	6.937120	9.269614e-06	4.433545
P28=Ateo/a	71.88755	11.885790	10.101420	1.823625e-04	3.742274
P901=Sufrieron abusos sexuales en la infancia	84.31373	2.855246	2.068966	3.231444e-04	3.596003
ESTUDIOS=Superiores	67.31107	25.431607	23.083164	4.845427e-04	3.489159
P901=Repiten los comportamientos observados en programas de telev	77.27273	2.257636	1.784990	2.401515e-02	2.256887
P28=No creyente	65.74074	18.857902	17.525355	2.862671e-02	2.188589
P901=Tienen un bajo nivel educativo	74.07407	2.656042	2.190669	4.579628e-02	1.997266
P1=NA	47.61905	1.992032	2.555781	2.921563e-02	-2.180565
P10=NA	48.36066	3.917663	4.949290	3.582203e-03	-2.912786
P28=Católico/a	58.66998	62.682603	65.273834	6.853151e-04	-3.395388
P11=A menudo son falsas	0.00000	0.000000	1.460446	1.155323e-15	-8.009120
P10=Siempre que sucede	0.00000	0.000000	1.501014	4.390133e-16	-8.127285
P901=No pueden controlar sus impulsos sexuales	36.86275	6.241700	10.344828	1.633711e-16	-8.246302
P901=Por el consumo de alcohol y/o drogas	34.62898	6.507304	11.480730	1.202542e-21	-9.557828
P22=Hombre	49.74916	39.508632	48.519270	2.198939e-29	-11.254571
P901=Tienen problemas mentales	38.96353	13.479416	21.135903	9.480937e-31	-11.528474
P1=Casi inexistentes	0.00000	0.000000	5.963489	3.400478e-64	-16.916500
P10=En la mayor parte de las ocasiones	28.77442	10.756972	22.839757	8.777123e-71	-17.787858
P1=Pequeñas	23.70766	8.831341	22.758621	1.625183e-94	-20.625360
P11=Algunas veces son falsas	27.12610	12.284197	27.667343	2.858530e-101	-21.364507

GRUPO 2:

$`2`

	Cla/Mod	Mod/Cla	Global	p.value	v.test
P11=Algunas veces son falsas	72.87390	51.8248175	27.667343	2.858530e-101	21.364507
P1=Pequeñas	76.29234	44.6298227	22.758621	1.625183e-94	20.625360
P10=En la mayor parte de las ocasiones	71.22558	41.8143900	22.839757	8.777123e-71	17.787858
P1=Casi inexistentes	100.00000	15.3284672	5.963489	3.400478e-64	16.916500
P901=Tienen problemas mentales	61.03647	33.1595412	21.135903	9.480937e-31	11.528474
P22=Hombre	50.25084	62.6694473	48.519270	2.198939e-29	11.254571
P901=Por el consumo de alcohol y/o drogas	65.37102	19.2909281	11.480730	1.202542e-21	9.557828
P901=No pueden controlar sus impulsos sexuales	63.13725	16.7883212	10.344828	1.633711e-16	8.246302
P10=Siempre que sucede	100.00000	3.8581856	1.501014	4.390133e-16	8.127285
P11=A menudo son falsas	100.00000	3.7539103	1.460446	1.155323e-15	8.009120
P28=Católico/a	41.33002	69.3430657	65.273834	6.853151e-04	3.395388
P10=NA	51.63934	6.5693431	4.949290	3.582203e-03	2.912786
P1=NA	52.38095	3.4410845	2.555781	2.921563e-02	2.180565
P901=Tienen un bajo nivel educativo	25.92593	1.4598540	2.190669	4.579628e-02	-1.997266
P28=No creyente	34.25926	15.4327424	17.525355	2.862671e-02	-2.188589
P901=Repiten los comportamientos observados en programas de telev	22.72727	1.0427529	1.784990	2.401515e-02	-2.256887
ESTUDIOS=Superiores	32.68893	19.3952033	23.083164	4.845427e-04	-3.489159
P901=Sufrieron abusos sexuales en la infancia	15.68627	0.8342023	2.068966	3.231444e-04	-3.596003
P28=Ateo/a	28.11245	7.2992701	10.101420	1.823625e-04	-3.742274
P901=No identifican sus acciones como una agresión sexual	23.39181	4.1710115	6.937120	9.269614e-06	-4.433545
P10=Casi nunca	23.87387	5.5265902	9.006085	7.601589e-07	-4.945328
P11=Nunca son falsas	23.22097	6.4650678	10.831643	1.020460e-08	-5.727293
P901=Disfrutan sometiendo sexualmente a las mujeres	21.27660	5.2137643	9.533469	1.623383e-09	-6.031606
P901=No aceptan un rechazo por parte de una mujer	20.39660	7.5078206	14.320487	1.361248e-15	-7.988921
P901=Buscan controlar a las mujeres	16.33166	6.7778936	16.146045	3.127138e-26	-10.595486
P22=Mujer	28.21119	37.3305527	51.480730	2.198939e-29	-11.254571
P1=Muy grandes	10.41667	4.1710115	15.578093	3.245198e-41	-13.446105
P10=En pocas ocasiones	26.62722	42.2314911	61.703854	1.240872e-56	-15.857841
P1=Bastante grandes	23.74046	32.4296142	53.144016	1.197253e-61	-16.567487
P11=Raramente son falsas	22.89244	32.8467153	55.821501	4.669384e-76	-18.455966