

2022 年 上海人民医院细菌耐药性监测

摘要：目的 了解国内主要地区临床分离菌对临床常用抗菌药物的敏感性和耐药性。
方法 对国内主要地区34所医院（29所综合性医院、5所儿童医院）临床分离菌采用纸片扩散法或自动化仪器法按统一方案进行抗菌药物敏感性试验。按CLSI 2019版判断结果。
结果 收集2019年1—12月上述医院临床分离菌共190 610株，其中革兰阳性菌55 649株，占革兰阴性菌134 951株，占70.8%。金黄色葡萄球菌和凝固酶阴性葡萄球菌中甲氧西林耐药株（MRSA和MRCNS）的平均检出率分别为35.3%和80.3%。MRSA和MRCNS对绝大多数测试药物的耐药率均显著高于甲氧西林敏感株（MSSA和MSCNS）。MRSA中有91.6%菌株对甲氧苄啶-磺胺甲噁唑敏感；MRCNS中有86.2%的菌株对利福平敏感。未发现万古霉素耐药株。肠球菌属中粪肠球菌对多数测试抗菌药物（除外氯霉素）的耐药率均显著低于屎肠球菌，两者中均有少数万古霉素耐药株，根据对50株万古霉素耐药肠球菌的表型推测或基因型检测结果，显示主要为*vanA*型（36株）、*vanB*型（8株）或*vanM*型（6株）耐药。肺炎链球菌非脑膜炎株儿童株中青霉素敏感株（86.8%）和耐药株（2.2%）所占比例较2016年有所下降，中介株的检出率（11.0%）有所上升。肠杆菌科细菌对碳青霉烯类抗生素仍高度敏感，多数菌属的耐药率低于10.0%

表1. 临床分离菌在各类标本中的分布（%）

细菌名称	数量	占比（%）
呼吸道标本	0	0.0
尿液标本	0	0.0
血液标本	0	0.0
脑脊液标本	0	0.0
伤口脓液标本	0	0.0
无菌体液	0	0.0
生殖道分泌物	0	0.0
粪便标本	0	0.0
其他	0	0.0

表2. 2022年主要临床主要分离菌种分布（前20位）（%）

细菌名称	数量	占比（%）
其他	0	
合计	0	

