

傷寒論



〔漢〕 張機（仲景） 撰

上海科學技術出版社



伤 寒 论

〔汉〕 张机(仲景) 撰

上海中医学院伤寒温病学教研组 校注

上海科学技术出版社

伤寒论

（汉）张机（仲景）撰
上海中医药大学伤寒温病学教研组校注

封面设计 庞家震

伤寒论

【汉】张机（仲景）撰

上海中医药大学伤寒温病学教研组 校注

上海科学技术出版社出版

（上海瑞金二路450号）

发行所：上海发行所发行 江苏扬中印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 4.125 字数 60,000

1983年4月第1版 1983年4月第1次印刷

印数：1—34,300

统一书号：14119·1608 定价：【科图】0.41元

再 版 说 明

《伤寒论》系东汉末年著名医学家张仲景所撰，是一部重要的中医经典著作。

《伤寒论》一书，以六经分证为主，创立了祖国医学辨证论治的基本法则，对中医学术的发展有深远影响，对中医临床医学具有重要的指导作用，是学习和研究祖国医学的必读之书。

《伤寒论》原书共分十卷，二十二篇。一九七六年上海中医学院中医基础教研组根据明代赵开美复刻的宋本《伤寒论》，从《辨太阳病脉证并治上》起至《辨阴阳易差后劳复病脉证并治》止，共十篇，398条，112方，汇辑成册，有些地方作了注释。这次，又由伤寒温病学教研组在原来基础上，重加整理，并增加了索引，以便检阅。原文繁体字一般均改为简体字。此书可供读者学习研究《伤寒论》之用。

宋刻《伤寒论》序

夫《伤寒论》，盖祖述大圣人之意，诸家莫其伦拟。故晋·皇甫谧序《甲乙针经》云：伊尹以元圣之才，撰用《神农本草》，以为汤液。汉·张仲景论广汤液，为数十卷，用之多验。近世太医令王叔和，撰次仲景遗论甚精，皆可施用。是仲景本伊尹之法，伊尹本神农之经，得不谓祖述大圣人之意乎？

张仲景《汉书》无传。见《名医录》云：南阳人，名机，仲景乃其字也。举孝廉，官至长沙太守。始受术于同郡张伯祖。时人言，识用精微过其师。所著论，其言精而奥；其法简而详。非浅闻寡见者所能及。自仲景于今八百余年，惟王叔和能学之。其间如葛洪、陶（弘）景、胡洽、徐之才、孙思邈辈，非不才也。但各自名家，而不能修明之。开宝中，节度使高继冲，曾编录进上。其文理舛错，未尝考正。历代虽藏之书府，亦阙于讎校。是使治病之流，举天下无或知者。国家诏儒臣校正医书，臣奇续被其选。以为百病之急，无急于伤寒。

今先校定张仲景《伤寒论》十卷，总二十二篇，证外

张仲景原序

论曰：余每览越人入虢之诊，望齐侯之色，未尝不慨然叹其才秀也。怪当今居世之士，曾不留神医药，精究方术，上以疗君亲之疾，下以救贫贱之厄，中以保身长全，以养其生。但竞逐荣势，企踵权豪，孜孜汲汲，惟名利是务；崇饰其末，忽弃其本，华其外面，悴其内。皮之不存，毛将安附焉？卒然遭邪风之气，婴非常之疾，患及祸至，而方震栗；降志屈节，钦望巫祝，告穷归天，束手受败。赍百年之寿命，持至贵之重器，委付凡医，恣其所措。咄嗟呜呼，厥身已毙，神明消灭，变为异物，幽潜重泉，徒为啼泣。痛夫！举世昏迷，莫能觉悟，不惜其命，若是轻生，彼何荣势之云哉？而进不能爱人知人，退不能爱身知己，遇灾值祸，身居厄地；蒙蒙昧昧，恣若游魂。哀乎！趋世之士，驰竞浮华，不固根本，忘躯徇物，危若冰谷，至于是也！

余宗族素多，向余二百。建安纪年以来，犹未十稔，其死亡者，三分有二，伤寒十居其七。感往昔之沦丧，伤横夭之莫救，乃勤求古训，博采众方，撰用《素

问》、《九卷》、《八十一难》、《阴阳大论》、《胎产药录》，并平脉辨证，为《伤寒杂病论》合十六卷，虽未能尽愈诸病，庶可以见病知源。若能寻余所集，思过半矣。

夫天布五行，以运万类，人禀五常，以有五藏；经络府俞，阴阳会通；玄冥幽微，变化难极。自非才高识妙，岂能探其理致哉！上古有神农、黄帝、岐伯、伯高、雷公、少俞、少师、仲文，中世有长桑、扁鹊，汉有公乘阳庆及仓公。下此以往，未之闻也。观今之医，不念思求经旨，以演其所知；各承家技，始终顺旧。省疾问病，务在口给，相对斯须，便处汤药。按寸不及尺，握手不及足；人迎、跌阳，三部不参；动数发息，不满五十。短期未知决诊；九候曾无仿佛；明堂阙庭，尽不见察，所谓窥管而已。夫欲视死别生，实为难矣！孔子云：生而知之者上，学则亚之。多闻博识，知之次也。余宿尚方术，请事斯语。

目 次

辨太阳病脉证并治(上)

(起第一条迄三十条)

桂枝汤	3
桂枝加葛根汤	4
桂枝加附子汤	5
桂枝去芍药汤	5
桂枝去芍药加附子汤	6
桂枝麻黄各半汤	6
桂枝二麻黄一汤	7
白虎加人参汤	8
桂枝二越婢一汤	8
桂枝去桂加茯苓白朮汤	9
甘草干姜汤	9
芍药甘草汤	10
调胃承气汤	10
四逆汤	10

辨太阳病脉证并治(中)

(起三十一条迄一百二十七条)

葛根汤	11
葛根加半夏汤	11
葛根黄芩黄连汤	12
麻黄汤	12
小柴胡汤	12
大青龙汤	13
小青龙汤	14
桂枝汤〔复出方〕	14
桂枝加厚朴杏子汤	15
干姜附子汤	18
桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤	18
麻黄杏仁甘草石膏汤	18
桂枝甘草汤	18
茯苓桂枝甘草大枣汤	19
厚朴生姜半夏甘草人参汤	19
茯苓桂枝白朮甘草汤	19
芍药甘草附子汤	20
茯苓四逆汤	20
调胃承气汤〔复出方〕	20
五苓散	21
茯苓甘草汤	21

梔子豉汤	22
梔子甘草豉汤	22
梔子生姜豉汤	22
梔子厚朴汤	23
梔子干姜汤	23
真武汤	23
四逆汤〔复出方〕	25
小柴胡汤〔复出方〕	26
小建中汤	27
大柴胡汤	28
柴胡加芒硝汤	28
桃核承气汤	29
柴胡加龙骨牡蛎汤	29
桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤	31
桂枝加桂汤	32
桂枝甘草龙骨牡蛎汤	33
抵当汤	34
抵当丸	34

辨太阳病脉证并治(下)

(起一百二十八条迄一百七十八条)

大陷胸丸	35
大陷胸汤	36
大柴胡汤〔复出方〕	37

小陷胸汤	37
文蛤散	38
五苓散〔复出方〕	38
白散	39
小柴胡汤〔复出方〕	40
柴胡桂枝汤	40
柴胡桂枝干姜汤	41
半夏泻心汤	41
十枣汤	42
大黄黄连泻心汤	42
附子泻心汤	43
生姜泻心汤	43
甘草泻心汤	44
赤石脂禹余粮汤	45
旋复代赭汤	45
麻黄杏子甘草石膏汤〔复出方〕	45
桂枝人参汤	46
瓜蒂散	46
白虎加人参汤〔复出方〕	47
黄芩汤	48
黄芩加半夏生姜汤	48
黄连汤	48
桂枝附子汤	49
去桂加白朮汤	49

甘草附子汤	49
白虎汤	50
炙甘草汤	50

辨阳明病脉证并治

(起一百七十九条迄二百六十二条)

调胃承气汤〔复出方〕	54
大承气汤	55
小承气汤	55
白虎汤〔复出方〕	57
梔子豉汤〔复出方〕	58
白虎加人参汤〔复出方〕	58
猪苓汤	58
四逆汤〔复出方〕	59
小柴胡汤〔复出方〕	59
麻黄汤〔复出方〕	60
蜜煎导	60
桂枝汤〔复出方〕	60
茵陈蒿汤	61
抵当汤〔复出方〕	61
吴茱萸汤	62
五苓散〔复出方〕	63
麻子仁丸	63
梔子柏皮汤	65

麻黄连轺赤小豆汤	66
----------------	----

辨少阳病脉证并治

(起二百六十三条文迄二百七十二条)

小柴胡汤〔复出方〕	66
-----------------	----

辨太阴病脉证并治

(起二百七十三条文迄二百八十条)

桂枝汤〔复出方〕	68
桂枝加芍药汤	68
桂枝加大黄汤	69

辨少阴病脉证并治

(起二百八十一条迄三百二十五条)

麻黄细辛附子汤	71
麻黄附子甘草汤	71
黄连阿胶汤	72
附子汤	72
桃花汤	72
吴茱萸汤〔复出方〕	73
猪肤汤	73
甘草汤	73
桔梗汤	74

苦酒汤	74
半夏散及汤	74
白通汤	75
白通加猪胆汁汤	75
真武汤〔复出方〕	75
通脉四逆汤	76
四逆散	76
猪苓汤〔复出方〕	77
大承气汤〔复出方〕	77
四逆汤〔复出方〕	77

辨厥阴病脉证并治

(起三百二十六条迄三百八十一条)

乌梅丸	80
白虎汤〔复出方〕	81
当归四逆汤	81
当归四逆加吴茱萸生姜汤	82
四逆汤〔复出方〕	82
瓜蒂散〔复出方〕	82
茯苓甘草汤〔复出方〕	83
麻黄升麻汤	83
干姜黄芩黄连人参汤	84
通脉四逆汤〔复出方〕	85
白头翁汤	85

桂枝汤〔复出方〕	85
小承气汤〔复出方〕	86
梔子豉汤〔复出方〕	86
吴茱萸汤〔复出方〕	86
小柴胡汤〔复出方〕	87

辨霍乱病脉证并治

(起三百八十二条迄三百九十一条)

四逆加人参汤	88
五苓散〔复出方〕	88
理中丸	88
桂枝汤〔复出方〕	89
四逆汤〔复出方〕	90
通脉四逆加猪胆汁汤	90

辨阴阳易差后劳复病脉证并治

(起三百九十二条迄三百九十八条)

烧裨散	91
枳实梔子豉汤	91
小柴胡汤〔复出方〕	91
牡蛎泽泻散	91
理中丸〔复出方〕	92
竹叶石膏汤	92
索引	93

伤寒论

汉 张仲景撰

晋 王叔和编次 宋 林亿校正

明 赵开美校刻 沈琳同校

辨太阳病脉证并治(上)

1. 太阳之为病,脉浮,头项强^[1]痛而恶寒^[2]。
2. 太阳病,发热,汗出,恶风,脉缓者,名为中风^[3]。
3. 太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒,体痛,呕逆,脉阴阳俱紧^[4]者,名为伤寒。
4. 伤寒一日,太阳受之。脉若静者,为不传^[5]。颇

[1] 强[jiàng]: 不柔顺的意思。

[2] 恶[wù]寒: 即怕冷。

[3] 中风: 中[zhòng]众, 中伤的意思。这里的中风是指一种外感风邪的疾病, 不是指半身不遂、口眼喎斜的中风。

[4] 脉阴阳俱紧: 尺部脉属阴, 寸部脉属阳, 脉阴阳俱紧指尺部、寸部俱见紧脉。

[5] 传: 指传经。传经就是热性病发展变化的阶段性。如: 太阳病发展变化为阳明病或少阳病。不传指病情稳定。

欲吐，若躁烦^[1]，脉数急^[2]者，为传也。

5. 伤寒二三日，阳明、少阳证不见者，为不传也。

6. 太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病。若发汗已，身灼热者，名风温。风温为病，脉阴阳俱浮，自汗出，身重，多眠睡，鼻息必鼾，语言难出。若被下者，小便不利，直视失溲^[3]。若被火^[4]者，微发黄色，剧则如惊痫，时痙瘛^[5]，若火熏之。一逆尚引日，再逆促命期。

7. 病有发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也。发于阳，七日愈；发于阴，六日愈。以阳数七、阴数六^[6]故也。

8. 太阳病，头痛至七日以上自愈者，以行其经尽^[7]故也。若欲作再经^[8]者，针足阳明，使经不传则愈。

9. 太阳病欲解时，从巳至未上。

[1] 躁烦：即烦躁。

[2] 脉数急：数[shuò 朔]，脉数急就是快而急促的脉象。

[3] 直视失溲：直视，两目直瞪而不转睛。失溲，大小便失禁。

[4] 被火：指用烧针、熏、熨、灸等一类的方法治疗。

[5] 痙瘛：抽风，手足抽掣。

[6] 阳数七、阴数六：古代有“天一生水，地六成之；地二生火，天七成之”的说法。水属阴，火属阳。因此以六为阴数，以七为阳数。

[7] 行其经尽：行尽本经，如太阳病不传经而痊愈。

[8] 再经：再传至另一经。

10. 风家^[1]，表解而不了了^[2]者，十二日愈。

11. 病人身大热，反欲得衣者，热在皮肤，寒在骨髓也；身大寒，反不欲近衣者，寒在皮肤，热在骨髓也。

12. 太阳中风，阳浮而阴弱^[3]，阳浮者，热自发，阴弱者，汗自出。嗇嗇^[4]恶寒，淅淅^[5]恶风，翕翕^[6]发热，鼻鸣干呕者，桂枝汤主之。方一。

桂枝三两，去皮 芍药三两 甘草二两，炙
生姜三两，切 大枣十二枚，擘

上五味，㕮咀^[7]三味。以水七升，微火煮取三升，去滓。适寒温，服一升。服已须臾，啜^[8]热稀粥一升余，以助药力。温覆令一时许，遍身𦞦𦞦^[9]微似有汗者益佳，不可令如水流离，病必不除。若一服汗出病差，停后服，不必尽剂；若不汗，更服，依

[1] 风家：指经常患太阳中风的病人。

[2] 不了了：尚未彻底痊愈的意思。

[3] 阳浮而阴弱：有两种解释：一指脉象而言。轻按见浮，故称阳浮；重按见弱，故称阴弱。二指营卫而言。卫气浮盛，故称阳浮；营阴不足，故称阴弱。

[4] 嗇嗇[sè sè]：畏怯貌，这里形容怕冷。

[5] 淅淅[xī xī]：风声，这里形容怕风。

[6] 翕翕[xī xī]：轻附浅合貌，这里形容发热较轻。

[7] 㕮咀[fū jǔ]：古人以牙齿碎药，称为㕮咀。后引申为将药切碎。

[8] 啜[chuò]：饮的意思。

[9] 𦞦𦞦[zhé zhé]：小雨不辍，这里形容微汗，皮肤湿润。

前法；又不汗，后服小促其间，半日许令三服尽；若病重者，一日一夜服，周时观之，服一剂尽，病证犹在者，更作服；若汗不出，乃服至二、三剂。禁生冷、粘滑、肉面、五辛^[1]、酒酪、臭恶等物。

13. 太阳病，头痛，发热，汗出，恶风，桂枝汤主之。

方二。用前第一方。

14. 太阳病，项背强几几^[2]，反汗出恶风者，桂枝加葛根汤主之。方三。

葛根四两 麻黄三两，去节 芍药二两 生姜三两，切 甘草二两，炙 大枣十二枚，擘 桂枝二两，去皮
上七味，以水一斗，先煮麻黄、葛根，减二升，去上沫，纳诸药，煮取三升，去滓。温服一升。覆取微似汗，不须啜粥，余如桂枝法将息^[3]及禁忌。

臣亿等谨按：仲景本论，太阳中风自汗用桂枝，伤寒无汗用麻黄，今证云汗出恶风，而方中有麻黄，恐非本意也。第三卷有葛根汤证云无汗恶风，正与此方同，是合用麻黄也。此云桂枝加葛根汤，恐是桂枝中但加葛根耳。

15. 太阳病，下之后，其气上冲者，可与桂枝汤，方用前法。若不上冲者，不得与之。方四。

[1] 五辛：韭、薤、蒜、芸薹、胡荽五种蔬菜。

[2] 几几[shū 殊]：形容牵强拘急不舒。

[3] 将息：将养调息，也就是护理调治的意思。

16. 太阳病三日，已发汗，若吐、若下、若温针，仍不解者，此为坏病^[1]，桂枝^[2]不中^[3]与之也。观其脉证，知犯何逆，随证治之。桂枝本为解肌^[4]，若其人脉浮紧，发热，汗不出者，不可与之也。常须识此，勿令误也。方五。

17. 若酒客^[5]病，不可与桂枝汤，得之则呕，以酒客不喜甘故也。

18. 喘家^[6]，作桂枝汤，加厚朴、杏子佳。方六。

19. 凡服桂枝汤吐者，其后必吐脓血也。

20. 太阳病，发汗，遂漏不止^[7]，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸者，桂枝加附子汤主之。方七。

桂枝三两，去皮 芍药三两 甘草三两，炙 生姜三两，切 大枣十二枚，擘 附子一枚，炮，去皮，破八片

上六味，以水七升，煮取三升，去滓。温服一升。本云桂枝汤，今加附子，将息如前法。

21. 太阳病，下之后，脉促、胸满者，桂枝去芍药汤

[1] 坏病：误治后造成的变证，无规律可循。

[2] 桂枝：指桂枝汤。

[3] 不中：不适宜。

[4] 解肌：解散肌表之邪，属汗法，适用于原来有汗的患者。

[5] 酒客：平素爱好饮酒的人。

[6] 喘家：平素有气喘病的人。

[7] 漏不止：即汗出不止。

主之。方八。促一作纵。

桂枝三两，去皮 甘草二两，炙 生姜三两，切
大枣十二枚，擘

上四味，以水七升，煮取三升，去滓。温服一升。本云桂枝汤，今去芍药，将息如前法。

22. 若微寒者，桂枝去芍药加附子汤主之。方九。

桂枝三两，去皮 甘草二两，炙 生姜三两，切
大枣十二枚，擘 附子一枚，炮，去皮，破八片

上五味，以水七升，煮取三升，去滓。温服一升。本云桂枝汤，今去芍药，加附子，将息如前法。

23. 太阳病，得之八九日，如症状^[1]，发热恶寒，热多寒少，其人不呕，清便^[2]欲自可，一日二三度发。脉微缓者，为欲愈也；脉微而恶寒者，此阴阳俱虚，不可更发汗、更下、更吐也；面色反有热色者，未欲解也，以其不能得小汗出，身必痒，宜桂枝麻黄各半汤。方十。

桂枝一两十六铢^[3]，去皮 芍药 生姜切 甘草炙
麻黄去节，各一两 大枣四枚，擘 杏仁二十四枚，汤浸去皮尖及两仁者

上七味，以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫，

[1] 如症状：寒热发作有定时，状如疟疾。

[2] 清便：清同圉。清便即排便。

[3] 铢[zhū朱]：汉代衡制中的重量单位，二十四铢等于一两。

纳诸药，煮取一升八合，去滓。温服六合。本云桂枝汤三合，麻黄汤三合，并为六合，顿服，将息如上法。

臣亿等谨按：桂枝汤方：桂枝、芍药、生姜各三两，甘草二两，大枣十二枚。麻黄汤方：麻黄三两，桂枝二两，甘草一两，杏仁七十个。今以算法约之，二汤各取三分之一，即得桂枝一两十六铢，芍药、生姜、甘草各一两，大枣四枚，杏仁二十三个零三分枚之一，收之得二十四个，合方。详此方乃三分之一，非各半也，宜云合半汤。

24. 太阳病，初服桂枝汤，反烦不解者，先刺风池、风府，却与桂枝汤则愈。方十一。用前第一方。

25. 服桂枝汤，大汗出，脉洪大者，与桂枝汤，如前法。若形似疟，一日再发者，汗出必解，宜桂枝二麻黄一汤。方十二。

桂枝一两十七铢，去皮 芍药一两六铢 麻黄十六铢，去节 生姜一两六铢，切 杏仁十六个，去皮尖 甘草一两二铢，炙 大枣五枚，擘

上七味，以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫，纳诸药，煮取二升，去滓。温服一升，日再服。本云桂枝汤二分、麻黄汤一分，合为二升，分再服。今合为一方，将息如前法。臣亿等谨按：桂枝汤方：桂枝、芍药、生姜各三两，甘草二两，大枣十二枚。麻黄汤方：麻黄三两，桂枝二两，甘草一两，杏仁七十个。今以算法约之，桂枝汤取十二分之五，即得桂枝、芍药、生姜各一两六铢，甘草二铢，大枣五枚。麻黄汤取九分之二，即得麻黄十六铢，桂枝十铢三分铢之二，收之得

十一铢，甘草五铢三分铢之一，收之得六铢，杏仁十五个九分枚之四，收之得十六个。二汤所取相合，即共得桂枝一两十七铢，麻黄十六铢，生姜、芍药各一两六铢，甘草一两二铢，大枣五枚，杏仁十六个，合方。

26. 服桂枝汤，大汗出后，大烦渴不解，脉洪大者，白虎加人参汤主之。方十三。

知母六两 石膏一斤，碎，绵裹 甘草二两，炙 粳米六合 人参三两

上五味，以水一斗，煮米熟，汤成，去滓。温服一升，日三服。

27. 太阳病，发热恶寒，热多寒少。脉微弱者，此无阳也，不可发汗。宜桂枝二越婢一汤。方十四。

桂枝去皮 芍药 麻黄 甘草炙，各十八铢 大枣四枚，擘 生姜一两二铢，切 石膏二十四铢，碎，绵裹

上七味，以水五升，煮麻黄一二沸，去上沫，纳诸药，煮取二升，去滓。温服一升。本云当裁为越婢汤、桂枝汤，合之饮一升。今合为一方，桂枝汤二分、越婢汤一分。臣亿等谨按：桂枝汤方：桂枝、芍药、生姜各三两，甘草二两，大枣十二枚。越婢汤方：麻黄二两，生姜三两，甘草二两，石膏半斤，大枣十五枚。今以算法约之，桂枝汤取四分之一，即得桂枝、芍药、生姜各十八铢，甘草十二铢，大枣三枚。越婢汤取八分之一，即得麻黄十八铢、生姜九铢、甘草六铢、石膏二十四铢，大枣一枚八分之七，弃之。二汤所取相合，即共得桂枝、芍

药、甘草、麻黄各十八铢，生姜一两三铢，石膏二十四铢，大枣四枚，合方。旧云桂枝三，今取四分之一，即当云桂枝二也。越婢汤方，见仲景杂方中。《外台秘要》一云起脾汤。

28. 服桂枝汤，或下之，仍头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满微痛，小便不利者，桂枝去桂加茯苓白朮汤主之。方十五。

芍药三两 甘草二两，炙 生姜切 白朮 茯苓各三两 大枣十二枚，擘

上六味，以水八升，煮取三升，去滓。温服一升。小便利则愈。本云桂枝汤，今去桂枝，加茯苓、白朮。

29. 伤寒脉浮，自汗出，小便数，心烦，微恶寒，脚挛急，反与桂枝，欲攻其表，此误也。得之便厥^[1]，咽中干，烦躁吐逆者，作甘草干姜汤与之，以复其阳。若厥愈足温者，更作芍药甘草汤与之，其脚即伸。若胃气不和谵语^[2]者，少与调胃承气汤。若重发汗，复加烧针者，四逆汤主之。方十六。

甘草干姜汤方

甘草四两，炙 干姜二两

上二味，以水三升，煮取一升五合，去滓，分

[1] 厥：这里指手足逆冷。

[2] 谵语：说胡话。

温再服。

芍药甘草汤方

白芍药 甘草炙，各四两

上二味，以水三升，煮取一升五合，去滓。分温再服。

调胃承气汤方

大黄四两，去皮，清酒洗 甘草二两，炙 芒硝半升

上三味，以水三升，煮取一升，去滓。纳芒硝，更上火微煮令沸，少少温服之。

四逆汤方

甘草二两，炙 干姜一两半 附子一枚，生用，去皮，破八片

上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓。分温再服。强人可大附子一枚、干姜三两。

30. 问曰：证象阳旦^[1]，按法治之而增剧，厥逆，咽中干，两胫拘急而谵语。师曰：言夜半手足当温，两脚当伸。后如师言。何以知此？答曰：寸口脉浮而大。浮为风，大为虚，风则生微热，虚则两胫挛，病形象桂枝，因加附子参其间，增桂令汗出，附子温经，亡阳故也。厥逆，咽中干，烦躁，阳明内结，谵语，烦乱，更饮甘草干姜

[1] 阳旦：这里指桂枝汤证。

汤。夜半阳气还，两足当热，胫尚微拘急，重与芍药甘草汤，尔乃胫伸。以承气汤微溲，则止其谵语，故知病可愈。

辨太阳病脉证并治(中)

31. 太阳病，项背强几几，无汗，恶风，葛根汤主之。方一。

葛根四两 麻黄三两，去节 桂枝二两，去皮 生姜三两，切 甘草二两，炙 芍药二两 大枣十二枚，擘
上七味，以水一斗，先煮麻黄、葛根，减二升，去白沫，纳诸药，煮取三升，去滓。温服一升。覆取微似汗，余如桂枝法将息及禁忌，诸汤皆仿此。

32. 太阳与阳明合病^[1]者，必自下利，葛根汤主之。方二。用前第一方，一云用后第四方。

33. 太阳与阳明合病，不下利，但呕者，葛根加半夏汤主之。方三。

葛根四两 麻黄三两，去节 甘草二两，炙 芍药二两 桂枝二两，去皮 生姜二两，切 半夏半升，洗 大枣十二枚，擘

[1] 合病：两个阳经或三个阳经同时受邪而发病。

上八味，以水一斗，先煮葛根、麻黄，减二升，去白沫，纳诸药，煮取三升，去滓。温服一升。覆取微似汗。

34. 太阳病，桂枝证，医反下之，利遂不止。脉促者，表未解也。喘而汗出者，葛根黄芩黄连汤主之。方四。促一作纵。

葛根半斤 甘草二两，炙 黄芩三两 黄连三两
上四味，以水八升，先煮葛根，减二升，纳诸药，煮取二升，去滓。分温再服。

35. 太阳病，头痛，发热，身疼，腰痛，骨节疼痛，恶风，无汗而喘者，麻黄汤主之。方五。

麻黄三两，去节 桂枝二两，去皮 甘草一两，炙
杏仁七十个，去皮尖

上四味，以水九升，先煮麻黄，减二升，去上沫，纳诸药，煮取二升半，去滓。温服八合。覆取微似汗，不须啜粥，余如桂枝法将息。

36. 太阳与阳明合病，喘而胸满者，不可下，宜麻黄汤。方六。用前第五方。

37. 太阳病，十日以去，脉浮细而嗜卧者，外已解也。设胸满胁痛者，与小柴胡汤。脉但浮者，与麻黄汤。方七。用前第五方。

小柴胡汤方

柴胡半斤 黄芩 人参 甘草炙 生姜切，
各三两 大枣十二枚，擘 半夏半升，洗

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升。温服一升，日三服。

38. 太阳中风，脉浮紧，发热，恶寒，身疼痛，不汗出而烦躁者，大青龙汤主之。若脉微弱，汗出恶风者，不可服之。服之则厥逆，筋惕肉瞤^[1]，此为逆也。大青龙汤方。方八。

麻黄六两，去节 桂枝二两，去皮 甘草二两，炙
杏仁四十枚，去皮尖 生姜三两，切 大枣十枚，擘
石膏如鸡子大，碎

上七味，以水九升，先煮麻黄，减二升，去上沫，纳诸药，煮取三升，去滓。温服一升。取微似汗。汗出多者，温粉^[2]粉之。一服汗者，停后服。若复服，汗多亡阳，遂^{一作逆}虚，恶风，烦躁，不得眠也。

39. 伤寒脉浮缓，身不疼，但重，乍有轻时，无少阴证者，大青龙汤发之。方九。用前第八方。

40. 伤寒表不解，心下有水气，干呕，发热而咳，或

[1] 筋惕肉瞤：指肌肉跳动。

[2] 温粉：是一种外用的扑粉，用以止汗。

渴，或利，或噎，或小便不利、少腹满，或喘者，小青龙汤主之。方十。

麻黄去节 芍药 细辛 干姜 甘草炙 桂枝去皮，各三两 五味子半升 半夏半升，洗

上八味，以水一斗，先煮麻黄减二升，去上沫，纳诸药，煮取三升，去滓。温服一升。若渴，去半夏，加栝楼根三两；若微利，去麻黄，加薤花，如一鸡子，熬令赤色；若噎者，去麻黄，加附子一枚，炮；若小便不利、少腹满者，去麻黄，加茯苓四两；若喘，去麻黄，加杏仁半升，去皮尖。且薤花不治利，麻黄主喘，今此语反之，疑非仲景意。臣亿等谨按：小青龙汤，大要治水。又按本草，薤花下十二水，若水去，利则止也。又按千金，形肿者，应纳麻黄，乃纳杏仁者，以麻黄发其阳故也。以此证之，岂非仲景意也。

41. 伤寒，心下有水气，咳而微喘，发热不渴。服汤已，渴者，此寒去欲解也。小青龙汤主之。方十一。
用前第十方。

42. 太阳病，外证未解，脉浮弱者，当以汗解，宜桂枝汤。方十二。

桂枝去皮 芍药 生姜切，各三两 甘草二两，炙 大枣十二枚，擘

上五味，以水七升，煮取三升，去滓。温服一

升。须臾^[1]啜热稀粥一升，助药力，取微汗。

43. 太阳病，下之微喘者，表未解故也。桂枝加厚朴杏子汤主之。方十三。

桂枝三两，去皮 甘草二两，炙 生姜三两，切
芍药三两 大枣十二枚，擘 厚朴二两，炙，去皮 杏仁
五十枚，去皮尖

上七味，以水七升，微火煮取三升，去滓。温服一升。覆取微似汗。

44. 太阳病，外证未解，不可下也，下之为逆。欲解外者，宜桂枝汤。方十四。用前第十二方。

45. 太阳病，先发汗不解，而复下之，脉浮者不愈。浮为在外，而反下之，故令不愈。今脉浮，故在外，当解外则愈，宜桂枝汤。方十五。用前第十二方。

46. 太阳病，脉浮紧，无汗，发热，身疼痛，八九日不解，表证仍在，此当发其汗。服药已微除，其人发烦目瞑^[2]，剧者必衄，衄乃解。所以然者，阳气重故也。麻黄汤主之。方十六。用前第五方。

47. 太阳病，脉浮紧，发热，身无汗，自衄者愈。

48. 二阳并病^[3]，太阳初得病时，发其汗，汗先出

[1] 须臾：顷刻的意思。

[2] 发烦目瞑：心里发烦，两目昏暗。

[3] 并病：一经之证未罢，他经之证又起。

不彻，因转属阳明，续自微汗出，不恶寒。若太阳病证不罢者，不可下，下之为逆，如此可小发汗。设面色缘缘正赤^[1]者，阳气怫郁^[2]在表，当解之、熏之^[3]。若发汗不彻，不足言，阳气怫郁不得越，当汗不汗，其人躁烦，不知痛处，乍在腹中，乍在四肢，按之不可得，其人短气但坐，以汗出不彻故也，更发汗则愈。何以知汗出不彻？以脉涩，故知也。

49. 脉浮数者，法当汗出而愈。若下之，身重、心悸者，不可发汗，当自汗出乃解。所以然者，尺中脉微，此里虚。须表里实，津液自和，便自汗出愈。

50. 脉浮紧者，法当身疼痛，宜以汗解之。假令尺中迟者，不可发汗。何以知然？以荣气不足，血少故也。

51. 脉浮者，病在表，可发汗，宜麻黄汤。方十七。
用前第五方，法用桂枝汤。

52. 脉浮而数者，可发汗，宜麻黄汤。方十八。用前第五方。

53. 病常自汗出者，此为荣气和，荣气和者，外不

[1] 缘缘正赤：满面通红的意思。

[2] 怫郁：郁结之意。

[3] 熏之：以药熏蒸取汗，是古代汗法之一。

谐^[1]，以卫气不共荣气谐和故尔。以荣行脉中，卫行脉外。复发其汗，荣卫和则愈，宜桂枝汤。方十九。用前第十二方。

54. 病人藏^[2]无他病，时发热，自汗出而不愈者，此卫气不和也。先其时发汗则愈，宜桂枝汤。方二十。用前第十二方。

55. 伤寒脉浮紧，不发汗，因致衄者，麻黄汤主之。方二十一。用前五方。

56. 伤寒不大便六七日，头痛有热者，与承气汤。其小便清——云大便青者，知不在里，仍在表也，当须发汗。若头痛者必衄。宜桂枝汤。方二十二。用前第十二方。

57. 伤寒发汗已解，半日许复烦，脉浮数者，可更发汗，宜桂枝汤。方二十三。用前第十二方。

58. 凡病，若发汗，若吐，若下，若亡血^[3]，亡津液，阴阳自和者，必自愈。

59. 大下之后，复发汗，小便不利者，亡津液故也。勿治之，得小便利，必自愈。

60. 下之后，复发汗，必振寒^[4]，脉微细。所以然

[1] 谐：调和的意思。

[2] 藏：指内脏。

[3] 亡血：即失血。

[4] 振寒：即寒战。

者，以内外俱虚故也。

61. 下之后，复发汗，昼日烦躁不得眠，夜而安静，不呕，不渴，无表证，脉沉微，身无大热者，干姜附子汤主之。方二十四。

干姜一两 附子一枚，生用，去皮，切八片

上二味，以水三升，煮取一升，去滓。顿服。

62. 发汗后，身疼痛，脉沉迟者，桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤主之。方二十五。

桂枝三两，去皮 芍药四两 甘草二两，炙 人参三两 大枣十二枚，擘 生姜四两

上六味，以水一斗二升，煮取三升，去滓。温服一升。本云桂枝汤，今加芍药、生姜、人参。

63. 发汗后，不可更行桂枝汤。汗出而喘，无大热者，可与麻黄杏仁甘草石膏汤。方二十六。

麻黄四两，去节 杏仁五十个，去皮尖 甘草二两，炙 石膏半斤，碎，绵裹

上四味，以水七升，煮麻黄，减二升，去上沫，纳诸药，煮取二升，去滓。温服一升。本云黄耳杯^{〔1〕}。

64. 发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸欲得按者，桂枝甘草汤主之。方二十七。

〔1〕黄耳杯：盃同杯。黄耳杯为汉代饮器的一种。

桂枝四两，去皮 甘草二两，炙

右二味，以水三升，煮取一升，去滓。顿服。

65. 发汗后，其人脐下悸者，欲作奔豚^[1]，茯苓桂枝甘草大枣汤主之。方二十八。

茯苓半斤 桂枝四两，去皮 甘草二两，炙 大枣十五枚，擘

上四味，以甘澜水一斗，先煮茯苓，减二升，纳诸药，煮取三升，去滓。温服一升，日三服。

作甘澜水法：取水二斗，置大盆内，以杓扬之，水上有珠子五六千颗相逐，取用之。

66. 发汗后，腹胀满者，厚朴生姜半夏甘草人参汤主之。方二十九。

厚朴半斤，炙，去皮 生姜半斤，切 半夏半升，洗 甘草二两 人参一两

上五味，以水一斗，煮取三升，去滓。温服一升，日三服。

67. 伤寒，若吐，若下后，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧，发汗则动经^[2]，身为振振摇者，茯苓桂枝白朮甘草汤主之。方三十。

[1] 奔豚：病名。主症为腹中有气上冲，如豚之奔。

[2] 动经：扰动经脉。

茯苓四两 桂枝三两，去皮 白朮 甘草各二两，炙
上四味，以水六升，煮取三升，去滓。分温三
服。

68. 发汗病不解，反恶寒者，虚故也。芍药甘草附
子汤主之。方三十一。

芍药 甘草炙，各三两 附子一枚，炮，去皮，破八片
上三味，以水五升，煮取一升五合，去滓。分温
三服。疑非仲景方。

69. 发汗，若下之，病仍不解，烦躁者，茯苓四逆汤
主之。方三十二

茯苓四两 人参一两 附子一枚，生用，去皮，破八片
甘草二两，炙 干姜一两半

上五味，以水五升，煮取三升，去滓。温服七
合，日二服。

70. 发汗后，恶寒者，虚故也。不恶寒，但热者，实
也。当和胃气，与调胃承气汤。方三十三。《玉函》云与小
承气汤。

芒硝半升 甘草二两，炙 大黄四两，去皮，清酒洗
上三味，以水三升，煮取一升，去滓，纳芒硝，
更煮两沸。顿服。

71. 太阳病，发汗后，大汗出，胃中干，烦躁不得
眠，欲得饮水者，少少与饮之，令胃气和则愈。若脉浮，

小便不利，微热，消渴^[1]者，五苓散主之。方三十四。即猪苓散是。

猪苓十八铢，去皮 泽泻一两六铢 白朮十八铢
茯苓十八铢 桂枝半两，去皮

上五味，捣为散。以白饮^[2]和服方寸匕^[3]，日三服。多饮暖水，汗出愈，如法将息。

72. 发汗已，脉浮数，烦渴者，五苓散主之。方三十五。用前第三十四方。

73. 伤寒，汗出而渴者，五苓散主之；不渴者，茯苓甘草汤主之。方三十六。

茯苓二两 桂枝二两，去皮 甘草一两，炙 生姜三两，切

上四味，以水四升，煮取二升，去滓。分温三服。

74. 中风，发热六七日，不解而烦，有表里证，渴欲饮水，水入则吐者，名曰水逆^[4]。五苓散主之。方三十七。用前第三十四方。

75. 未持脉时，病人手叉自冒心。师因教试令咳，

[1] 消渴：这里指口渴欲饮的一种症状。不是指多饮、多食、多尿的消渴病。

[2] 白饮：指米汤，也有认为是白开水。

[3] 方寸匕：古代量取药末的器具。

[4] 水逆：指内有水饮，饮水即吐的证候。

而不咳者，此必两耳聋无闻也。所以然者，以重发汗，虚故如此。发汗后，饮水多必喘，以水灌之亦喘。

76. 发汗后，水药不得入口为逆。若更发汗，必吐下不止。发汗吐下后，虚烦不得眠，若剧者，必反复颠倒，心中懊恼^[1]，梔子豉汤主之。若少气者，梔子甘草豉汤主之；若呕者，梔子生姜豉汤主之。方三十八。

梔子豉汤方

梔子十四个，擘 香豉四合，绵裹

上二味，以水四升，先煮梔子，得二升半，纳豉，煮取一升半，去滓。分为二服，温进一服。得吐者，止后服。

梔子甘草豉汤方

梔子十四个，擘 甘草二两，炙 香豉四合，绵裹

上三味，以水四升，先煮梔子、甘草，取二升半，纳豉，煮取一升半，去滓。分二服，温进一服。得吐者，止后服。

梔子生姜豉汤方

梔子十四个，擘 生姜五两 香豉四合，绵裹

上三味，以水四升，先煮梔子、生姜，取二升半，纳豉，煮取一升半，去滓。分二服，温进一服。

[1] 懊恼：心里说不出的难过。

得吐者，止后服。

77. 发汗，若下之，而烦热、胸中窒者，梔子豉汤主之。方三十九。用上初方。

78. 伤寒五六日，大下之后，身热不去，心中结痛者，未欲解也。梔子豉汤主之。方四十。用上初方。

79. 伤寒下后，心烦，腹满，卧起不安者，梔子厚朴汤主之。方四十一。

梔子十四个，擘 厚朴四两，炙，去皮 枳实四枚，
水浸，炙令黄

上三味，以水三升半，煮取一升半，去滓。分二服，温进一服。得吐者，止后服。

80. 伤寒，医以丸药^[1]大下之，身热不去，微烦者，梔子干姜汤主之。方四十二。

梔子十四个，擘 干姜二两

上二味，以水三升半，煮取一升半，去滓。分二服，温进一服。得吐者，止后服。

81. 凡用梔子汤，病人旧微溏者，不可与服之。

82. 太阳病，发汗，汗出不解，其人仍发热，心下悸，头眩，身瞤动，振振欲擗^[2]一作僻地者，真武汤主之。方四十三。

[1] 丸药：是指当时盛行的一种泻下作用猛烈的成药。

[2] 振振欲擗地：擗[pǐ 匹]，身体震颤摇晃，似将倒地的样子。

茯苓 芍药 生姜切，各三两 白朮二两 附子一枚，炮，去皮，破八片

上五味，以水八升，煮取三升，去滓。温服七合，日三服。

83. 咽喉干燥者，不可发汗。

84. 淋家^[1]，不可发汗，发汗必便血。

85. 疮家^[2]，虽身疼痛，不可发汗，汗出则痉^[3]。

86. 衄家^[4]，不可发汗，汗出必额上陷脉急紧，直视不能眴^[5]，一作瞬不得眠。

87. 亡血家^[6]，不可发汗，发汗则寒栗而振^[7]。

88. 汗家^[8]，重发汗，必恍惚心乱^[9]，小便已阴疼^[10]，与禹余粮丸。方四十四。方本阙。

89. 病人有寒，复发汗，胃中冷，必吐蛔。一作逆

90. 本发汗，而复下之，此为逆也。若先发汗，治

[1] 淋家：指素有小便淋漓或尿道涩痛的病人。

[2] 疮家：指久患疮疡或有创伤的病人。

[3] 痉：筋脉拘急。

[4] 衄家：平素患有鼻出血的病人。

[5] 不能眴：眴[shùn 顺]，动目也。不能眴就是两目不能开合。

[6] 亡血家：经常失血的病人。

[7] 寒栗而振：寒战。

[8] 汗家：平素容易出汗的病人。

[9] 恍惚心乱：神识昏惑，慌乱不安。

[10] 阴疼：尿道疼痛。

不为逆。本先下之，而反汗之，为逆。若先下之，治不为逆。

91. 伤寒，医下之，续得下利清谷^[1]不止，身疼痛者，急当救里；后身疼痛，清便自调者，急当救表。救里宜四逆汤，救表宜桂枝汤。方四十五。用前第十二方。

92. 病发热，头痛，脉反沉，若不差，身体疼痛，当救其里，四逆汤方。

甘草二两，炙 干姜一两半 附子一枚，生用，去皮，破八片

上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓。分温再服。强人可大附子一枚、干姜三两。

93. 太阳病，先下而不愈，因复发汗，以此表里俱虚，其人因致冒^[2]，冒家汗出自愈，所以然者，汗出表和故也。里未和，然后复下之。

94. 太阳病未解，脉阴阳俱停，一作微必先振栗，汗出而解。但阳脉微者，先汗出而解；但阴脉微一作尺脉实者，下之而解。若欲下之，宜调胃承气汤。方四十六。

用前第三十三方，一云用大柴胡汤。

95. 太阳病，发热，汗出者，此为荣弱卫强，故使汗出。欲救邪风者，宜桂枝汤。方四十七。方用前法。

[1] 清谷：大便完谷不化。

[2] 冒：轻则头晕目眩，重则晕厥。

96. 伤寒五六日中风，往来寒热，胸胁苦满，嘿嘿^[1]不欲饮食，心烦喜呕^[2]，或胸中烦而不呕，或渴，或腹中痛，或胁下痞硬，或心下悸、小便不利，或不渴、身有微热，或咳者，小柴胡汤主之。方四十八。

柴胡半斤 黄芩三两 人参三两 半夏半升，洗
甘草炙 生姜切，各三两 大枣十二枚，擘

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升。温服一升，日三服。若胸中烦而不呕者，去半夏、人参，加枳实一枚；若渴，去半夏，加人参，合前成四两半，枳实根四两；若腹中痛者，去黄芩，加芍药三两；若胁下痞硬，去大枣，加牡蛎四两；若心下悸、小便不利者，去黄芩，加茯苓四两；若不渴、外有微热者，去人参，加桂枝三两，温覆微汗愈；若咳者，去人参、大枣、生姜，加五味子半升、干姜二两。

97. 血弱气尽，腠理^[3]开，邪气因入，与正气相搏，结于胁下。正邪分争，往来寒热，休作有时。嘿嘿不欲饮食。藏府相连，其痛必下。邪高痛下，故使呕也。一云藏府相违，其病必下，胁膈中痛小柴胡汤主之。服柴胡汤已，

[1] 嘿嘿：同默默。

[2] 喜呕：经常作呕。

[3] 腠理：泛指皮肤、肌肉和脏腑的纹理。

渴者属阳明，以法治之。方四十九。用前方。

98. 得病六七日，脉迟浮弱，恶风寒，手足温，医二三下之，不能食而胁下满痛，面目及身黄，颈项强，小便难者，与柴胡汤，后必下重^[1]。本渴饮水而呕者，柴胡汤不中与也，食谷者哕^[2]。

99. 伤寒四五日，身热，恶风，颈项强，胁下满，手足温而渴者，小柴胡汤主之。方五十。用前方。

100. 伤寒，阳脉涩，阴脉弦，法当腹中急痛，先与小建中汤；不差者，小柴胡汤主之。方五十一。用前方。

小建中汤方

桂枝三两，去皮 甘草二两，炙 大枣十二枚，擘
芍药六两 生姜三两，切 胶饴一升

上六味，以水七升，煮取三升，去滓，纳饴，更上微火消解。温服一升，日三服。呕家^[3]不可用建中汤，以甜故也。

101. 伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是，不必悉具。凡柴胡汤病证而下之，若柴胡证不罢者，复与柴胡汤，必蒸蒸而振^[4]，却复发热汗出而解。

[1] 下重：即里急后重。

[2] 哕：即呃逆。

[3] 呕家：平素常有呕吐的病人。

[4] 蒸蒸而振：蒸蒸，兴盛貌，这里形容高热；振即寒战。

102. 伤寒二三日，心中悸而烦者，小建中汤主之。

方五十二。用前第五十一方。

103. 太阳病，过经^[1]十余日，反二三下之，后四五日，柴胡证仍在者，先与小柴胡。呕不止，心下急，一云呕止小安郁郁微烦者，为未解也。与大柴胡汤下之则愈。方五十三。

柴胡半斤 黄芩三两 芍药三两 半夏半升，洗
生姜五两，切 枳实四枚，炙 大枣十二枚，擘

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎。温服一升，日三服。一方，加大黄二两，若不加，恐不为大柴胡汤。

104. 伤寒十三日不解，胸胁满而呕，日晡所发潮热^[2]，已而微利。此本柴胡证，下之以不得利，今反利者，知医以丸药下之，此非其治也。潮热者，实也。先宜服小柴胡汤以解外，后以柴胡加芒硝汤主之。方五十四。

柴胡二两十六铢 黄芩一两 人参一两 甘草一两，炙 生姜一两，切 半夏二十铢，本云，五枚，洗 大枣四枚，擘 芒硝二两

上八味，以水四升，煮取二升，去滓，纳芒硝，

[1] 过经：指邪离本经，如太阳病或传少阳，或传阳明。

[2] 日晡所发潮热：傍晚时热势升高，如潮汛一样。

更煮微沸。分温再服。不解更作。臣亿等谨按：金匱玉函，方中无芒硝。别一方云，以水七升，下芒硝二合，大黄四两，桑螵蛸五枚，煮取一升半，服五合，微下即愈。本云柴胡再服，以解其外，余二升，加芒硝、大黄、桑螵蛸也。

105. 伤寒十三日，过经，谵语者，以有热也，当以汤下之。若小便利者，大便当硬，而反下利，脉调和者，知医以丸药下之，非其治也。若自下利者，脉当微厥，今反和者，此为内实也。调胃承气汤主之。方五十五。

用前第三十三方。

106. 太阳病不解，热结膀胱，其人如狂，血自下，下者愈。其外不解者，尚未可攻，当先解其外。外解已，但少腹急结者，乃可攻之，宜桃核承气汤。方五十六。

后云解外宜桂枝汤。

桃仁五十个，去皮尖 大黄四两 桂枝二两，去皮
甘草二两，炙 芒硝二两

上五味，以水七升，煮取二升半，去滓，纳芒硝，更上火微沸，下火。先食温服五合，日三服，当微利。

107. 伤寒八九日，下之，胸满，烦，惊，小便不利，谵语，一身尽重，不可转侧者，柴胡加龙骨牡蛎汤主之。方五十七。

柴胡四两 龙骨 黄芩 生姜切 铅丹 人参

桂枝去皮 茯苓各一两半 半夏二合半，洗 大黄二两
牡蛎一两半，熬 大枣六枚，擘

上十二味，以水八升，煮取四升，纳大黄，切如
棋子，更煮一两沸，去滓。温服一升。本云柴胡
汤，今加龙骨等。

108. 伤寒，腹满，谵语，寸口脉浮而紧，此肝乘
脾^[1]也，名曰纵^[2]。刺期门^[3]。方五十八。

109. 伤寒发热，啬啬恶寒，大渴欲饮水，其腹必
满，自汗出，小便利，其病欲解，此肝乘肺也，名曰横^[4]。
刺期门。方五十九。

110. 太阳病二日，反躁。凡熨其背而大汗出，大
热入胃，一作二日内烧瓦熨背大汗出火气入胃胃中水竭，躁烦，
必发谵语。十余日，振栗，自下利者，此为欲解也。故
其汗从腰以下不得汗，欲小便不得，反呕，欲失溲，足下
恶风，大便硬，小便当数，而反不数及不多，大便已，头
卓然^[5]而痛，其人足心必热，谷气^[6]下流故也。

[1] 肝乘脾：在五行中，肝属木，脾属土，肝乘脾即肝木过旺剋脾土太甚。

[2] 纵：五行顺次相剋的形式。

[3] 期门：穴名。位在乳直下二寸处。

[4] 横：五行逆次反侮的形式。

[5] 卓然：即突然。

[6] 谷气：水谷之气。

111. 太阳病中风，以火劫发汗。邪风被火热，血气流溢，失其常度。两阳相熏灼，其身发黄。阳盛则欲衄，阴虚小便难。阴阳俱虚竭，身体则枯燥，但头汗出，剂颈而还^[1]，腹满，微喘，口干，咽烂，或不大便。久则谵语，甚者至哕，手足躁扰，捻衣摸床^[2]。小便利者，其人可治。

112. 伤寒脉浮，医以火迫劫之，亡阳^[3]，必惊狂，卧起不安者，桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤主之。方六十。

桂枝三两，去皮 甘草二两，炙 生姜三两，切
大枣十二枚，擘 牡蛎五两，熬 蜀漆三两，洗去腥
龙骨四两

上七味，以水一斗二升，先煮蜀漆，减二升，纳诸药，煮取三升，去滓。温服一升。本云桂枝汤，今去芍药，加蜀漆、牡蛎、龙骨。

113. 形作伤寒，其脉不弦紧而弱，弱者必渴，被火必谵语，弱者发热，脉浮，解之当汗出愈。

114. 太阳病，以火熏之，不得汗，其人必躁。到经

[1] 剂颈而还：剂同齐。汗出到颈为止。

[2] 捻衣摸床：病人神识不清时，两手不自主地捻弄衣被或抚摸床帐。

[3] 亡阳：这里指亡心阳。

不解，必清血^[1]，名为火邪。

115. 脉浮，热甚，而反灸之，此为实。实以虚治，因火而动，必咽燥，吐血。

116. 微数之脉，慎不可灸。因火为邪，则为烦逆，追虚逐实^[2]，血散脉中，火气虽微，内攻有力，焦骨伤筋，血难复也。脉浮，宜以汗解，用火灸之，邪无从出，因火而盛，病从腰以下必重而痹^[3]，名火逆^[4]也。欲自解者，必当先烦，烦乃有汗而解。何以知之？脉浮，故知汗出解。

117. 烧针令其汗，针处被寒，核起而赤者，必发奔豚。气从少腹上冲心者，灸其核上各一壮^[5]，与桂枝加桂汤，更加桂二两也。方六十一。

桂枝五两，去皮 芍药三两 生姜三两，切 甘草二两，炙 大枣十二枚，擘

上五味，以水七升，煮取三升，去滓。温服一升。本云桂枝汤，今加桂满五两。所以加桂者，以能泄奔豚气也。

[1] 清血：即便血。

[2] 追虚逐实：追虚是损伤已经不足的正气；逐实是增加已经有余的病邪。指出阴虚邪盛的病人误用火法的危害性。

[3] 痹：这里作麻痹解。

[4] 火逆：误用火法治病而引起的一切变证，统称火逆。

[5] 一壮：即一个艾团。

118. 火逆下之，因烧针烦躁者，桂枝甘草龙骨牡蛎汤主之。方六十一。

桂枝一两，去皮 甘草二两，炙 牡蛎二两，熬
龙骨二两

上四味，以水五升，煮取二升半，去滓。温服八合，日三服。

119. 太阳伤寒者，加温针^[1]必惊也。

120. 太阳病，当恶寒，发热，今自汗出，反不恶寒发热，关上脉细数者，以医吐之过也。一二日吐之者，腹中饥，口不能食。三四日吐之者，不喜糜粥^[2]，欲食冷食，朝食暮吐，以医吐之所致也，此为小逆。

121. 太阳病吐之，但太阳病当恶寒，今反不恶寒，不欲近衣，此为吐之内烦也。

122. 病人脉数，数为热，当消谷引食，而反吐者，此以发汗，令阳气微，膈气虚，脉乃数也。数为客热，不能消谷，以胃中虚冷，故吐也。

123. 太阳病，过经十余日，心下温温^[3]欲吐而胸中痛，大便反溱，腹微满，郁郁微烦，先此时自极吐下

[1] 温针：即烧针。

[2] 糜粥：稀糊的粥。

[3] 温温：形容心中泛泛，欲吐不吐。

者，与调胃承气汤。若不尔^[1]者，不可与。但欲呕，胸中痛，微溏者，此非柴胡汤证，以呕故知极吐下也。调胃承气汤。方六十三。用前第三十三方。

124. 太阳病六七日，表证仍在，脉微而沉，反不结胸，其人发狂者，以热在下焦，少腹当硬满，小便自利者，下血乃愈。所以然者，以太阳随经，瘀热^[2]在里故也。抵当汤主之。方六十四。

水蛭熬 虻虫去翅足，熬，各三十个 桃仁二十个，去皮尖 大黄三两，酒洗

上四味，以水五升，煮取三升，去滓。温服一升，不下更服。

125. 太阳病，身黄，脉沉结，少腹硬，小便不利者，为无血也。小便自利，其人如狂者，血证谛^[3]也。抵当汤主之。方六十五。用前方。

126. 伤寒有热，少腹满，应小便不利，今反利者，为有血也，当下之，不可余药，宜抵当丸。方六十六。

水蛭二十个，熬 虻虫二十个，去翅足，熬 桃仁二十五个，去皮尖 大黄三两

上四味，捣分四丸，以水一升，煮一丸。取七

[1] 不尔：不是这样。

[2] 瘀热：邪热郁积。

[3] 谛[dì]：真实无误。

合服之。晬时^[1]当下血，若不下者，更服。

127. 太阳病，小便利者，以饮水多，必心下悸。小便少者，必苦里急也。

辨太阳病脉证并治(下)

128. 问曰：病有结胸^[2]，有藏结，其状何如？答曰：按之痛，寸脉浮，关脉沉，名曰结胸也。

129. 何谓藏结？答曰：如结胸状，饮食如故，时时下利，寸脉浮，关脉小细沉紧，名曰藏结。舌上白苔滑者，难治。

130. 藏结无阳证，不往来寒热，一云寒而不热其人反静，舌上苔滑者，不可攻也。

131. 病发于阳，而反下之，热入因作结胸；病发于阴，而反下之，一作汗出因作痞也。所以成结胸者，以下之太早故也。结胸者，项亦强，如柔痉^[3]状，下之则和，宜大陷胸丸。方一。

大黄半斤 葶苈子半升，熬 芒硝半升 杏仁半

[1] 晬时：即一昼夜。

[2] 结胸：证候名。主症为心下痛，按之石硬等。

[3] 柔痉：证候名。见《金匱要略·痉湿喝病脉证第二》。主症为颈项强急，角弓反张，发热汗出等。

升，去皮尖，熬黑

上四味，捣筛二味，纳杏仁、芒硝，合研如脂，和散。取如弹丸一枚，别捣甘遂末一钱匕，白蜜二合，水二升，煮取一升。温顿服之，一宿乃下。如不下，更服，取下为效。禁如药法。

132. 结胸证，其脉浮大者，不可下，下之则死。

133. 结胸证悉具，烦躁者亦死。

134. 太阳病，脉浮而动数，浮则为风，数则为热，动则为痛，数则为虚。头痛，发热，微盗汗出，而反恶寒者，表未解也。医反下之，动数变迟，膈内拒痛，一云头痛即眩胃中空虚，客气^[1]动膈，短气躁烦，心中懊恼，阳气内陷，心下因硬，则为结胸。大陷胸汤主之。若不结胸，但头汗出，余处无汗，剂颈而还，小便不利，身必发黄。大陷胸汤。方二。

大黄六两，去皮 芒硝一升 甘遂一钱匕

上三味，以水六升，先煮大黄，取二升，去滓，纳芒硝，煮一两沸，纳甘遂末。温服一升。得快利，止后服。

135. 伤寒六七日，结胸热实，脉沉而紧，心下痛，按之石硬者，大陷胸汤主之。方三。用前第二方。

[1] 客气：指外来的邪气。

136. 伤寒十余日，热结在里，复往来寒热者，与大柴胡汤。但结胸，无大热者，此为水结在胸胁也。但头微汗出者，大陷胸汤主之。方四。用前第二方。

大柴胡汤方

柴胡半斤 枳实四枚，炙 生姜五两，切 黄芩三两 芍药三两 半夏半升，洗 大枣十二枚，擘

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎。温服一升，日三服。一方加大黄二两，若不加，恐不名大柴胡汤。

137. 太阳病，重发汗而复下之，不大便五六日，舌上燥而渴，日晡所小有潮热，一云日晡所发心胸大烦从心下至少腹硬满而痛不可近者，大陷胸汤主之。方五。用前第二方。

138. 小结胸病，正在心下，按之则痛，脉浮滑者，小陷胸汤主之。方六。

黄连一两 半夏半升，洗 栝楼实大者一枚

上三味，以水六升，先煮栝楼，取三升，去滓，纳诸药，煮取二升，去滓。分温三服。

139. 太阳病，二三日，不能卧，但欲起，心下必结，脉微弱者，此本有寒分^[1]也。反下之，若利止，必作结

[1] 寒分：这里指寒饮。

胸。未止者，四日复下之，此作协热利^[1]也。

140. 太阳病，下之，其脉促，一作纵不结胸者，此为欲解也；脉浮者，必结胸；脉紧者，必咽痛；脉弦者，必两胁拘急；脉细数者，头痛未止；脉沉紧者，必欲呕；脉沉滑者，协热利；脉浮滑者，必下血。

141. 病在阳，应以汗解之。反以冷水渍^[2]之，若灌^[3]之，其热被劫不得去，弥更^[4]益烦，肉上粟起，意欲饮水，反不渴者，服文蛤散。若不差者，与五苓散。寒实结胸，无热证者，与三物小陷胸汤，用前第六方白散亦可服。方七。一云与三物小白散。

文蛤散方

文蛤五两

上一味为散，以沸汤和一方寸匕服，汤用五合。

五苓散方

猪苓十八铢，去黑皮 白朮十八铢 泽泻一两六铢
茯苓十八铢 桂枝半两，去皮

上五味为散，更于臼中杵之。白饮和方寸匕

[1] 协热利：挟表而下利。

[2] 渍[sūn]：喷出。用冷水喷洒病人，是古代一种退热的方法。

[3] 灌：浇洗。用冷水洗身，也是古代一种退热的方法。

[4] 弥更：更加。

服之，日三服。多饮暖水，汗出愈。

白散方

桔梗三分 巴豆一分，去皮心，熬黑，研如脂 贝母

三分

上三味为散，纳巴豆，更于臼中杵之。以白饮和服，强人半钱匕，羸者减之。病在膈上必吐，在膈下必利，不利，进热粥一杯，利过不止，进冷粥一杯。身热，皮粟不解，欲引衣自覆，若以水渍之、洗之，益令热劫不得出，当汗而不汗则烦。假令汗出已，腹中痛，与芍药三两如上法。

142. 太阳与少阳并病，头项强痛，或眩冒，时如结胸，心下痞硬者，当刺大椎^[1]第一间、肺俞^[2]、肝俞^[3]，慎不可发汗。发汗则谵语，脉弦，五日谵语不止，当刺期门。方八。

143. 妇人中风，发热恶寒，经水适来，得之七八日，热除而脉迟，身凉，胸胁下满，如结胸状，谵语者，此为热入血室也。当刺期门，随其实而取之。方九。

144. 妇人中风，七八日续得寒热，发作有时，经水

[1] 大椎：穴位名。在第七颈椎和第一胸椎之间。

[2] 肺俞：穴位名。在第三、四胸椎间，各旁开一寸五分。

[3] 肝俞：穴位名。在第九、十胸椎间，各旁开一寸五分。

适断者，此为热入血室^[1]。其血必结，故使如疟状，发作有时，小柴胡汤主之。方十。

柴胡半斤 黄芩三两 人参三两 半夏半升，洗
甘草三两 生姜三两，切 大枣十二枚，擘 三

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升。温服一升，日三服。

145. 妇人伤寒，发热，经水适来，昼日明了，暮则谵语，如见鬼状者^[2]，此为热入血室。无犯胃气及上二焦，必自愈。方十一。

146. 伤寒六七日，发热，微恶寒，支节^[3]烦疼，微呕，心下支结^[4]，外证未去者，柴胡桂枝汤主之。方十二。

桂枝去皮 黄芩一两半 人参一两半 甘草一两，炙
半夏二合半，洗 芍药一两半 大枣六枚，擘 生姜一两半，切 柴胡四两

上九味，以水七升，煮取三升，去滓。温服一升。本云人参汤，作如桂枝法，加半夏、柴胡、黄芩，复如柴胡法。今用人参作半剂。

[1] 血室：即子宫。

[2] 如见鬼状者：指出现精神症状。

[3] 支节：四肢关节。

[4] 心下支结：心下胀闷。

147. 伤寒五六日，已发汗而复下之，胸胁满微结，小便不利，渴而不呕，但头汗出，往来寒热，心烦者，此为未解也。柴胡桂枝干姜汤主之。方十三。

柴胡半斤 桂枝三两，去皮 干姜二两 栝楼根
四两 黄芩三两 牡蛎二两，熬 甘草二两，炙

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升。温服一升，日三服。初服微烦，复服汗出便愈。

148. 伤寒五六日，头汗出，微恶寒，手足冷，心下满，口不欲食，大便硬，脉细者，此为阳微结。必有表，复有里也。脉沉，亦在里也。汗出为阳微。假令纯阴结，不得复有外证，悉入在里，此为半在里半在外也。脉虽沉紧，不得为少阴病。所以然者，阴不得有汗，今头汗出，故知非少阴也，可与小柴胡汤。设不了了者，得屎而解。方十四。用前第十方。

149. 伤寒五六日，呕而发热者，柴胡汤证具，而以他药下之，柴胡证仍在者，复与柴胡汤。此虽已下之，不为逆，必蒸蒸而振，却发热汗出而解。若心下满而硬痛者，此为结胸也。大陷胸汤主之。但满而不痛者，此为痞，柴胡不中与之，宜半夏泻心汤。方十五。

半夏半升，洗 黄芩 干姜 人参 甘草炙，各
三两 黄连一两 大枣十二枚，擘

右七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升。温服一升，日三服。须大陷胸汤者，方用前第二法。一方用半夏一升

150. 太阳、少阳并病，而反下之，成结胸，心下硬，下利不止，水浆不下，其人心烦。

151. 脉浮而紧，而复下之，紧反入里，则作痞。按之自濡，但气痞耳。

152. 太阳中风，下利，呕逆，表解者，乃可攻之。其人藪藪汗出，发作有时，头痛，心下痞硬满，引胁下痛，干呕，短气，汗出不恶寒者，此表解里未和也。十枣汤主之。方十六。

芫花熬 甘遂 大戟

上三味，等分，各别捣为散。以水一升半，先煮大枣肥者十枚，取八合，去滓，纳药末。强人服一钱匕，羸人服半钱，温服之，平旦服。若下少病不除者，明日更服，加半钱，得快下利后，糜粥自养。

153. 太阳病，医发汗，遂发热、恶寒，因复下之，心下痞。表里俱虚，阴阳气并竭，无阳则阴独，复加烧针，因胸烦，面色青黄，肤瞤者，难治。今色微黄，手足温者，易愈。

154. 心下痞，按之濡，其脉关上浮者，大黄黄连泻

心汤主之。方十七。

大黄二两 黄连一两

上二味，以麻沸汤^[1]二升渍之，须臾绞去滓。

分温再服。臣亿等看详大黄黄连泻心汤，诸本皆二味。又后附子泻心汤，用大黄、黄连、黄芩、附子，恐是前方中亦有黄芩，后但加附子也。故后云附子泻心汤，本云加附子也。

155. 心下痞，而复恶寒、汗出者，附子泻心汤主之。方十八。

大黄二两 黄连一两 黄芩一两 附子一枚，炮，

去皮，破，别煮取汁

上四味，切三味，以麻沸汤二升渍之，须臾绞去滓，纳附子汁。分温再服。

156. 本以下之，故心下痞，与泻心汤，痞不解，其人渴而口燥烦，小便不利者，五苓散主之。方十九。一方云忍之一日乃愈。用前第七证方。

157. 伤寒汗出解之后，胃中不和，心下痞硬，干噫^[2]食臭，胁下有水气，腹中雷鸣^[3]，下利者，生姜泻心汤主之。方二十。

生姜四两，切 甘草三两，炙 人参三两 干姜

[1] 麻沸汤：即开水。水沸时，水面气泡密密麻麻翻滚，故名。

[2] 干噫：噫[ài]，即嗳气。

[3] 腹中雷鸣：肠鸣。

一两 黄芩三两 半夏半升，洗 黄连一两 大枣十二枚，擘

上八味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升。温服一升，日三服。附子泻心汤，本云加附子。半夏泻心汤，甘草泻心汤，同体别名耳。生姜泻心汤，本云理中人参黄芩汤，去桂枝、术，加黄连，并泻肝法。

158. 伤寒中风，医反下之，其人下利，日数十行，谷不化，腹中雷鸣，心下痞硬而满，干呕，心烦不得安。医见心下痞，谓病不尽，复下之，其痞益甚。此非结热，但以胃中虚，客气上逆，故使硬也。甘草泻心汤主之。方二十一。

甘草四两，炙 黄芩三两 干姜三两 半夏半升，洗 大枣十二枚，擘 黄连一两

上六味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升。温服一升，日三服。臣亿等谨按：上生姜泻心汤法，本云理中人参黄芩汤，今详泻心以疗痞。痞气因发阴而生，是半夏、生姜、甘草泻心三方，皆本于理中也。其方必各有人参，今甘草泻心汤中无者，脱落之也。又按《千金》并《外台秘要》治伤寒蠱食，用此方，皆有人参，知脱落无疑。

159. 伤寒服汤药，下利不止，心下痞硬，服泻心汤已，复以他药下之，利不止，医以理中与之，利益甚。理

中者，理中焦，此利在下焦，赤石脂禹余粮汤主之。复不止者，当利其小便。赤石脂禹余粮汤。方二十二。

赤石脂一斤，碎 太一禹余粮一斤，碎

上二味，以水六升，煮取二升，去滓。分温三服。

160. 伤寒吐下后，发汗，虚烦，脉甚微，八九日心下痞硬，胁下痛，气上冲咽喉，眩冒，经脉动惕者，久而成痿。

161. 伤寒发汗，若吐，若下，解后，心下痞硬，噫气^[1]不除者，旋复代赭汤主之。方二十三。

旋复花三两 人参二两 生姜五两 代赭一两
甘草三两，炙 半夏半升，洗 大枣十二枚，擘

上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升。温服一升，日三服。

162. 下后，不可更行桂枝汤，若汗出而喘，无大热者，可与麻黄杏子甘草石膏汤。方二十四。

麻黄四两 杏仁五十个，去皮尖 甘草二两，炙
石膏半斤，碎，绵裹

上四味，以水七升，先煮麻黄，减二升，去白沫，纳诸药，煮取三升，去滓。温服一升。本云黄

[1] 噫气：即暖气。

耳杯。

163. 太阳病，外证未除而数下之，遂协热而利，利下不止，心下痞硬，表里不解者，桂枝人参汤主之。方二十五。

桂枝四两，别切 甘草四两，炙 白朮三两 人参三两 干姜三两

上五味，以水九升，先煮四味，取五升，纳桂，更煮取三升，去滓。温服一升，日再夜一服。

164. 伤寒大下后，复发汗，心下痞，恶寒者，表未解也。不可攻痞，当先解表，表解乃可攻痞。解表宜桂枝汤，攻痞宜大黄黄连泻心汤。方二十六。泻心汤用前第十七方。

165. 伤寒发热，汗出不解，心中痞硬，呕吐而下利者，大柴胡汤主之。方二十七。用前第四方。

166. 病如桂枝证，头不痛，项不强，寸脉微浮，胸中痞硬，气上冲咽喉不得息^[1]者，此为胸有寒也。当吐之，宜瓜蒂散。方二十八。

瓜蒂一分，熬黄 赤小豆一分

上二味，各别捣筛，为散已，合治之，取一钱匕，以香豉一合，用热汤七合，煮作稀糜，去滓，取

[1] 不得息：形容呼吸困难。

汁和散。温顿服之。不吐者，少少加，得快吐乃止。诸亡血、虚家，不可与瓜蒂散。

167. 病胁下素有痞，连在脐傍，痛引少腹，入阴筋者，此名藏结。死。方二十九。

168. 伤寒若吐，若下后，七八日不解，热结在里，表里俱热，时时恶风，大渴，舌上干燥而烦，欲饮水数升者，白虎加人参汤主之。方三十。

知母六两 石膏一斤，碎 甘草二两，炙 人参二两 粳米六合

上五味，以水一斗，煮米熟，汤成，去滓。温服一升，日三服。此方立夏后、立秋前乃可服，立秋后不可服。正月、二月、三月尚凛冷，亦不可与服之，与之则呕利而腹痛。诸亡血、虚家，亦不可与，得之则腹痛、利者，但可温之，当愈。

169. 伤寒无大热，口燥渴，心烦，背微恶寒者，白虎加人参汤主之。方三十一。用前方。

170. 伤寒脉浮，发热，无汗，其表不解，不可与白虎汤。渴欲饮水，无表证者，白虎加人参汤主之。方三十二。用前方。

171. 太阳、少阳并病，心下硬，颈项强而眩者，当刺大椎、肺俞、肝俞，慎勿下之。方三十三。

172. 太阳与少阳合病，自下利者，与黄芩汤。若

呕者，黄芩加半夏生姜汤主之。方三十四。

黄芩汤方

黄芩三两 芍药二两 甘草二两，炙 大枣十二

枚，擘

上四味，以水一斗，煮取三升，去滓。温服一升，日再夜一服。

黄芩加半夏生姜汤方

黄芩三两 芍药二两 甘草二两，炙 大枣十二枚，擘 半夏半升，洗 生姜一两半，一方三两，切

上六味，以水一斗，煮取三升，去滓。温服一升，日再夜一服。

173. 伤寒，胸中有热，胃中有邪气，腹中痛，欲呕吐者，黄连汤主之。方三十五。

黄连三两 甘草三两，炙 干姜三两 桂枝三两，去皮 人参二两 半夏半升，洗 大枣十二枚，擘

上七味，以水一斗，煮取六升，去滓。温服，昼三夜二。疑非仲景方。

174. 伤寒八九日，风湿相搏，身体疼烦^[1]，不能自转侧，不呕，不渴，脉浮虚而涩者，桂枝附子汤主之。若其人大便硬，一云脐下心下硬小便自利者，去桂加白朮汤

[1] 疼烦：因疼而烦。

主之。方三十六。

桂枝附子汤方

桂枝四两，去皮 附子三枚，炮，去皮，破 生姜三
两，切 大枣十二枚，擘 甘草二两，炙

上五味，以水六升，煮取二升，去滓。分温三服。

去桂加白朮汤方

附子三枚，炮，去皮，破 白朮四两 生姜三两，切
甘草二两，炙 大枣十二枚，擘

上五味，以水六升，煮取二升，去滓。分温三服。初一服，其人身如痹，半日许复服之，三服都尽，其人如冒状，勿怪。此以附子、朮，并走皮内，逐水气未得除，故使之耳。法当加桂四两。此本一方二法，以大便硬，小便自利，去桂也。以大便不硬，小便不利，当加桂。附子三枚恐多也，虚弱家及产妇，宜减服之。

175. 风湿相搏，骨节疼烦，掣痛^[1]不得屈伸，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿者，甘草附子汤主之。方三十七。

甘草二两，炙 附子二枚，炮，去皮，破 白朮二两

[1] 掣痛：牵动肢体时患处疼痛。

桂枝四两，去皮

上四味，以水六升，煮取三升，去滓。温服一升，日三服。初服得微汗则解。能食，汗止复烦者，将服五合。恐一升多者，宜服六七合为始。

176. 伤寒脉浮滑，此以表有热，里有寒，白虎汤主之。方三十八。

知母六两 石膏一斤，碎 甘草二两，炙 粳米六合

上四味，以水一斗，煮米熟，汤成，去滓。温服一升，日三服。臣亿等谨按：前篇云热结在里，表里俱热者，白虎汤主之，又云其表不解，不可与白虎汤。此云脉浮滑，表有热，里有寒者，必表里字差矣。又阳明一证云脉浮迟，表热里寒，四逆汤主之。又少阴一证云里寒外热，通脉四逆汤主之。以此表里自差明矣。《千金翼》云白通汤。非也。

177. 伤寒脉结代，心动悸，炙甘草汤主之。方三十九。

甘草四两，炙 生姜三两，切 人参二两 生地黄一斤 桂枝三两，去皮 阿胶二两 麦门冬半升，去心 麻仁半升 大枣三十枚，擘

上九味，以清酒七升，水八升，先煮八味，取三升，去滓，纳胶烊消尽。温服一升，日三服。一名复脉汤。

178. 脉按之来缓，时一止复来者，名曰结；又脉来动而中止，更来小数，中有还者反动，名曰结，阴也。脉来动而中止，不能自还，因而复动者，名曰代，阴也。得此脉者必难治。

辨阳明病脉证并治

179. 问曰：病有太阳阳明，有正阳阳明，有少阳阳明，何谓也？答曰：太阳阳明者，脾约^[1]一云络是也；正阳阳明者，胃家实是也；少阳阳明者，发汗、利小便已，胃中燥、烦、实、大便难是也。

180. 阳明之为病，胃家实一作寒是也。

181. 问曰：何缘得阳明病？答曰：太阳病，若发汗，若下，若利小便，此亡津液，胃中干燥，因转属阳明。不更衣^[2]，内实大便难者，此名阳明也。

182. 问曰：阳明病外证云何？答曰：身热，汗自出，不恶寒反恶热也。

183. 问曰：病有得之一日，不发热而恶寒者，何也？答曰：虽得之一日，恶寒将自罢，即自汗出而恶热也。

[1] 脾约：证候名。脾胃津液减少而引起的便秘。

[2] 更衣：即大便。古人登厕，称更衣。

184. 问曰：恶寒何故自罢？答曰：阳明居中，主土也，万物所归，无所复传。始虽恶寒，二日自止，此为阳明病也。

185. 本太阳，初得病时，发其汗，汗先出不彻，因转属阳明也。伤寒发热，无汗，呕不能食，而反汗出濇濇^[1]然者，是转属阳明也。

186. 伤寒三日，阳明脉大。

187. 伤寒脉浮而缓，手足自温者，是为系在太阴。太阴者，身当发黄，若小便自利者，不能发黄。至七八日，大便硬者，为阳明病也。

188. 伤寒转系阳明者，其人濇然微汗出也。

189. 阳明中风，口苦，咽干，腹满，微喘，发热，恶寒，脉浮而紧。若下之，则腹满小便难也。

190. 阳明病，若能食，名中风；不能食，名中寒。

191. 阳明病，若中寒者，不能食，小便不利，手足濇然汗出，此欲作固瘕^[2]，必大便初鞭后溏。所以然者，以胃中冷，水谷不别故也。

192. 阳明病，初欲食，小便反不利，大便自调，其人骨节疼，翕翕如有热状，奄然^[3]发狂，濇然汗出而解

[1] 濇濇[jí jí]：水流貌，这里形容汗多。

[2] 固瘕：瘕[jiǎ]，固瘕，指肠胃虚寒的久泻。

[3] 奄然：忽然。

者，此水不胜谷气，与汗共并，脉紧则愈。

193. 阳明病欲解时，从申至戌上。

194. 阳明病，不能食，攻其热必嘔，所以然者，胃中虚冷故也。以其人本虚，攻其热必嘔。

195. 阳明病，脉迟，食难用饱，饱则微烦头眩，必小便难，此欲作谷瘵^[1]。虽下之，腹满如故，所以然者，脉迟故也。

196. 阳明病，法多汗，反无汗，其身如虫行皮中状者，此以久虚故也。

197. 阳明病，反无汗而小便利，二三日呕而咳，手足厥者，必苦头痛。若不咳、不呕、手足不厥者，头不痛。一云冬阳明

198. 阳明病，但头眩，不恶寒，故能食而咳，其人咽必痛。若不咳者，咽不痛。一云冬阳明

199. 阳明病，无汗，小便不利，心中懊恼者，身必发黄。

200. 阳明病，被火，额上微汗出，而小便不利者，必发黄。

201. 阳明病，脉浮而紧者，必潮热发作有时。但浮者，必盗汗出。

[1] 谷瘵：病名。是黄疸的一种。

202. 阳明病，口燥但欲漱水，不欲咽者，此必衄。

203. 阳明病，本自汗出，医更重发汗，病已差，尚微烦不了了者，此必大便硬故也。以亡津液，胃中干燥，故令大便硬。当问其小便日几行，若本小便日三四行，今日再行，故知大便不久出。今为小便数少，以津液当还入胃中，故知不久必大便也。

204. 伤寒呕多，虽有阳明证，不可攻之。

205. 阳明病，心下硬满者，不可攻之。攻之，利遂不止者死，利止者愈。

206. 阳明病，面合色赤^[1]，不可攻之。必发热，色黄者，小便不利也。

207. 阳明病，不吐，不下，心烦者，可与调胃承气汤。方一。

甘草二两，炙 芒硝半升 大黄四两，清酒洗

上三味，切，以水三升，煮二物至一升，去滓，纳芒硝，更上微火一二沸。温顿服之，以调胃气。

208. 阳明病，脉迟，虽汗出不恶寒者，其身必重，短气，腹满而喘，有潮热者，此外欲解，可攻里也。手足濇然汗出者，此大便已硬也。大承气汤主之。若汗多，微发热恶寒者，外未解也。一法与桂枝汤其热不潮，未可

[1] 面合色赤：满面通红。

与承气汤。若腹大满不通者，可与小承气汤，微和胃气，勿令至大泄下。大承气汤。方二。

大黄四两，酒洗 厚朴半斤，炙，去皮 枳实五枚，炙
芒硝三合

上四味，以水一斗，先煮二物，取五升，去滓，纳大黄，更煮取二升，去滓，纳芒硝，更上微火一两沸。分温再服。得下，余勿服。

小承气汤方

大黄四两，酒洗 厚朴二两，炙，去皮 枳实三枚，大者，炙

上三味，以水四升，煮取一升二合，去滓。分温二服。初服汤当更衣，不尔者尽饮之。若更衣者，勿服之。

209. 阳明病，潮热，大便微硬者，可与大承气汤，不硬者，不可与之。若不大便六七日，恐有燥屎，欲知之法，少与小承气汤，汤入腹中，转失气^[1]者，此有燥屎也，乃可攻之。若不转失气者，此但初头鞭，后必溏，不可攻之，攻之必胀满不能食也。欲饮水者，与水则哕。其后发热者，必大便复硬而少也，以小承气汤和之。不转失气者，慎不可攻也。小承气汤。方三。用前第二方。

[1] 失气：亦称矢气，俗称放屁。

210. 夫实则谵语，虚则郑声^[1]。郑声者，重语也。直视，谵语，喘满者死，下利者亦死。

211. 发汗多，若重发汗者，亡其阳，谵语，脉短者死；脉自和者不死。

212. 伤寒若吐、若下后不解，不大便五六日，上至十余日，日晡所发潮热，不恶寒，独语如见鬼状。若剧者，发则不识人，循衣摸床^[2]，惕而不安，一云顺衣妄撮怵惕不安微喘直视，脉弦者生，涩者死。微者，但发热谵语者，大承气汤主之。若一服利，则止后服。方四。用前第二方。

213. 阳明病，其人多汗，以津液外出，胃中燥，大便必鞕，鞕则谵语，小承气汤主之。若一服谵语止者，更莫复服。方五。用前第二方。

214. 阳明病，谵语，发潮热，脉滑而疾者，小承气汤主之。因与承气汤一升，腹中转气者，更服一升，若不转气者，勿更与之。明日又不大便，脉反微涩者，里虚也。为难治，不可更与承气汤也。方六。用前第二方。

215. 阳明病，谵语，有潮热，反不能食者，胃中必有燥屎五六枚也。若能食者，但硬耳。宜大承气汤下之。方七。用前第二方。

[1] 郑声：言语重复，语声低微，属虚证。

[2] 循衣摸床：即捻衣摸床。见 111 条注。

216. 阳明病，下血、谵语者，此为热入血室。但头汗出者，刺期门，随其实而泻之，漉然汗出则愈。

217. 汗^{汗一作卧}出谵语者，以有燥屎在胃中，此为风也。须下者，过经乃可下之。下之若早，语言必乱，以表虚里实故也。下之愈，宜大承气汤。方八。用前第二方，一云大柴胡汤。

218. 伤寒四五日，脉沉而喘满，沉为在里，而反发其汗，津液越出，大便为难，表虚里实，久则谵语。

219. 三阳合病，腹满，身重，难以转侧，口不仁^[1]，面垢，又作枯，一云向经谵语，遗尿。发汗则谵语。下之则额上生汗，手足逆冷。若自汗出者，白虎汤主之。方九。

知母六两 石膏一斤，碎 甘草二两，炙 粳米

六合

上四味，以水一斗，煮米熟，汤成，去滓。温服一升，日三服。

220. 二阳并病，太阳证罢，但发潮热，手足絷絷汗出，大便难而谵语者，下之则愈，宜大承气汤。方十。用前第二方。

221. 阳明病，脉浮而紧，咽燥，口苦，腹满而喘，发热汗出，不恶寒反恶热，身重。若发汗则躁，心愤愤^[2]，

[1] 口不仁：舌燥，食不知味，言语不利。

[2] 愤愤[kuī 溃]：心乱貌，这里指神识不清。

公对切反谮语。若加温针，必怵惕^[1]，烦躁不得眠。若下之，则胃中空虚，客气动膈，心中懊悵，舌上苔者，梔子豉汤主之。方十一。

肥梔子十四枚，擘 香豉四合，绵裹

上二味，以水四升，煮梔子取二升半，去滓，纳豉，更煮取一升半，去滓。分二服，温进一服。得快吐者，止后服。

222. 若渴欲饮水，口干舌燥者，白虎加人参汤主之。方十二。

知母六两 石膏一斤，碎 甘草二两，炙 粳米六合 人参三两

上五味，以水一斗，煮米熟，汤成，去滓。温服一升，日三服。

223. 若脉浮，发热，渴欲饮水，小便不利者，猪苓汤主之。方十三。

猪苓去皮 茯苓 泽泻 阿胶 滑石碎，各一两

上五味，以水四升，先煮四味，取二升，去滓，纳阿胶烊消。温服七合，日三服。

224. 阳明病，汗出多而渴者，不可与猪苓汤，以汗多胃中燥，猪苓汤复利其小便故也。

[1] 怵惕[chù tì触替]：形容恐惧惊慌。

225. 脉浮而迟，表热里寒，下利清谷者，四逆汤主之。方十四。

甘草二两，炙 干姜一两半 附子一枚，生用，去皮，
破八片

上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓。分温二服。强人可大附子一枚，干姜三两。

226. 若胃中虚冷，不能食者，饮水则哕。

227. 脉浮，发热，口干，鼻燥，能食者则衄。

228. 阳明病，下之，其外有热，手足温，不结胸，心中懊恼，饥不能食，但头汗出者，梔子豉汤主之。方十五。用前第十一方。

229. 阳明病，发潮热，大便溏，小便自可，胸胁满不去者，与小柴胡汤。方十六。

柴胡半斤 黄芩三两 人参三两 半夏半升，洗
甘草三两，炙 生姜三两，切 大枣十二枚，擘

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升。温服一升，日三服。

230. 阳明病，胁下硬满，不大便而呕，舌上白苔者，可与小柴胡汤。上焦得通，津液得下，胃气因和，身濈然汗出而解。方十七。用上方。

231. 阳明中风，脉弦浮大而短气，腹都满，胁下及心痛，久按之气不通，鼻干，不得汗，嗜卧，一身及目悉

黄，小便难，有潮热，时时嘔，耳前后肿，刺之小差。外不解，病过十日，脉续浮者，与小柴胡汤。方十八。用上方。

232. 脉但浮，无余证者，与麻黄汤。若不尿，腹满加嘔者，不治。麻黄汤。方十九。

麻黄三两，去节 桂枝二两，去皮 甘草一两，炙
杏仁七十个，去皮尖

上四味，以水九升，煮麻黄减二升，去白沫，纳诸药，煮取二升半，去滓。温服八合。覆取微似汗。

233. 阳明病，自汗出，若发汗，小便自利者，此为津液内竭，虽硬不可攻之，当须自欲大便，宜蜜煎导而通之。若土瓜根及大猪胆汁，皆可为导。方二十。蜜煎导方。

食蜜七合

上一味，于铜器内，微火煎，当须凝如饴状，搅之勿令焦著，欲可丸，并手捻作挺，令头锐，大如指，长二寸许。当热时急作，冷则硬。以纳谷道中，以手急抱，欲大便时乃去之。疑非仲景意，已试甚良。

又大猪胆一枚，泻汁，和少许法醋，以灌谷道内，如一食顷，当大便出宿食恶物，甚效。

234. 阳明病，脉迟，汗出多，微恶寒者，表未解也。可发汗，宜桂枝汤。方二十一。

桂枝三两，去皮 芍药三两 生姜三两 甘草二两，炙 大枣十二枚，擘

上五味，以水七升，煮取三升，去滓。温服一升。须臾，啜热稀粥一升，以助药力取汗。

235. 阳明病，脉浮，无汗而喘者，发汗则愈，宜麻黄汤。方二十二。用前第十九方。

236. 阳明病，发热，汗出者，此为热越，不能发黄也。但头汗出，身无汗，剂颈而还，小便不利，渴引水浆者，此为瘀热在里，身必发黄，茵陈蒿汤主之。方二十三。

茵陈蒿六两 梔子十四枚，擘 大黄二两，去皮

上三味，以水一斗二升，先煮茵陈，减六升，纳二味，煮取三升，去滓。分三服。小便利，尿如皂荚汁状，色正赤，一宿腹减，黄从小便去也。

237. 阳明证，其人喜忘^[1]者，必有蓄血^[2]。所以然者，本有久瘀血，故令喜忘。屎虽硬，大便反易，其色必黑者，宜抵当汤下之。方二十四。

水蛭熬 虻虫去翅足，熬，各三十个 大黄三两，酒洗 桃仁二十个，去皮尖及两仁者

上四味，以水五升，煮取三升，去滓。温服一

[1] 喜忘：经常忘记，这里是指一种精神症状。

[2] 蓄血：指内有瘀血停积。

升，不下更服。

238. 阳明病，下之，心中懊憹而烦，胃中有燥屎者，可攻。腹微满，初头硬，后必溏，不可攻之。若有燥屎者，宜大承气汤。方二十五。用前第二方。

239. 病人不大便五六日，绕脐痛，烦躁，发作有时者，此有燥屎，故使不大便也。

240. 病人烦热，汗出则解，又如疟状，日晡所发热者，属阳明也。脉实者，宜下之；脉浮虚者，宜发汗。下之与大承气汤；发汗宜桂枝汤。方二十六。大承气汤用前第二方，桂枝汤用前第二十一方。

241. 大下后，六七日不大便，烦不解，腹满痛者，此有燥屎也。所以然者，本有宿食故也，宜大承气汤。方二十七。用前第二方。

242. 病人小便不利，大便乍难乍易，时有微热，喘冒^[1]一作息不能卧者，有燥屎也。宜大承气汤。方二十八。用前第二方。

243. 食谷欲呕，属阳明也。吴茱萸汤主之。得汤反剧者，属上焦也。吴茱萸汤。方二十九。

吴茱萸一升，洗 人参三两 生姜六两，切 大枣十二枚，擘

[1] 喘冒：呼吸气粗，时时昏冒。

上四味，以水七升，煮取二升，去滓。温服七合，日三服。

244. 太阳病，寸缓，关浮，尺弱，其人发热汗出，复恶寒，不呕，但心下痞者，此以医下之也。如其不下者，病人不恶寒而渴者，此转属阳明也。小便数者，大便必硬，不更衣十日，无所苦也。渴欲饮水，少少与之，但以法救之。渴者，宜五苓散。方三十。

猪苓去皮 白朮 茯苓各十八铢 泽泻一两六铢
桂枝半两，去皮

上五味，为散，白饮和服方寸匕，日三服。

245. 脉阳微而汗出少者，为自和一作如也。汗出多者，为太过。阳脉实，因发其汗，出多者，亦为太过。太过者，为阳绝于里，亡津液，大便因硬也。

246. 脉浮而芤，浮为阳，芤为阴，浮芤相搏，胃气生热，其阳则绝。

247. 趺阳脉^[1]浮而涩，浮则胃气强，涩则小便数，浮涩相搏，大便则硬，其脾为约，麻子仁丸主之。方三十一。

麻子仁二升 芍药半斤 枳实半斤，炙 大黄一斤，去皮 厚朴一尺，炙，去皮 杏仁一升，去皮尖，熬，别作脂

[1] 趺阳脉：即足背动脉。在足背第二、三趾骨间。属足阳明胃经。

上六味，蜜和丸如梧桐子大。饮服十丸，日三服，渐加，以知为度。

248. 太阳病三日，发汗不解，蒸蒸发热者，属胃也。调胃承气汤主之。方三十二。用前第一方。

249. 伤寒吐后，腹胀满者，与调胃承气汤。方三十三。用前第一方。

250. 太阳病，若吐，若下，若发汗后，微烦，小便数，大便因硬者，与小承气汤，和之愈。方三十四。用前第二方。

251. 得病二三日，脉弱，无太阳、柴胡证，烦躁，心下硬，至四五日，虽能食，以小承气汤，少少与，微和之，令小安。至六日，与承气汤一升。若不大便六七日，小便少者，虽不受食，一云不大便但初头硬，后必溏，未定成硬，攻之必溏，须小便利，屎定硬，乃可攻之。宜大承气汤。方三十五。用前第二方。

252. 伤寒六七日，目中不了了^[1]，睛不和^[2]，无表里证，大便难，身微热者，此为实也。急下之，宜大承气汤。方三十六。用前第二方。

253. 阳明病，发热、汗多者，急下之，宜大承气汤。方三十七。用前第二方，一云大柴胡汤。

[1] 目中不了了：视物不明。

[2] 睛不和：眼珠转动不灵活。

254. 发汗不解，腹满痛者，急下之，宜大承气汤。

方三十八。用前第二方。

255. 腹满不减，减不足言，当下之，宜大承气汤。

方三十九。用前第二方。

256. 阳明、少阳合病，必下利。其脉不负者，为顺也。负者，失也。互相克贼，名为负也。脉滑而数者，有宿食也，当下之，宜大承气汤。方四十。用前第二方。

257. 病人无表里证，发热七八日，虽脉浮数者，可下之。假令已下，脉数不解，合热则消谷喜饥^{〔1〕}，至六七日，不大便者，有瘀血，宜抵当汤。方四十一。用前第二十四方。

258. 若脉数不解，而下不止，必协热便脓血也。

259. 伤寒发汗已，身目为黄，所以然者，以寒湿一作温在里不解故也。以为不可下也，于寒湿中求之。

260. 伤寒七八日，身黄如橘子色，小便不利，腹微满者，茵陈蒿汤主之。方四十二。用前第二十三方。

261. 伤寒，身黄，发热，梔子柏皮汤主之。方四十三。

肥梔子十五个，擘 甘草一两，炙 黄柏二两

上三味，以水四升，煮取一升半，去滓。分温

〔1〕消谷喜饥：食欲亢进，容易饥饿。

再服。

262. 伤寒，瘀热在里，身必黄，麻黄连轺赤小豆汤主之。方四十四。

麻黄二两，去节 连轺二两，连翘根是 杏仁四十个，去皮尖 赤小豆一升 大枣十二枚，擘 生梓白皮一升，切 生姜二两，切 甘草二两，炙

上八味，以潦水^[1]一斗，先煮麻黄再沸，去上沫，纳诸药，煮取三升，去滓。分温三服，半日服尽。

辨少阳病脉证并治

263. 少阳之为病，口苦，咽干，目眩也。

264. 少阳中风，两耳无所闻，目赤，胸中满而烦者，不可吐下，吐下则悸而惊。

265. 伤寒脉弦细，头痛发热者，属少阳。少阳不可发汗，发汗则谵语。此属胃，胃和则愈，胃不和，烦而悸。一云躁。

266. 本太阳病不解，转入少阳者，胁下硬满，干呕不能食，往来寒热，尚未吐下，脉沉紧者，与小柴胡汤。

[1] 潦水：积存的雨水。

方一。

柴胡八两 人参三两 黄芩三两 甘草三两，炙
半夏半升，洗 生姜三两，切 大枣十二枚，擘

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎
取三升。温服一升，日三服。

267. 若已吐、下、发汗、温针，谵语，柴胡汤证罢，
此为坏病。知犯何逆，以法治之。

268. 三阳合病，脉浮大，上关上，但欲眠睡，目合
则汗。

269. 伤寒六七日，无大热，其人躁烦者，此为阳去
入阴故也。

270. 伤寒三日，三阳为尽，三阴当受邪。其人反
能食而不呕，此为三阴不受邪也。

271. 伤寒三日，少阳脉小者，欲已也。

272. 少阳病欲解时，从寅至辰上。

辨太阴病脉证并治

273. 太阴之为病，腹满而吐，食不下，自利^[1]益
甚，时腹自痛。若下之，必胸下结鞕^[2]。

[1] 自利：即腹泻。

[2] 胸下结鞕：指胃脘部痞结胀硬。

274. 太阴中风,四肢烦疼,阳微阴涩而长者,为欲愈。

275. 太阴病欲解时,从亥至丑上。

276. 太阴病,脉浮者,可发汗,宜桂枝汤。方一。

桂枝三两,去皮 芍药三两 甘草二两,炙 生姜三两,切 大枣十二枚,擘

上五味,以水七升,煮取三升,去滓。温服一升。须臾啖热稀粥一升,以助药力,温覆取汗。

277. 自利,不渴者,属太阴,以其藏有寒故也。当温之,宜服四逆辈^[1]。方二。

278. 伤寒,脉浮而缓,手足自温者,系在太阴。太阴当发身黄,若小便自利者,不能发黄。至七八日,虽暴烦下利,日十余行,必自止,以脾家实,腐秽当去故也。

279. 本太阳病,医反下之,因尔腹满时痛者,属太阴也。桂枝加芍药汤主之。大实痛者,桂枝加大黄汤主之。方三。

桂枝加芍药汤方

桂枝三两,去皮 芍药六两 甘草二两,炙 大

[1] 四逆辈:四逆汤一类的方剂。

枣十二枚，擘 生姜三两，切

上五味，以水七升，煮取三升，去滓。温分三服。本云桂枝汤，今加芍药。

桂枝加大黄汤方

桂枝三两，去皮 大黄二两 芍药六两 生姜三
两，切 甘草二两，炙 大枣十二枚，擘

上六味，以水七升，煮取三升，去滓。温服一升，日三服。

280. 太阴为病，脉弱，其人续自便利，设当行大黄、芍药者，宜减之，以其人胃气弱，易动故也。下利者先煎芍药三沸

辨少阴病脉证并治

281. 少阴之为病，脉微细，但欲寐也。

282. 少阴病，欲吐不吐，心烦但欲寐，五六日自利而渴者，属少阴也。虚故引水自救。若小便色白者，少阴病形悉具。小便白者，以下焦虚有寒，不能制水，故令色白也。

283. 病人脉阴阳俱紧，反汗出者，亡阳也。此属少阴，法当咽痛而复吐利。

284. 少阴病，咳而下利，谵语者，被火气劫故也。

小便必难，以强责^[1]少阴汗也。

285. 少阴病，脉细沉数，病为在里，不可发汗。

286. 少阴病，脉微，不可发汗，亡阳故也。阳已虚，尺脉弱涩者，复不可下之。

287. 少阴病，脉紧，至七八日自下利，脉暴微^[2]，手足反温，脉紧反去者，为欲解也。虽烦，下利，必自愈。

288. 少阴病，下利。若利自止，恶寒而蜷卧^[3]，手足温者，可治。

289. 少阴病，恶寒而蜷，时自烦，欲去衣被者，可治。

290. 少阴中风，脉阳微阴浮者，为欲愈。

291. 少阴病欲解时，从子至寅上。

292. 少阴病，吐，利，手足不逆冷，反发热者，不死。脉不至者，至一作足灸少阴七壮。

293. 少阴病，八九日，一身手足尽热者，以热在膀胱，必便血也。

294. 少阴病，但厥，无汗，而强发之，必动其血。未知从何道出，或从口鼻，或从目出者，是名下厥上

[1] 强责：过分强求。这里指不当发汗而强用发汗的方法。

[2] 脉暴微：脉象突然由紧转为微弱。

[3] 蜷卧：四肢蜷曲而卧。

竭^[1]，为难治。

295. 少阴病，恶寒，身踈而利，手足逆冷者，不治。

296. 少阴病，吐，利，躁烦，四逆者，死。

297. 少阴病，下利止而头眩，时时自冒者，死。

298. 少阴病，四逆，恶寒而身踈，脉不至，不烦而躁者，死。一作吐利而躁逆者死

299. 少阴病六七日，息高^[2]者，死。

300. 少阴病，脉微细沉，但欲卧，汗出不烦，自欲吐，至五六日，自利，复烦躁不得卧寐者，死。

301. 少阴病，始得之，反发热，脉沉者，麻黄细辛附子汤主之。方一。

麻黄二两，去节 细辛二两 附子一枚，炮，去皮，破八片

上三味，以水一斗，先煮麻黄，减二升，去上沫，纳诸药，煮取三升，去滓。温服一升，日三服。

302. 少阴病，得之二三日，麻黄附子甘草汤微发汗。以二三日无证，故微发汗也。方二。

麻黄二两，去节 甘草二两，炙 附子一枚，炮，去皮，破八片

上三味，以水七升，先煮麻黄一两沸，去上沫，

[1] 下厥上竭：阳亡于下，故称下厥；阴竭于上，故称上竭。

[2] 息高：张口抬肩，呼吸极度困难。

纳诸药，煮取三升，去滓。温服一升，日三服。

303. 少阴病，得之二三日以上，心中烦，不得卧，黄连阿胶汤主之。方三。

黄连四两 黄芩二两 芍药二两 鸡子黄二枚
阿胶三两，一云三挺

上五味，以水六升，先煮三物，取二升，去滓，纳胶烊尽，小冷，纳鸡子黄，搅令相得。温服七合，日三服。

304. 少阴病，得之一二日，口中和^[1]，其背恶寒者，当灸之，附子汤主之。方四。

附子二枚，炮，去皮，破八片 茯苓三两 人参二两
白朮四两 芍药三两

上五味，以水八升，煮取三升，去滓。温服一升，日三服。

305. 少阴病，身体痛，手足寒，骨节痛，脉沉者，附子汤主之。方五。用前第四方。

306. 少阴病，下利，便脓血者，桃花汤主之。方六。

赤石脂一斤，一半全用，一半筛末 干姜一两 粳米一升

上三味，以水七升，煮米令熟，去滓。温服七

[1] 口中和：口中无异常感觉。

合，纳赤石脂末方寸匕，日三服。若一服愈，余勿服。

307. 少阴病，二三日至四五日，腹痛，小便不利，下利不止，便脓血者，桃花汤主之。方七。用前第六方。

308. 少阴病，下利，便脓血者，可刺。

309. 少阴病，吐利，手足逆冷，烦躁欲死者，吴茱萸汤主之。方八。

吴茱萸一升 人参二两 生姜六两，切 大枣十二枚，擘

上四味，以水七升，煮取二升，去滓。温服七合，日三服。

310. 少阴病，下利，咽痛，胸满，心烦，猪肤汤主之。方九。

猪肤一斤

上一味，以水一斗，煮取五升，去滓，加白蜜一升，白粉^[1]五合，熬香，和令相得。温分六服。

311. 少阴病二三日，咽痛者，可与甘草汤。不差，与桔梗汤。方十。

甘草汤方

甘草二两

[1] 白粉：即白米粉。

上一味，以水三升，煮取一升半，去滓。温服七合，日二服。

桔梗汤方

桔梗一两 甘草二两

上二味，以水三升，煮取一升，去滓。温分再服。

312. 少阴病，咽中伤，生疮，不能语言，声不出者，苦酒汤主之。方十一。

半夏洗，破如枣核十四枚 鸡子一枚，去黄，纳上苦酒，
着鸡子壳中

上二味，纳半夏，著苦酒^[1]中，以鸡子壳置刀环^[2]中，安火上，令三沸，去滓。少少含咽之。不差，更作三剂。

313. 少阴病，咽中痛，半夏散及汤主之。方十二。

半夏洗 桂枝去皮 甘草炙

上三味，等分，各别捣筛已，合治之。白饮和服方寸匕，日三服。若不能散服者，以水一升，煎七沸，纳散两方寸匕，更煮三沸，下火，令小冷，少少咽之。半夏有毒，不当散服。

[1] 苦酒：即米醋。

[2] 刀环：古代的一种刀具。形状狭长，柄端有环中空，可以置物。

314. 少阴病，下利，白通汤主之。方十三。

葱白四茎 干姜一两 附子一枚，生，去皮，破八片
上三味，以水三升，煮取一升，去滓。分温再服。

315. 少阴病，下利，脉微者，与白通汤。利不止，厥逆无脉，干呕，烦者，白通加猪胆汁汤主之。服汤，脉暴出者死，微续者生。白通加猪胆汁汤。方十四。白通汤用上方。

葱白四茎 干姜一两 附子一枚，生，去皮，破八片
人尿五合 猪胆汁一合

上五味，以水三升，煮取一升，去滓，纳胆汁、人尿，和令相得。分温再服。若无胆，亦可用。

316. 少阴病，二三日不已，至四五日，腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利者，此为有水气。其人或咳，或小便利，或下利，或呕者，真武汤主之。方十五。

茯苓三两 芍药三两 白朮二两 生姜三两，切
附子一枚，炮，去皮，破八片

上五味，以水八升，煮取三升，去滓。温服七合，日三服。若咳者，加五味子半升，细辛一两，干姜一两；若小便利者，去茯苓；若下利者，去芍药，加干姜二两；若呕者，去附子，加生姜，足前为半斤。

317. 少阴病，下利清谷，里寒外热，手足厥逆，脉微欲绝，身反不恶寒，其人面色赤。或腹痛，或干呕，或咽痛，或利止脉不出者，通脉四逆汤主之。方十六。

甘草二两，炙 附子大者一枚，生用，去皮，破八片
干姜三两，强人可四两

上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服，其脉即出者愈。面色赤者，加葱九茎；腹中痛者，去葱，加芍药二两；呕者，加生姜二两；咽痛者，去芍药，加桔梗一两；利止脉不出者，去桔梗，加人参二两。病皆与方相应者，乃服之。

318. 少阴病，四逆，其人或咳，或悸，或小便不利，或腹中痛，或泄利下重者，四逆散主之。方十七。

甘草炙 枳实破，水渍，炙干 柴胡 芍药

上四味，各十分，捣筛。白饮和服方寸匕，日三服。咳者，加五味子、干姜各五分，并主下利；悸者，加桂枝五分；小便不利者，加茯苓五分；腹中痛者，加附子一枚，炮令坼^[1]；泄利下重者，先以水五升，煮薤白三升，煮取三升，去滓，以散三方寸匕，纳汤中，煮取一升半。分温再服。

319. 少阴病，下利六七日，咳而呕，渴，心烦不得

[1] 坼[chè 彻]：裂开。

眠者，猪苓汤主之。方十八。

猪苓_{去皮} 茯苓 阿胶 泽泻 滑石_{各一两}

上五味，以水四升，先煮四物，取二升，去滓，
纳阿胶烊尽。温服七合，日三服。

320. 少阴病，得之二三日，口燥，咽干者，急下之，
宜大承气汤。方十九。

枳实_{五枚，炙} 厚朴_{半斤，去皮，炙} 大黄_{四两，酒洗}
芒硝_{三合}

上四味，以水一斗，先煮二味，取五升，去滓，
纳大黄，更煮取二升，去滓，纳芒硝，更上火，令一
两沸。分温再服，一服得利，止后服。

321. 少阴病，自利清水，色纯青，心下必痛，口干
燥者，可下之，宜大承气汤。方二十。用前第十九方，一法用
大柴胡。

322. 少阴病，六七日，腹胀，不大便者，急下之，宜
大承气汤。方二十一。用前第十九方。

323. 少阴病，脉沉者，急温之，宜四逆汤。方二十
二。

甘草_{二两，炙} 干姜_{一两半} 附子<sub>一枚，生用，去皮，
破八片</sub>

上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓。分
温再服。强人可大附子一枚，干姜三两。

324. 少阴病，饮食入口则吐，心中温温欲吐，复不能吐。始得之，手足寒，脉弦迟者，此胸中实，不可下也，当吐之。若膈上有寒饮，干呕者，不可吐也，当温之，宜四逆汤。方二十三。方依上法。

325. 少阴病，下利，脉微涩，呕而汗出，必数更衣。反少者，当温其上，灸之。《脉经》云灸厥阴可五十壮。

辨厥阴病脉证并治

326. 厥阴之为病，消渴，气上撞心^[1]，心中疼热，饥而不欲食，食则吐蛔，下之利不止。

327. 厥阴中风，脉微浮为欲愈，不浮为未愈。

328. 厥阴病欲解时，从丑至卯上。

329. 厥阴病，渴欲饮水者，少少与之愈。

330. 诸四逆厥者，不可下之，虚家^[2]亦然。

331. 伤寒，先厥，后发热而利者，必自止，见厥复利。

332. 伤寒，始发热六日，厥反九日而利。凡厥利者，当不能食，今反能食者，恐为除中^[3]，一云消中食以

[1] 气上撞心：气冲撞胸部。

[2] 虚家：平素身体虚弱的人。

[3] 除中：指中气将绝而反欲食的危象。

索饼^[1]，不发热者，知胃气尚在，必愈。恐暴热来出而复去也。后日脉之，其热续在者，期之旦日夜半^[2]愈。所以然者，本发热六日，厥反九日，复发热三日，并前六日，亦为九日，与厥相应，故期之旦日夜半愈。后三日脉之，而脉数，其热不罢者，此为热气有余，必发痈脓也。

333. 伤寒，脉迟六七日，而反与黄芩汤彻其热。脉迟为寒，今与黄芩汤复除其热，腹中应冷，当不能食，今反能食，此名除中，必死。

334. 伤寒，先厥后发热，下利必自止。而反汗出，咽中痛者，其喉为痹^[3]。发热无汗，而利必自止；若不止，必便脓血。便脓血者，其喉不痹。

335. 伤寒，一二日至四五日，厥者，必发热。前热者，后必厥，厥深者热亦深，厥微者热亦微。厥应下之，而反发汗者，必口伤烂赤。

336. 伤寒病，厥五日，热亦五日，设六日当复厥，不厥者自愈。厥终不过五日，以热五日，故知自愈。

337. 凡厥者，阴阳气不相顺接，便为厥。厥者，手足逆冷者是也。

[1] 索饼：即面条。

[2] 旦日夜半：次日半夜。

[3] 其喉为痹：咽喉红肿疼痛，妨碍饮食。

338. 伤寒脉微而厥，至七八日肤冷，其人躁无暂安时者，此为藏厥^[1]，非蛔厥^[2]也。蛔厥者，其人当吐蛔。令病者静，而复时烦者，此为藏寒。蛔上入其膈，故烦，须臾复止，得食而呕，又烦者，蛔闻食臭出，其人常自吐蛔。蛔厥者，乌梅丸主之。又主久利。方一。

乌梅三百枚 细辛六两 干姜十两 黄连十六两
当归四两 附子六两，炮，去皮 蜀椒四两，出汗 桂枝
六两，去皮 人参六两 黄柏六两

上十味，异捣筛，合治之。以苦酒渍乌梅一宿，去核，蒸之五斗米下，饭熟捣成泥，和药令相得，纳臼中，与蜜，杵二千下，丸如梧桐子大。先食饮服十丸，日三服，稍加至二十丸。禁生冷、滑物、臭食等。

339. 伤寒热少微厥，指一作稍头寒，嘿嘿不欲食，烦躁。数日，小便利，色白者，此热除也。欲得食，其病为愈，若厥而呕，胸胁烦满者，其后必便血。

340. 病者手足厥冷，言我不结胸，小腹满，按之痛者，此冷结在膀胱关元^[3]也。

341. 伤寒发热四日，厥反三日，复热四日，厥少热

[1] 藏厥：由阳气衰竭而引起的四肢逆冷。

[2] 蛔厥：由蛔虫病引起的四肢厥冷。

[3] 关元：穴位名。在脐下三寸。

多者，其病当愈。四日至七日热不除者，必便脓血。

342. 伤寒厥四日，热反三日，复厥五日，其病为进。寒多热少，阳气退，故为进也。

343. 伤寒六七日，脉微，手足厥冷，烦躁，灸厥阴。厥不还者，死。

344. 伤寒发热，下利，厥逆，躁不得卧者，死。

345. 伤寒发热，下利至甚，厥不止者，死。

346. 伤寒六七日不利，便发热而利，其人汗出不止者，死。有阴无阳故也。

347. 伤寒五六日，不结胸，腹濡，脉虚，复厥者，不可下，此亡血，下之死。

348. 发热而厥，七日，下利者，为难治。

349. 伤寒脉促，手足厥逆。可灸之。促，一作纵。

350. 伤寒脉滑而厥者，里有热，白虎汤主之。方二。

知母六两 石膏一斤，碎，绵裹 甘草二两，炙 粳米六合

上四味，以水一斗，煮米熟，汤成，去滓。温服一升，日三服。

351. 手足厥寒，脉细欲绝者，当归四逆汤主之。方三。

当归三两 桂枝三两，去皮 芍药三两 细辛三两

甘草二两，炙 通草二两 大枣二十五枚，擘 一法十二枚
上七味，以水八升，煮取三升，去滓。温服一升，日三服。

352. 若其人内有久寒者，宜当归四逆加吴茱萸生姜汤。方四。

当归三两 芍药三两 甘草二两，炙 通草二两
桂枝三两，去皮 细辛三两 生姜半斤，切 吴茱萸
二升 大枣二十五枚，擘

上九味，以水六升，清酒六升和，煮取五升，去滓。温分五服。一方水酒各四升。

353. 大汗出，热不去，内拘急，四肢疼，又下利厥逆而恶寒者，四逆汤主之。方五。

甘草二两，炙 干姜一两半 附子一枚，生用，去皮，
破八片

上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓。分温再服。若强人，可用大附子一枚，干姜三两。

354. 大汗，若大下利而厥冷者，四逆汤主之。方六。用前第五方。

355. 病人手足厥冷，脉乍紧者，邪结在胸中，心下满而烦，饥不能食者，病在胸中，当须吐之，宜瓜蒂散。方七。

瓜蒂 赤小豆

上二味，各等分，异捣筛，合纳臼中，更治之。别以香豉一合，用热汤七合，煮作稀糜，去滓，取汁和散一钱匕。温顿服之。不吐者，少少加，得快吐乃止。诸亡血、虚家，不可与瓜蒂散。

356. 伤寒，厥而心下悸，宜先治水，当服茯苓甘草汤，却治其厥。不尔，水渍入胃，必作利也。茯苓甘草汤。方八。

茯苓二两 甘草一两，炙 生姜三两，切 桂枝二两，去皮

上四味，以水四升，煮取二升，去滓。分温三服。

357. 伤寒六七日，大下后，寸脉沉而迟，手足厥逆，下部脉不至，咽喉不利，唾脓血，泄利不止者，为难治，麻黄升麻汤主之。方九。

麻黄二两半，去节 升麻一两一分 当归一两一分
知母十八铢 黄芩十八铢 姜薤十八铢，一作薑薤 芍药六铢 天门冬六铢，去心 桂枝六铢，去皮 茯苓六铢 甘草六铢，炙 石膏六铢，碎，绵裹 白朮六铢 干姜六铢

上十四味，以水一斗，先煮麻黄一两沸，去上沫，纳诸药，煮取三升，去滓。分温三服。相去如炊三斗米顷，令尽，汗出愈。

358. 伤寒四五日，腹中痛，若转气下趣^[1]少腹者，此欲自利也。

359. 伤寒本自寒下，医复吐下之，寒格^[2]，更逆吐下，若食入口即吐，干姜黄芩黄连人参汤主之。方十。

干姜 黄芩 黄连 人参各三两

上四味，以水六升，煮取二升，去滓。分温再服。

360. 下利有微热而渴，脉弱者，今自愈。

361. 下利脉数，有微热汗出，今自愈。设复紧，为未解。一云设脉浮复紧。

362. 下利，手足厥冷，无脉者，灸之。不温，若脉不还，反微喘者，死。少阴负趺阳者，为顺也。

363. 下利，寸脉反浮数，尺中自涩者，必清脓血。

364. 下利清谷，不可攻表，汗出必胀满。

365. 下利脉沉弦者，下重也；脉大者，为未止；脉微弱数者，为欲自止，虽发热不死。

366. 下利脉沉而迟，其人面少^[3]赤，身有微热，下利清谷者，必郁冒汗出而解，病人必微厥，所以然者，其

[1] 趣：同趋。

[2] 寒格：格，被阻隔。寒格，被寒邪阻隔。

[3] 少：同稍，轻微的意思。

面戴阳¹ 下虚故也。

367. 下利脉数而渴者，今自愈。设不差，必清脓血，以有热故也。

368. 下利后脉绝，手足厥冷，晷时脉还，手足温者生，脉不还者死。

369. 伤寒，下利日十余行，脉反实者，死。

370. 下利清谷，里寒外热，汗出而厥者，通脉四逆汤主之。方十一。

甘草二两，炙 附子大者一枚，生，去皮，破八片 干姜三两，强人可四两

上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓。分温再服，其脉即出者愈。

371. 热利下重者，白头翁汤主之。方十二。

白头翁二两 黄柏三两 黄连三两 秦皮三两

上四味，以水七升，煮取二升，去滓。温服一升，不愈，更服一升。

372. 下利腹胀满，身体疼痛者，先温其里，乃攻其表。温里宜四逆汤，攻表宜桂枝汤。方十三。四逆汤用前第五方。

桂枝汤方

[1] 戴阳：因虚阳上浮而出现的两颧殷红。

桂枝三两，去皮 芍药三两 甘草二两，炙 生姜三两，切 大枣十二枚，擘

上五味，以水七升，煮取三升，去滓。温服一升，须臾啜热稀粥一升，以助药力。

373. 下利欲饮水者，以有热故也。白头翁汤主之。方十四。用前第十二方。

374. 下利谵语者，有燥屎也。宜小承气汤。方十五。

大黄四两，酒洗 枳实三枚，炙 厚朴二两，去皮，炙
上三味，以水四升，煮取一升二合，去滓。分二服，初一服谵语止，若更衣者，停后服，不尔，尽服之。

375. 下利后更烦，按之心下濡者，为虚烦也。宜梔子豉汤。方十六。

肥梔子十四个，擘 香豉四合，绵裹

上二味，以水四升，先煮梔子，取二升半，纳豉，更煮取一升半，去滓。分再服。一服得吐，止后服。

376. 呕家有痈脓者，不可治呕，脓尽自愈。

377. 呕而脉弱，小便复利，身有微热，见厥者难治，四逆汤主之。方十七。用前第五方。

378. 干呕，吐涎沫，头痛者，吴茱萸汤主之。方十八。

吴茱萸一升，汤洗七遍 人参三两 大枣十二枚，擘
生姜六两，切

上四味，以水七升，煮取二升，去滓。温服七合，日三服。

379. 呕而发热者，小柴胡汤主之。方十九。

柴胡八两 黄芩三两 人参三两 甘草三两，炙
生姜三两，切 半夏半升，洗 大枣十二枚，擘

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，更煎取三升。温服一升，日三服。

380. 伤寒，大吐、大下之，极虚，复极汗者，其人外气怫郁，复与之水，以发其汗，因得哕。所以然者，胃中寒冷故也。

381. 伤寒哕而腹满，视其前后^[1]，知何部不利，利之即愈。

辨霍乱病脉证并治

382. 问曰：病有霍乱者何？答曰：呕吐而利，此名霍乱。

383. 问曰：病发热，头痛，身疼，恶寒，吐利者，此

[1] 前后：前指小便，后指大便。

属何病？答曰：此名霍乱。霍乱自吐下，又利止，复更发热也。

384. 伤寒，其脉微涩者，本是霍乱，今是伤寒，却四五日，至阴经上，转入阴必利，本呕，下利者，不可治也。欲似大便，而反失气，仍不利者，此属阳明也。便必硬，十三日愈，所以然者，经尽故也。下利后，当便硬，硬则能食者愈。今反不能食，到后经中，颇能食，复过一经能食，过之一日当愈，不愈者，不属阳明也。

385. 恶寒，脉微而复利，利止，亡血也。四逆加人参汤主之。方一。

甘草二两，炙 附子一枚，生，去皮，破八片 干姜一两半 人参一两

上四味，以水三升，煮取一升二合，去滓。分温再服。

386. 霍乱，头痛，发热，身疼痛，热多欲饮水者，五苓散主之。寒多不用水者，理中丸主之。方二。

五苓散方

猪苓去皮 白朮 茯苓各十八铢 桂枝半两，去皮
泽泻一两六铢

上五味，为散，更治之。白饮和服方寸匕，日三服。多饮暖水，汗出愈。

理中丸方下有作汤加减法

人参 干姜 甘草^炙 白朮各三两

上四味，捣筛，蜜和为丸，如鸡子黄许大。以沸汤数合，和一丸，研碎，温服之，日三四，夜二服。腹中未热，益至三四丸，然不及汤。汤法：以四物依两数切，用水八升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。若脐上筑^[1]者，肾气动也，去朮加桂四两；吐多者，去朮加生姜三两；下多者还用朮；悸者，加茯苓二两；渴欲得水者，加朮，足前成四两半；腹中痛者，加人参，足前成四两半；寒者，加干姜，足前成四两半；腹满者，去朮，加附子一枚。服汤后，如食顷^[2]，饮热粥一升许，微自温，勿发揭衣被。

387. 吐利止而身痛不休者，当消息^[3]和解其外，宜桂枝汤小和之。方三。

桂枝三两，去皮 芍药三两 生姜三两 甘草二两，炙 大枣十二枚，擘

上五味，以水七升，煮取三升，去滓。温服一升。

388. 吐利，汗出，发热，恶寒，四肢拘急，手足厥冷

[1] 筑：攻动。

[2] 食顷：吃一顿饭的时间。

[3] 消息：斟酌的意思。

者，四逆汤主之。方四。

甘草二两，炙 干姜一两半 附子一枚，生，去皮，
破八片

上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓。分
温再服。强人可大附子一枚、干姜三两。

389. 既吐且利，小便复利而大汗出，下利清谷，内
寒外热，脉微欲绝者，四逆汤主之。方五。用前第四方。

390. 吐已下断，汗出而厥，四肢拘急不解，脉微欲
绝者，通脉四逆加猪胆汁汤主之。方六。

甘草二两，炙 干姜三两。强人可四两 附子大者
一枚，生，去皮，破八片 猪胆汁半合

上四味，以水三升，煮取一升二合，去滓，纳猪
胆汁。分温再服，其脉即来。无猪胆，以羊胆代之。

391. 吐利，发汗，脉平^[1]，小烦者，以新虚^[2]不胜
谷气故也。

辨阴阳易差后劳复病脉证并治

392. 伤寒，阴阳易^[3]之为病，其人身体重，少气，

[1] 脉平：这里指脉象平和。

[2] 新虚：病后身体虚弱。

[3] 阴阳易：与伤寒初愈的病人同房之后所得的一种疾病。

少腹里急，或引阴中拘挛，热上冲胸，头重不欲举，眼中生花，花一作眦膝胫拘急者，烧裈^[1]散主之。方一。

妇人中裈，近隐处，取烧作灰。

上一味，水服方寸匕，日三服，小便即利，阴头微肿，此为愈矣。妇人病取男子裈烧服。

393. 大病差后劳复^[2]者，枳实栀子豉汤主之。方二。

枳实三枚，炙 栀子十四个，擘 豉一升，绵裹

上三味，以清浆水^[3]七升，空煮取四升，纳枳实、栀子，煮取二升，下豉，更煮五六沸，去滓。温分再服。覆令微似汗。若有宿食者，纳大黄如博棋子五六枚，服之愈。

394. 伤寒差以后，更发热，小柴胡汤主之。脉浮者，以汗解之；脉沉实一作紧者，以下解之。方三。

柴胡八两 人参二两 黄芩二两 甘草二两，炙
生姜二两 半夏半升，洗 大枣十二枚，擘

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升。温服一升，日三服。

395. 大病差后，从腰以下有水气者，牡蛎泽泻散

[1] 裈[kūn 昆]: 有裆的裤子。

[2] 劳复: 大病初愈，因劳累而复发。

[3] 清浆水: 即米泔水。

主之。方四。

牡蛎熬 泽泻 蜀漆暖水洗去腥 葶苈子熬
商陆根熬 海藻洗去咸 栝楼根各等分

上七味，异捣，下筛为散，更于臼中治之。白饮和服方寸匕，日三服。小便利，止后服。

396. 大病差后，喜唾^[1]，久不了了，胸上有寒，当以丸药温之，宜理中丸。方五。

人参 白朮 甘草炙 干姜各三两

上四味，捣筛，蜜和为丸，如鸡子黄许大，以沸汤数合，和一丸，研碎。温服之，日三服。

397. 伤寒解后，虚羸少气，气逆欲吐，竹叶石膏汤主之。方六。

竹叶二把 石膏一斤 半夏半升，洗 麦门冬一升，去心 人参二两 甘草二两，炙 粳米半升

上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，纳粳米，煮米熟，汤成，去米。温服一升，日三服。

398. 病人脉已解，而日暮微烦，以病新差，人强与谷，脾胃气尚弱，不能消谷，故令微烦，损谷^[2]则愈。

[1] 喜唾：时时吐涎沫。

[2] 损谷：节制饮食。

索引

(项下数字,系本书条文编号,非页码)

三 画

下血 一二四 一二六 一四〇
二一六
下利 一〇五 一二九 一五〇
一五二 一五七 一五八
一五九 一六五 二一〇
二五六 二七八 二八四
二八七 二八八 二九七
三〇六 三〇七 三〇八
三一〇 三一四 三一五
三一六 三一八 三一九
三二五 三三四 三四四
三四五 三四八 三五三
三五四 三六〇 三六一
三六二 三六三 三六五
三六六 三六七 三六八
三六九 三七二 三七三
三七四 三七五 三八四
下利清谷 九一 二二五
三一七 三六四 三六六
三七〇 三八九
下虚 三六六
下重 九八 三一八 三六五
三七一

下焦 一二四 一五九 二八二
下厥上竭 二九四
干呕 一二 四〇 一五二
一五八 二六六 三一五
三一七 三二四 三七八
寸脉 一二八 一二九 一六六
三五七 三六三 二四四
(寸)
寸口脉 三〇 一〇八
大汗出 二五 二六 七一
一一〇 三五三
三八九
大便溏 二二九
大便反溏 一二三
大便反易 二三七
大便难 一七九 一八一
二二〇 二五二
大便为难 二一八
大便鞭 一一〇 一四八
一七四 一八七 二〇三
大便当鞭 一〇五
大便已鞭 二〇八
大便必鞭 二一三 二四四
大便因鞭 二四五 二五〇
大便则鞭 二四七

大便微硬 二〇九
 大便乍难乍易 二四二
 大便初硬后溏 一九一
 上焦 二三〇 二四三
 口苦 一八九 二二一 二六三
 口干 一一一 二二二 二二七
 三二一
 口燥 一五六 一六九 二〇二
 三二〇
 口鼻 二九四
 口不仁 二一九
 口中和 三〇四
 小便少 一二七 二五一
 小便难 二〇 九八 一一一
 一八九 一九五 二三一
 小便必难 二八四
 小便数 二九 二〇三 二四四
 二四七 二五〇
 小便当数 一一〇
 小便利 五九 一〇五 一〇九
 一一一 一二七 一九七
 二五一 三一六 三三九
 三九五
 小便当利 二三六
 小便复利 三七七 三八九
 小便自利 一二四 一二五
 一七四 一八七 二三三
 二七八
 小便不利 六 二八 四〇

五九 七一 九六 一〇七
 一二五 一二六 一三四
 一四七 一五六 一七四
 一七五 一九一 一九九
 二〇〇 二〇六 二二三
 二三六 二四二 二六〇
 三〇七 三一六 三一八
 小便反不利 一九二
 小便清 五六
 小便色白 二八二
 亡阳 三〇 三八 一一二
 二八三 二八六
 亡其阳 二一一
 亡血 五八 一六六 一六八
 三四七 三五五 三八五
 亡血家 八七
 亡津液 五八 五九 一八一
 二〇三 二四五
 卫气 五三 五四
 卫强 九五

四 画

无脉 三一五 三六二
 无汗 二八 三一 三五 四六
 四七 一三四 一八五
 一九六 一九七 一九九
 二三五 二三六 二九四
 无阳 二七 一三〇 一五三
 三四六

无血 一二五
 无表证 六一 一七〇
 无表里证 二五二 二五七
 无大热 六一 六三 一三六
 一六二 一六九 二六九
 无热恶寒 七
 支结 一四六
 支节烦痛 一四六
 太阳病 二 三 六 八 九
 一三 一四 一五 一六
 二〇 二一 二三 二四
 二七 三一 三四 三五
 三七 四二 四三 四四
 四五 四六 四七 四八
 七一 八二 九三 九四
 九五 一〇三 一〇六
 一一〇 一一一 一一四
 一二〇 一二一 一二三
 一二四 一二五 一二七
 一三四 一三七 一三九
 一四〇 一五三 一六三
 一八一 二四四 二四八
 二五〇 二六六 二七九
 太阳 一 四 一二 三二
 三三 三六 三八 四八
 一一九 一二四 一四二
 一五〇 一五二 一七一
 一七二 一七九 二二〇
 太阳随经 一二四

太阴病 二七五 二七六
 太阴 一八七 二七三 二七四
 二七七 二七八 二七九
 二八〇
 不传 四 五 八
 不呕 二三 六一 九六
 一四七 一七四 一九七
 二四四 二七〇
 不渴 四一 六一 七三 九六
 一四一 一七四 二七七
 不了了 一〇 一四八 二〇三
 二五二 三九六
 不大便 五六 一一一 一三七
 二〇九 二一二 二一四
 二三〇 二三九 二四一
 二五一 二五七 三二二
 不汗出 三八
 不下利 三三
 不欲食 一四八 三二六
 三三九
 不能食 九八 一二〇 一八五
 一九〇 一九一 一九四
 二〇九 二一五 二二六
 二二八 二六六 三三二
 三三三 三五五 三八四
 不能消谷 一二二 三九八
 不能发黄 一八七 二三六
 二七八
 不能卧 一三九 二四二

不得卧 三〇〇 三〇三
 三四四
 不得眠 三八 六一 七一
 七六 八六 二二一
 三一九
 不得汗 一一四 二三一
 不恶寒 六 四八 七〇
 一二〇 一二一 一五二
 一八二 一九八 二〇八
 二一二 二二一 二四四
 三一七
 不可下 三六 四四 四八
 一三二 二五九 二八六
 三二四 三三〇 三四七
 不可攻 一三〇 一六四
 二〇四 二〇五 二〇六
 二〇九 二三三 二三八
 三六四
 不可发汗 二七 四九 五〇
 八三 八四 八五 八六
 八七 一四二 二六五
 二八五 二八六
 不可更发汗 二三
 不更衣 一八一 二四四
 不结胸 一二四 一三四
 一四〇 二二八 三四〇
 三四七
 中风 二 一二 三八 七四
 九六 一〇一 一一一

一四三 一四四 一五二
 一五八 一八九 一九〇
 二三一 二六四 二七四
 二九〇 三二七
 中寒 一九〇 一九一
 中焦 一五九
 日晡所发潮热 一〇四 二一二
 二四〇
 日晡所小有潮热 一三七
 少阳病 二七二
 少阳 一四二 一五〇 一七一
 一七二 一七九 二五六
 二六三 二六四 二六五
 二六六 二七一
 少阴病 一四八 二八二
 二八四 二八五 二八六
 二八七 二八八 二八九
 二九一 二九二 二九三
 二九四 二九五 二九六
 二九七 二九八 二九九
 三〇〇 三〇一 三〇二
 三〇三 三〇四 三〇五
 三〇六 三〇七 三〇八
 三〇九 三一〇 三一
 三一二 三一三 三一四
 三一五 三一六 三一七
 三一八 三一九 三二〇
 三二一 三二二 三二三
 三二四 三二五

少阴 一四八 二八一 二八二
二八三 二八四 二九〇
二九二 三六二
少腹满 四〇 一二六
少腹鞭 一二五
少腹鞭满 一三七
少腹急结 一〇六
少腹里急 三九二
少腹当鞭满 一二四
水气 四〇 四一 一五七
一七四 三一六 三九五
水逆 七四
水结 一三六
水谷不别 一九一
风温 六
风家 一〇
风湿相搏 一七四 一七五
手足冷 一四八
手足寒 三〇五 三二四
手足温 九八 九九 一五三
二二八 二八八 三六八
手足自温 一八七 二七八
手足厥 一九七
手足厥寒 三五—
手足厥冷 三四〇 三四三
三五五 三六二 三六八
三八八
手足厥逆 三一七 三四九
三五七

手足逆冷 二一九 二九五
三〇九 三三七
气上冲 一五
气上冲胸 六七
气上撞心 三二六
气上冲咽喉 一六〇
气上冲咽喉 一六六
心烦 二九 七九 九六
一四七 一五〇 一五八
一六九 二〇七 二八二
三一〇 三一九
心下痞 一五三 一五四
一五五 一五六 一五八
一六四 二四四
心下痛 一三五
心下必痛 三二一
心下急 一〇三
心下满 二八 一四八 一四九
三五五
心下鞭 一五〇 一七一
二〇五 二五一
心下濡 三七五
心下悸 六四 八二 九六
一二七 三五六
心中悸 一〇二
心下逆满 六七
心下鞭满 二〇五
心下痞鞭 一四二 一五二
一五七 一五八 一五九

一六〇 一六一 一六三

心中痞鞭 一六五

心中懊恼 七六 一三四

一九九 二二一 二二八
二三八

火气 一一六 二八四

火灸 一一六

火邪 一一四

火迫 一一二

火逆 一一六 一一八

火薰 六 一一四

火 六 一一一 一一三

一一五 一一六 二〇〇

尺中 四九 五〇 三六三

尺脉 二八六 二四四(尺)

五 画

可攻 一〇六 一五二 一六四

二〇八 二〇九 二三八

二五一

目 二九四

目瞑 四六

目眩 二六三

目赤 二六四

目合则汗 二六八

目中不了了 二五二

(身目为黄) 二五九

(面目及身黄) 九八

(一身及目悉黄) 二三一

四肢微急 二〇

四肢烦疼 二七四

四肢沉重疼痛 三一六

四肢疼 三五三

四肢拘急 三八八 三九〇

四肢 四八

皮肤 一一

失气 二〇九 三八四

失溲 六

外证 四二 四四 一四六

一四八 一六三 一八二

饥不能食 二二八 三五五

头痛 八 一三 三五 五六

九二 一三四 一四〇

一五二 一九七 二六五

三七八 三八三 三八六

头眩 六七 八二 一九五

一九八 二九七

头汗出 一一一 一三四

一四七 一四八 二一六

二二八 二三六

头微汗出 一三六

头项强痛 一 二八 一四二

发汗 六 一六 二〇 二九

四五 四八 五一 五二

五四 五五 五六 五七

五八 五九 六〇 六一

六二 六三 六四 六五

六六 六七 六八 六九

七〇 七一 七二 七五
 七六 七七 八二 八四
 八七 八八 八九 九〇
 九三 一一一 一二二
 一四二 一四七 一五三
 一六〇 一六一 一六四
 一七九 一八一 二〇三
 二一一 二一九 二二一
 二三三 二三四 二三五
 二四〇 二四八 二五〇
 二五四 二五九 二六五
 二六七 三〇二 三三五
 三九一

发狂 一二四 一九二

发黄 六 一一一 一三四
 一八七 一九九 二〇〇
 二三六 二七八

发热汗出 二 一三 九五
 一〇一 一四九 一六五
 二二一 二三六 二四四

发热无汗 一七〇 三三四

发热身无汗 四七

发热恶寒 七 二三 二七
 三八 一四三 一五三
 一八九 二〇八 三八八

发热 三 六 一二 一六
 二八 三五 四〇 四一
 四六 四七 五四 七四
 八二 九二 一〇九

一一三 一二〇 一三四
 一四五 一四六 一四九
 一七〇 一八三 一八五
 二〇六 二〇九 二一二
 二二三 二二七 二四〇
 二四八 二五三 二五七
 二六一 二六五 二九二
 三〇一 三三一 三三二
 三三四 三三五 三四一
 三四四 三四五 三四六
 三四八 三六五 三七九
 三八三 三八六 三九四

六 画

耳聋 七五

耳前后肿 二三一

耳无所闻 二六四

协热利 一三九 一四〇

协热而利 一六三

协热便脓血 二五八

有寒 八九 一三九 一七六

二七七 二八二 三二四

三九六

有久寒 三五二

动经 六七

再经 八

过经 一〇三 一〇五 一二三

二一七

吐下 七六 一二三 一六〇

二六四 二六六 二六七
 三五九 三八三
 吐利 二八三 二九二 二九六
 三〇九 三八三 三八七
 三八八 三九一
 吐且利 三八九
 吐蛔 八九 三二六 三三八
 吐 四 一六 一九 二三 二九
 五八 六七 七四 七六
 七九 八〇 一一五 一二〇
 一二一 一二二 一二三
 一四一 一六〇 一六一
 一六五 一六六 一六八
 一七三 二〇七 二一二
 二二一 二四九 二五〇
 二六七 二七三 二八二
 二九二 三〇〇 三二四
 三五五 三五九 三七五
 三七八 三八〇 三九〇
 舌燥 二二二
 舌上燥而渴 一三七
 舌上干燥而烦 一六八
 舌上苔 二二一
 舌上白苔 二三〇
 舌上苔滑 一三〇
 舌上白苔滑 一二九
 传 四 一八四
 伤寒 三 四 五 二九 三九
 四〇 四一 五五 五六

五七 六七 七三 七八
 七九 八〇 九一 九六
 九九 一〇〇 一〇一
 一〇二 一〇四 一〇五
 一〇七 一〇八 一〇九
 一一二 一一三 一一九
 一二六 一三五 一三六
 一四五 一四六 一四七
 一四八 一四九 一五七
 一五八 一五九 一六〇
 一六一 一六四 一六五
 一六八 一六九 一七〇
 一七三 一七四 一七六
 一七七 一八五 一八六
 一八七 一八八 二〇四
 二一二 二一八 二四九
 二五二 二五九 二六〇
 二六一 二六二 二六五
 二六九 二七〇 二七一
 二七八 三三一 三三二
 三三三 三三四 三三五
 三三六 三三八 三三九
 三四一 三四二 三四三
 三四四 三四五 三四六
 三四七 三四九 三五〇
 三五六 三五七 三五八
 三五九 三六九 三八〇
 三八一 三八四 三九二
 三九四 三九七

合病 三二 三三 三六

一七二 二一九 二五六

二六八

妇人 一四三 一四四 一四五

三九二

如症状 二三 一四四 二四〇

自利 二七三 二七七 二八二

三〇〇 三二一 三五八

自下利 三二 一〇五 一一〇

一七二 二八七 三一六

自汗出 六 二九 五三 五四

一〇九 一二〇 二〇三

二一九 二三三

多汗 一九六 二一三

汗多 二〇八 二一一 二二四

二五三

汗出 二 一二 一三 一四

二三 二五 二六 三〇

三四 三八 四八 四九

六三 七一 七三 八二

八四 八五 八六 九三

九四 九五 一〇一

一一一 一一三 一一六

一三四 一三六 一四一

一四七 一四八 一四九

一五二 一五五 一五七

一六二 一六五 一七五

一八三 一八五 一八八

一九一 一九二 二〇〇

二〇一 二〇八 二一六

二一七 二二〇 二二四

二二八 二三〇 二三四

二三六 二四〇 二四四

二四五 二八三 三〇〇

三二五 三三四 三四六

三五三 三五七 三六一

三六四 三六六 三七〇

三八六 三八八 三八九

三九〇

汗家 八八

并病 四八 一四二

一五〇 一七一 二二〇

关(脉) 一二〇 一二八

一五四 二四四 二六八

阳旦 三〇

阳气 三〇 四六 四八

一二二 一三四 三四二

阳明病 一八一 一八二

一八四 一八七 一九〇

一九一 一九二 一九三

一九四 一九五 一九六

一九七 一九八 一九九

二〇〇 二〇一 二〇二

二〇三 二〇五 二〇六

二〇七 二〇八 二〇九

二一三 二一四 二一五

二一六 二二一 二二四

二二八 二二九 二三〇

二三三 二三四 二三五

二三六 二三八 二五三

阳明证 二〇四 二三七

阳明 五 八 三〇 三二

三三 三六 四八 九七

一七九 一八〇 一八一

一八四 一八五 一八六

一八八 一八九 二三一

二四〇 二四三 二四四

三八四

阳微结 一四八

阴脉 九四 一〇〇

阴虚 一一一

阴疼 八八

阴经 三八四

阴结 一四八

阴阳易 三九二

阴阳气 一五三 三三七

阴阳俱虚 二三

阴阳俱虚竭 一一一

阴头微肿 三九二

七 画

更衣 二〇八 三二五 三七四

坏病 一六 二六七

里急 一二七 三九二

里虚 四九 二一四

里寒外热 三一七 三七〇

利 三四 四〇 一〇四 一〇六

一二六 一三四 一三九

一四〇 一四一 一五九

一六三 一六八 二〇五

二一二 二八〇 二八八

二九五 三一五 三一七

三二〇 三二一 三二六

三三一 三三二 三三四

三三八 三四六 三五六

三五七 三七一 三八一

三八二 三八三 三八四

三八五 三八七 三八九

利小便 一七九 一八一

利其小便 一五九 二二四

肝俞 一四二 一七一

肝乘脾 一〇八

肝乘肺 一〇九

身凉 一四三

身重 六 四九 二一九

二二一

身体重 三九二

身尽重 一〇七

身必重 二〇八

身黄 九八 一二五 二六〇

二六一 二七八

身热 七八 八〇 九九

一四一 一八二

身疼 三八三

身痛 三八七

身疼痛 三八 四六 五〇

六二 八五 九一 三八六
身体疼 一七四
身体痛 三〇五
身体疼痛 九二 三七二
身微肿 一七五
身如痹 一七四
饮水 七一 七五 九八
一二七 一四一 一六八
二〇九 二二六 三七三
三八六
谷气 一一〇 一九二 三九一
谷瘁 一九五

八 画

刺大椎 一四二 一七一
刺风池 二四
刺期门 一〇八 一〇九
一四三 二一六
刺之小差 二三一
(可刺) 三〇八
表里实 四九
表里证 七四 二五二 二五七
表未解 三四 四三 一三四
一六四 二三四
表里不解 一六三
表里俱虚 九三 一五三
表里俱热 一六八
表虚里实 二一七 二一八
拘急 三〇 一四〇 三五三

三八八 三九〇 三九二
拘挛 三九二
直视 六 八六 二一〇
二一二
转气 二一四 三五八
郁冒 三六六
奔豚 六五 一一七
到经 一一四
呕吐 一六五 一七三 三八二
呕家 一〇〇 三七六
呕 三 一七 三三 七六
九六 九七 九八 一〇三
一〇四 一一〇 一二三
一四〇 一四六 一四九
一五二 一六八 一七二
一八五 一九七 二〇四
二三〇 二四三 三一六
三一七 三一九 三二五
三三八 三三九 三七六
三七七 三七九 三八四
怫郁 四八 三八〇
固瘕 一九一
经水 一四三 一四四
一四五
经脉 一六〇
胁下满 九九
胁下痛 一五二 一六〇
胁下痞硬 九六
胁下满痛 九八

胁痛 三七
胁下硬满 二三〇 二六六
胁下有水气 一五七
胁下素有痞 一六七
胁下及心痛 二三一
(结于胁下) 九七
胀满 二〇九 三六四
往来寒热 九六 九七 一三〇
一三六 一四七 二六六
泄利 三一八 三五七
实 七〇 一〇四 一〇五
一一五 一三五 一四一
一四三 一七九 二一〇
二一六 二五二 二七九
郑声 二一〇
泻肝法 一五七
剂颈而还 一一一 一三四
二三六

九 画

按之痛 一二八 三四〇
按之则痛 一三八
项背强几几 一四 三一
项亦强 一三一
项不强 一六六
荣气 五〇 五三
荣弱 九五
面垢 二一九
面色赤 三一七

面少赤 三六六
面合色赤 二〇六
面色青黄 一五三
面目及身黄 九八
面色缘缘正赤 四八
面色反有热色 二三
咽干 一八九 二六三 三二〇
咽中干 二九 三〇
咽中伤 三一二
咽痛 一四〇 二八三 三一〇
三一 三一七
咽必痛 一九八
咽中痛 三一三 三三四
咽燥 一一五 二二一
咽喉干燥 八三
咽烂 一一一
胃气 二九 七〇 七一
一四五 二〇七 二〇八
二三〇 二四六 二四七
二八〇 三三二 三九八
胃中干 七一
胃中冷 八九 一九一
胃中燥 一七九 二一三
二二四
胃中虚 一五八
胃家实 一七九 一八〇
胃中空虚 一三四 二二一
胃中不和 一五七
胃中干燥 一八一 二〇三

胃中水渴 一一〇
胃中寒冷 三八〇
胃中虚冷 一二二 一九四
二二六
胃中有邪气 一七三
胃中有燥屎 二三八
胃中必有燥屎 二一五
(燥屎在胃中) 二一七
咳 四〇 四一 七五 九六
一九七 一九八 二八四
三一六 三一八 三一九
骨髓 一一
骨节疼 一九二
骨节痛 三〇五
骨节疼痛 三五
骨节疼烦 一七五
哕 九八 一一一 一九四
二〇九 二二六 二三一
二三二 三八〇 三八一
胃 六四 七五 一七四
二九七
胃家 九三
柴胡证 一〇一 一〇三
一〇四 一四九 二五一
二六七
柴胡汤证 一二三 一四九
急下之 二五二 二五三
二五四 三二〇 三二二
便血 八四 二九三 三三九

脉大 一八六 三六五
脉小 二七一
脉小细沉紧 一二九
脉平 三九一
脉沉 一二八 一四八 二一八
三〇一 三〇五 三二五
脉沉迟 六二
脉沉而迟 三五七 三六六
脉沉弦 三六五
脉沉微 六一
脉沉结 一二五
脉沉滑 一四〇
脉沉紧 六七 一四〇 二六六
脉虽沉紧 一四八
脉沉而紧 一三五
脉沉实 三九四
脉迟 一四三 一九五 二〇八
二三四 三三三
脉迟浮弱 九八
脉实 二四〇
脉反实 三六九
脉细 一四八
脉细欲绝 三五一
脉细数 一二〇 一四〇
脉细沉数 二八五
脉弦 一〇〇 一四〇 一四二
二一二
脉弦细 二六五
脉弦迟 三二四

脉弦浮大 二三一
脉洪大 二五 二六
脉结代 一七七
脉浮 一 三〇 四二 四五
 五一 七一 一一二
 一—三 一—五 一—六
 一二八 一二九 一四〇
 一七〇 二二三 二二七
 二三五 二七六 三九四
脉浮大 一三二 二六八
脉浮而大 三〇
脉浮紧 一六 三八 四六
 四七 五〇 五五
脉浮而紧 一〇八 一五一
 一八九 二〇一 二二一
脉浮缓 三九
脉浮而缓 一八七 二七八
脉浮数 四九 五七 七二
 二五七
脉浮而数 五二
脉浮滑 一三八 一四〇
 一七六
脉浮虚 二四〇
脉浮虚而涩 一七四
脉浮而涩 二四七
脉浮而芤 二四六
脉浮而动数 一三四
脉浮而迟 二二五
脉浮细 三七

脉浮弱 四二
脉关上浮 一五四
脉但浮 二三二
脉续浮 二三一
脉弱 二五一 二八〇 三六〇
 三七七
脉弱涩 二八六
脉紧 一四〇 一九二 二八七
脉涩 四八 一〇〇
脉数 一二二 二五七 二五八
 三三二 三六一 三六七
脉数急 四
脉滑 三五〇
脉滑而疾 二一四
脉滑而数 二五六
脉缓 二
脉微 四九 九四 二八六
 三一五 三三八 三四三
 三八五
脉微弱 二七 三八 一三九
 三六五
脉微浮 一六六 三二七
脉微细 六〇 二八一
脉微细沉 三〇〇
脉微而沉 一二四
脉微弱数 三六五
脉微涩 三二五 三八四
脉反微涩 二一四
脉微欲绝 三一七 三八九

三九〇

脉微缓 二三

脉甚微 一六〇

脉当微厥 一〇五

脉暴微 二八七

脉静 四

脉绝 三六八

脉虚 三四七

脉还 三六八

脉短 二一一

脉阴阳俱紧 三 二八三

脉阴阳俱浮 六

脉阴阳俱停 九四

脉阳微 二四五

脉调和 一〇五

脉自和 二一一

结胸 一二八 一二九 一三一

一三二 一三三 一三四

一三五 一三六 一三八

一三九 一四〇 一四一

一四二 一四三 一四九

一五〇

绕脐痛 二三九

肺俞 一四二 一七一

肺 一〇九

客气 一三四 一五八 二二一

谵语 二九 三〇 一〇五

一〇七 一〇八 一一〇

一一一 一一三 一四二

一四三 一四五 二一〇

二一一 二一二 二一三

二一四 二一五 二一六

二一七 二一八 二一九

二二〇 二二一 二六五

二六七 二八四 三七四

语言难出 六

语言必乱 二一七

(不能语言) 三一二

津液自和 四九

津液外出 二一三

津液越出 二一八

津液内竭 二三三

津液得下 二三〇

津液当还入胃中 二〇三

疮家 八五

除中 三三二 三三三

十 画

振寒 六〇

振栗 九四 一一〇

恶风 二 一二 一三 一四

二〇 三一 三五 三八

九八 九九 一一〇

一六八 一七五

恶寒 一 三 七 一二 二二

二三 二九 六八 七〇

一〇九 一二〇 一二一

一三四 一四六 一四八

一五五 一六四 一六九
 一八三 一八四 二三四
 二四四 二八八 二八九
 二九五 二九八 三〇四
 三五三 三八三 三八五
 顿服 二三 六一 六四 七〇
 一三一 一六六 二〇七
 三五五
 桂枝证 三四 一六六
 热入血室 一四三 一四四
 一四五 二一六
 热多寒少 二三 二七
 热结在里 一三六 一六八
 眩 一七一
 眩冒 一四二 一六〇
 衄 四六 四七 五五 五六
 八六 一十一 二〇二
 二二七
 脐下悸 六五
 脐傍 一六七
 息高 二九九
 瘀血 一九 二五八 三〇六
 三〇七 三〇八 三三四
 三四一 三五七 三六三
 三六七
 胸中窒 七七
 胸中烦 九六
 胸中痛 一二三
 胸中实 三二四

胸中痞硬 一六六
 胸中有热 一七三
 胸中满而烦 二六四
 胸满 二一 三六 三七
 一〇七 三一〇
 胸胁满 一〇四 一四七
 二二九
 胸胁下满 一四三
 胸胁苦满 九六
 胸胁烦满 三三九
 烦 二四 三〇 四六 五七
 七四 七七 八〇 九六
 一〇二 一〇三 一〇七
 一一六 一二一 一四一
 一四六 一四七 一五三
 一五六 一六八 一七五
 一七九 二三八 二四〇
 二四一 二六四 二六五
 二七四 二七八 二八七
 二八九 二九八 三〇〇
 三〇三 三一五 三三八
 三五五 三七五 三九一
 烦躁 二九 三〇 三八 六一
 六九 七一 一一八
 一三三 二二一 二三九
 二五一 三〇〇 三〇九
 三三九 三四三
 消谷引食 一二二
 消谷喜饥 二五七

消渴 七一 三二六
酒客 一七
烧针 二九 一一七 一一八

一五三

痈脓 三三二 三七六
能食 一七五 一九〇 一九八
二一五 二二七 二五一
二七〇 三三二 三三三
三八四
难治 一二九 一五三 一七八
二一四 二九四 三四八
三五七 三七七

十一画

虚烦 七六 一六〇 三七五
虚家 一六六 一六八 三三〇
三五五
宿食 二三三 二四一 二五六
三九三
欲吐 四 一二三 二八二
三〇〇 三二四 三九七
淋家 八四
清便 二三 九一
清血 一一四
盗汗 一三四 二〇一
惊 六 一〇七 一一二
一一九 二六四
强人 二九 一四一 一五二
二二五 三二三 三五三

三八八

颈项强 九八 九九 一七一

十二画

厥 二九 一〇五 一九七
二九四 三三〇 三三一
三三二 三三四 三三五
三三六 三三七 三三八
三三九 三四一 三四二
三四三 三四五 三四七
三四八 三五〇 三五一
三五四 三五六 三六六
三七〇 三七七 三九〇
厥逆 三〇 三八 三一五
三四四 三五三
厥阴病 三二八 三二九
厥阴 三二六 三二七 三四三
咽喉不利 三五七
喉为痹 三三四
喘 三四 三五 三六 四〇
四一 四三 六三 七五
一一一 一六二 一八九
二〇八 二一〇 二一二
二一八 二二一 二三五
二四二 三六二
喘家 一八
遗尿 二一九
短气 四八 一三四 一五二
一七五 二〇八 二三一

脾约 一七九
 脾为约 二四七
 脾家实 二七八
 脾胃气 三九八
 筋惕肉瞤 三八
 温针 一六 一一九 二二一
 二六七
 温经 三〇
 渴欲饮水 七四 一〇九
 一七〇 二二二 二二三
 二四四 三二九
 渴 六 二六 四〇 四一
 七二 七三 九六 九七
 九八 九九 一一三
 一三七 一四七 一五六
 一六八 一六九 二二四
 二三六 二四四 二八二
 三一九 三二六 三二九
 三六〇 三六七 三八六
 痞 一三一 一四九 一五一
 一五六 一五八 一六四
 一六七
 寒下 三五九
 寒分 一三九
 寒饮 三二四
 寒格 三五九
 寒栗 八七
 寒湿 二五九

十三画

蓄血 二三七
 微似汗 一四 三一 三三
 三五 三八 四三 二二三
 三九三
 微似有汗 一二
 微汗 一七五 二〇〇
 微烦 八〇 一〇三 一二三
 一四七 一九五 二〇三
 二五〇 三九八
 微热 七一 九六 二四二
 二五二 三六〇 三六一
 三六六 三七七
 痿痺 九七
 腰痛 三五
 腰以下必重而痺 一一六
 腰以下有水气 三九五
 腹中痛 九六 一四一 一七三
 三一七 三一八 三五八
 三八六
 腹痛 一六八 三〇七 三一六
 三一七
 腹濡 三四七
 腹胀满 六六 二四九 三七二
 腹满 七九 一〇八 一一一
 一二六 一八九 一九五
 二〇八 二一九 二二一
 二三二 二五五 二七三

二七九 三四〇 三八一
三八六

腹必满 一〇九

腹满痛 二四一 二五四

腹微满 一二三 二三八

二六〇

腹中雷鸣 一五七 一五八

腹中急痛 一〇〇

瘀血 二三七 二五七

瘀热在里 一二四 二三六

二六二

痢症 六

痢 一一六 一七四 三三四

痿 一六〇

十四画

熏之 四八

熏灼 一一一

膀胱 一〇六 二九三 三四〇

膈 一二二 一三四 一四一

三二四

鼻干 二三一

鼻燥 二二七

鼻鸣 一二

鼻息必鼾 六

十五画

噎 四〇

潮热 二〇一 二〇八 二〇九

二一五 二二〇 二二九

二三一

十六画

霍乱 三八二 三八三 三八四

三八六

噫气 一六一

十七画

戴阳 三六六

藏结 一二八 一二九 一三〇

一六七

藏寒 三三八

藏有寒 二七七

藏厥 三三八

燥屎 二〇九 二一五 二一七

二三八 二三九 二四一

二四二 三七四

二十画

躁 一一〇 一一一 一一四

二二一 二九八 三三八

三四四

燥烦 四 四八 一一〇

一三四 二六九 二九六

方 剂

二 画

十枣汤 一五二

三 画

干姜附子汤 六一

干姜黄芩黄连人参汤 三五九

大青龙汤 三八 三九

大承气汤 三〇八 二〇九

二一二 二一五 二一七

二二〇 二三八 二四〇

二四一 二四二 二五一

二五二 二五三 二五四

二五五 二五六 三二〇

三二一 三二二

大柴胡汤 一〇三 一三六

一六五

大黄黄连泻心汤 一五四

一六四

大陷胸汤 一三四 一三五

一三六 一三七 一四九

大陷胸丸 一三一

小承气汤 二〇八 二〇九

二一三 二一四 二五〇

二五一 三七四

小青龙汤 四〇 四一

小建中汤 一〇〇 一〇二

小柴胡汤 三七 九六 九七

九八 九九 一〇〇

一〇一 一〇三 一〇四

一四四 一四八 二二九

二三〇 二三一 二六六

三七九 三九四

小陷胸汤 一三八 一四一

四 画

五苓散 七一 七二 七三

七四 一四一 一五六

二四四 三八六

文蛤散 一四一

乌梅丸 三三八

五 画

甘草汤 三一

甘草干姜汤 二九 三〇

甘草泻心汤 一五八

甘草附子汤 一七五

去桂加白术汤 一七四

四逆汤 二九 九一 九二

二二五 三二三 三二四

三五三 三五四 三七二

三七七 三八八 三八九

四逆加人参汤 三八五

四逆散 三一八

生姜泻心汤 一五七

白头翁汤 三七一 三七三

白虎汤 一七六 二一九

三五〇

白虎加参汤 二六 一六八

一六九 一七〇 二二二

白散 一四一

白通汤 三一四 三一五

白通加猪胆汁汤 三一五

瓜蒂散 一六六 三五五

半夏泻心汤 一四九

半夏散及汤 三一三

六 画

芍药甘草汤 二九 三〇

芍药甘草附子汤 六八

当归四逆汤 三五—

当归四逆加吴茱萸生姜汤

三五二

竹叶石膏汤 三九七

七 画

赤石脂禹余粮汤 一五九

吴茱萸汤 二四三 三〇九

三七八

牡蛎泽泻散 三九五

附子泻心汤 一五五

附子汤 三〇四 三〇五

八 画

抵当汤 一二四 一二五

二三七 二五七

抵当丸 一二六

苦酒汤 三一—

炙甘草汤 一七七

九 画

厚朴生姜半夏甘草人参汤 六六

茯苓甘草汤 七三 三五六

茯苓四逆汤 六九

茯苓桂枝白术甘草汤 六七

茯苓桂枝甘草大枣汤 六五

茵陈蒿汤 二三六 二六〇

枳实栀子豉汤 三九三

禹余粮丸 八八

十 画

桂枝汤 一二 一三 一五

一六 一七 一八 一九

二四 二五 二六 二八

四二 四四 四五 五三

五四 五六 五七 九—

九五 一六二 一六四

二三四 二四〇 二七六

三七二 三八七

桂枝二麻黄一汤 二五

桂枝二越婢一汤 二七
桂枝人参汤 一六三
桂枝加大黄汤 二七九
桂枝加芍药汤 二七九
桂枝加芍药生姜各一两人参三两

新加汤 六二

桂枝加附子汤 二〇
桂枝加厚朴杏子汤 一八 四三
桂枝加桂汤 一一七
桂枝加葛根汤 一四
桂枝甘草汤 六四
桂枝甘草龙骨牡蛎汤 一一八
桂枝去芍药汤 二一
桂枝去芍药加附子汤 二二
桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆
汤 一一二

桂枝去桂加茯苓白术汤 二八

桂枝附子汤 一七四

桂枝麻黄各半汤 二三

桃花汤 三〇六 三〇七

桃核承气汤 一〇六

桔梗汤 三一—

真武汤 八二 三一六

柴胡加芒硝汤 一〇四

柴胡加龙骨牡蛎汤 一〇七

柴胡桂枝汤 一四六

柴胡桂枝干姜汤 一四七

调胃承气汤 二九 七〇 九四

—〇五 一二三 二〇七

二四八 二四九

烧裨散 三九二

通脉四逆汤 三一七 三七〇

通脉四逆加猪胆汁汤 三九〇

十一画

理中丸(汤) 三八六 三九六

黄芩汤 一七二 三三三

黄芩加半夏生姜汤 一七二

黄连汤 一七三

黄连阿胶汤 三〇三

梔子干姜汤 八〇

梔子甘草豉汤 七六

梔子生姜豉汤 七六

梔子柏皮汤 二六一

梔子厚朴汤 七九

梔子豉汤 七六 七七 七八

二二一 二二八 三七五

猪苓汤 二二三 二二四

三一九

猪肤汤 三一〇

旋复代赭汤 一六一

麻子仁丸 二四七

麻黄升麻汤 三五七

麻黄汤 三五 三六 三七

四六 五一 五二 五五

二三二 二三五

麻黄连翘赤小豆汤 二六二

麻黄附子甘草汤 三〇二

麻黄细辛附子汤 三〇一
麻黄杏仁甘草石膏汤 六三
一六二

十二画

葛根汤 三一 三二

葛根加半夏汤 三三
葛根黄芩黄连汤 三四

十四画

蜜煎导 二三三