

برنامج تسميد المانجو (الرش الورقى)

								
النضج	التطور فى الحجم	العقد	عند ٣٠% تزهير	قبل تفتح الأزهار	خروج الشماريخ الزهرية	بداية النشاط	زيادة المجموع الجذرى	المراحل
٢ لتر هـلاند بوتيتو كومبلكس / فدان لتحسين خواص الثمار و زيادة مدة عرض المنتج بعد الحصاد	١,٥ لتر مانفريت كى- أسيد / فدان للتحجيم ، التلوين و زيادة محتوى السكر (ومرة بعد ١٥ يوم) ----- ٢ لتر هـلاند مالتى كى / فدان للتحجيم ، التلوين و زيادة محتوى السكر (ومرة بعد ١٥ يوم)	٢ لتر أجرونوم كالسيوم / فدان لتحسين خواص العقد (ومرة بعد ١٥ يوم)	٣٠٠ سم نافتوسين + ١,٥ لتر مانفريت فوسك ٥٠ / فدان لزيادة العقد والقضاء على التكتلات الزهرية (ويعاد بعد ٢١ يوم) ----- ٢ لتر هـلاند هاى - فوس / فدان لزيادة العقد	٦٠٠ سم هـلاند بو - لا + ٣٠٠ سم هـلاند موليبدينم / ٦٠٠ لتر ماء لرفع الخصوبة فى الأزهار عند التفتح ----- ١ لتر مانفريت ماكس ماج / فدان للخروج من الإجهاد ورفع مناعة النبات ضد البياض الدقيقى	٦٠٠ سم جيبست + ٢ كجم أجرونوم ٢٠ - ٢٠ - ٢٠ / ٦٠٠ لتر ماء بغرض الإستطالة ----- ١ كجم إكسترا أوليجوميكس / فدان	٢ كجم هـلاند كومبليت / ٦٠٠ لتر ماء ومرة بعد ١٥ يوم لدفع الخضري ----- ١ لتر مانفريت ماكس - ماج / فدان للخروج من الإجهاد و رفع مناعة النبات ضد البياض الدقيقى	٣ لتر أجرونوم ماكسور - دى / فدان + ٢ لتر شيلان سوبر + ١ كجم هيوميك أسيد ----- ١ لتر مانفريت كينوفول + ٢ لتر مانفريت ماكس ماج / فدان	المركبات المستخدمة



إضافات خاصة

- يضاف هيوميك أسيد من ٦-٨ مرات خلال الموسم ١ كجم / فدان.
- يضاف شيلان سوبر فى حالة وجود ظروف معاكسة (برد - حرارة - أمطار - رياح) بمعدل ٣سم / لتر ماء.
- يضاف فنجنشو لعلاج البياض الدقيقى بمعدل ١٠٠ جم + ١,٥ كجم كيريت ميكرونى .
- يضاف ميكروكير حديد ١٤% ادتا بمعدل ٠,٥ كجم/ فدان مرتان خلال الموسم.
- يضاف ميكروكير منجنيز ١٤% ادتا بمعدل ٠,٢٥ كجم / فدان مرتان خلال الموسم.
- يضاف ميكروكير زنك ١٤% ادتا بمعدل ٠,٥ كجم / فدان مرتان خلال الموسم.
- للقضاء على المن والذبابة يرش مركب أميدامكس بمعدل ٢٥ جم / ١٠٠ لتر ماء.
- إضافة ١ لتر مانفريت برو زنك + ٥٠٠ سم هـلاند بو-لا فى منتصف شهر فبراير لإنتظامية التفتح