



التوصيات الفنية لمحصول الأرز

شركة طيبة للتجارة و التوكيلات و التنمية الزراعية

مكتب الدعم الفني

الإدارة : ميت غراب ، طريق أجا ، السنبلوين - ت & ف : ٦٧١٢٣٣٣ - ٦٧١٢٥٥٥ - ٦٧١٢٤٤٤ (٠٥٠)
المكتب الفني : المنصورة ، ١ شارع طلعت حرب - ت & ف : ٢٣٠٩٦٥٠ - ٢٣٠٩٦٥١ (٠٥٠)
فرع الإسماعيلية : القنطرة شرق ، جليانة ، أول طريق العريش - ت & ف : ٣٢٧٨١٤٠ - ٣٢٧٨١٤١ (٠٦٤)
فرع الصالحية : الشرقية ، الصالحية الجديدة ، كوبرى الكسارة - ت & ف : ٩١٣١٢٤٦ - ٩١٣٢٨١٨ (٠٥٥)
فرع جمصة : الطريق الدولى أمام المنطقة الصناعية - ت : ٠١٢٨١٠٧٧٢١١
فرع البحيرة : النجاح ، مركز بدر - ت & ف : ٣٧٥١٧٢٠ - ٣٧٥١٧١٠ (٠٤٥)

E-mail: info@tiba-egypt.com

website: www.tiba-egypt.com

توصيات الفنية لمحصول الأرز



- ان تكون الارض ذات صرف جيد مع مصدر جيد للرئ.
- الميعاد المناسب للزراعة فى المشتل من ١ إلى ١٥ مايو.
- الميعاد المناسب للنقل من المشتل إلى الارض من ٣٠ يوم إلى ٣٥ يوم من الزراعة.
- المسافة المناسبة للشتل فى الارض مسافة ٢٠ سم ويكون عدد ٢ نبات فى الجورة ويكون رجل غراب لزيادة التفريع.
- عدم خلط التقاوى من مصادر مختلفة واختيار التقاوى المناسبة لكل ارض.
- نقع التقاوى الجيد فى مصدر ماء جارى.
- المكافحة الجيدة للحشائش:
يستخدم مبيد الرنبو بمعدل ٢٠ سم / قيراط / ١٠ لتر ماء فى المشتل / عند عمر من ٨ إلى ١٥ يوم وعدد ٣ ورقات، وفى الارض المستديمة بمعدل ٤٠٠ سم / فدان وتتم كالاتى:-
صرف المياه من المشتل فى اليوم السادس ولمدة يومين حتى تصل البادرات إلى ورقتين من ٨ إلى ١٥ يوم من البدار ثم الرش بعدها يتم المحافظة على وجود المياه فى المشتل بعد إضافة المبيد لمدة ثلاث ايام ثم يومين بدون رى ثم يعاد الرى الطبيعى المعتاد ثم يضاف ٥ كجم يوريا + ٢ كجم سلفات زنك.
- التسميد الفوسفور ١٠٠ كجم سوپر على البلاط وقبل الحرث للتقليل من الريم
- البوتاسيوم ٥٠ كجم على الشراقي ، ٢٥ كجم بعد ٤٥ يوم من الشتل و ٢٥ كجم عند عمر ٦٥ يوم.
- الازوت ٥٠ كجم سلفات نشادر على الشراقي و ٥٠ كجم يوريا عند ٣٠ يوم و ٥٠ كجم يوريا عند ٥٠ يوم.
- رش ١ لتر هـلاند هاى فوس لزيادة التفريع / ٢٠٠ لتر بعد ١٥ يوم من الشتل.
- إضافة ٢ كجم كيريتات نحاس فى كيس قماش فى مدخل المياه لمنع تكوين الريم.
- إضافة شكاره سلفات زنك فى الخدمة.
- للحصول على مجموع خضرى جيد يضاف ١ كجم هـلاند كومبليت + ٦٠٠ سم جيبست / ٦٠٠ لتر ماء مرة بعد الشتل ب ٢١ يوم ، و بعد ١٥ يوم من الرش الاولى أو ١ لتر مانفيرت ماكس ماج
- ضرورة الإلتزام بمعدلات التسميد الموصى بها.
- الملاحظة الجيدة للأمراض والعلاج فى الوقت المناسب.