

برنامج تسميد الطماطم (الرش الورقى)

النضج والحصاد	تطور الثمار	العقد	التزهير الكامل	بداية التزهير	النمو الخضرى	الأوراق الحقيقية	المراحل
۱,۰ لتر مانفيرت كى اسيد ۱۰۰ لتر ماء + ٥,٠ لتر كينوفول ۱,۰ لتر مانفيرت فوسك ٥٠ ۱،۰ لتر مانفيرت فوسك ٠٠ ۱۰ ۲۰ لتر ماء ۱کجم هدلاند كومبليت + ۱,۰ كجم إكسترا أوليجوميكس / ١٠٠ لتر ماء	۱,۰ لتر مانفيرت ماكس ماج ۱،۰ لتر ماء + ۰,۰ لتر كينوفول ۱,۰ لتر فيركال / ۲۰۰ لتر ماء ۲ لتر هدلاند مالتى كى / ۱۰۰ لتر ماء	۱, ۱ لتر مانفيرت كى اسيد / كينوفول ۲۰۰ لتر ماء + ٥, ١ لتر كينوفول ۲ لتر هدلاند مالتى كى / ۲۰۰ ۱ لتر هدلاند هاى فوس / ۱۰۰ لتر ماء ۲ لتر هدلاند بوتيتو كومبلكس	۱٫۰ لتر فيركال / ۲۰۰ لتر ماء ۱کجم هدلاند كومبليت +۰۰، کجم إكسترا أوليجوميكس / ۲۰۰ لتر	ا لتر مانفيرت برو زنك + ۰۰۰ سم هدلاند بو-لا + ۲۰۰ سم هدلاند موليبدنم / ۲۰۰ لتر ماء موليبدنم / ۲۰۰ لتر ماء التر مانفيرت فوسك ۰۰ / ۲۰۰ لتر ماء + ۰٫۰ لتر كينوفول ماء + ۰٫۰ لتر كينوفول ماء + ۲۰۰ سم نافتوسين / ۲۰۰ لتر مياة		۲ لتر ماكسور دى + ۲ لتر شيلان سوبر + ۱ كجم هيوميك اسيد (في السمادة) بعد ٥ أيام من الشتل ٤ لتر هدلاند هاى فوس بعد ١٥ يوم من الشتل (في السمادة) السمادة) كجم فيراسول ٣ مرات في الأسبوع (السمادة)	المركبات المستخدمة

إضافات خاصة

- يضاف هيوميك أسيد من٦-٨ مرات خلال الموسم ١ كجم / فدان.
- يضاف شيلان سوبر في حالة وجود ظروف معاكسة (برد حرارة أمطار رياح) بمعدل ٣سم / لتر ماء.
 - يضاف فنجشو لعلاج البياض الدقيقي بمعدل ١٠٠ جم + ١,٥ كجم كبريت ميكروني .
 - يضاف ميكروكير حديد ١٤% ادتا بمعدل ٥٠٠ كجم/ فدان مرتان خلال الموسم.
 - يضاف ميكروكير منجنيز ١٤% ادتا بمعدل ٠٢٠٠ كجم / فدان مرتان خلال الموسم.
 - يضاف ميكروكير زنك ١٤% ادتا بمعدل ٥٠٠ كجم / فدان مرتان خلال الموسم.
 - للقضاء على المن والذبابة يرش مركب أميدامكس بمعدل ٥ ٢جم / ١٠٠ التر ماء.

