

برنامج تسميد البطاطس (الرش الورقى)



الغرض من
الإستخدام

المركبات
المستخدمة



كسر طور السكون
وتنشيط البراعم

٥ سم مانفيرت كينوفول +
٢ سم مانفيرت برونك.



تمام الإنبات

يستخدم أجرونوم ماكسور-
دى بمعدل ٣ لتر / فدان +
١ كجم هيوميك أسيد / فدان



الدفع الخضرى

يستخدم ١ كجم هدلاند
كومبليت + ٠,٥ كجم
إكسترا أوليجوميكس +
٠,٥ لتر مانفيرت
كينوفول عند عمر ٣٠ يوم
و عمر ٥٠ يوم



النمو الخضرى الكثيف

١ لتر مانفيرت ماكس ماج
٠,٥ لتر مانفيرت كينوفول
/ فدان
لرفع مناعة النبات و الوقاية
من الامراض الفطرية مرة
عند ٤٠ يوم و مرة عند ٧٠
يوم



مرحلة ضرب الإبر

يستخدم هدلاند هاى فوس
بمعدل ٢ لتر / فدان عند
عمر ٤٥ يوم ومرة عند
٦٥ يوم



للقاية من ظاهرة القلب
الأجوف

يستخدم هدلاند بو-لا ١ لتر
عند ٦٠ يوم و ٢ لتر بعد
١٠٠ يوم.

يستخدم مركب مانفيرت
كى أسيد ١,٥ / لتر +
٠,٥ لتر مانفيرت كينوفول
مرتين (٦٥ و ٨٠ يوم)



زيادة الوزن والوقاية
من الجرب

يستخدم مركب فيركال ٢,٥
سم / لتر أو (أجرونوم
كالسيوم) مرتين (٦٠ و
٨٥ يوم)



زيادة الصب والوقاية
من الظروف المعاكسة

يستخدم مركب هدلاند
بوتيتو كومبلكس ٢ لتر /
فدان عند عمر ٧٥ يوم
وعند ٩٠ يوم



إضافات خاصة:

- يضاف هيوميك أسيد من ٤ - ٥ مرات خلال الموسم ١ كجم / فدان.
- يضاف شيلان سوبر فى حالة وجود ظروف معاكسة (برد - حرارة - أمطار - رياح) بمعدل ٣ سم/ لتر ماء.
- لزيادة نشاط الإنزيمات و العمليات الحيوية داخل النبات :
- يضاف هيفيسترين حديد ٦% بمعدل ٠,٥ كجم/ فدان مرتان خلال الموسم.
- يضاف ميكروكير منجنيز ١٤% ادتا بمعدل ٠,٢٥ كجم / فدان مرتان خلال الموسم.
- يضاف ميكروكير زنك ١٤% ادتا بمعدل ٠,٥ كجم / فدان مرتان خلال الموسم.