

برنامج تسميد الموالح (الرش الورقى)

							
الحصاد	النضج	تطور الثمار	العقد	التزهير	النمو الخضري	بداية النشاط	المراحل
لتحسين خواص الثمار و زيادة مدة عرض المنتج بعد الحصاد :	لتحسين خواص القشرة وإطالة القطف ١ سم جيبست / لتر ماء قبل التلوين بأسبوعين	٢ لتر هدلاند مالتى كى / فدان فى الأسبوع الأول من شهر يوليو وأخرى بعد ١٥ يوم للتحجيم والظروف المعاكسة. ----- ١,٥ لتر مانفيرت كى- أسيد / فدان فى الأسبوع الثانى من شهر أغسطس وأخرى بعد ١٥ يوم للتحجيم والظروف المعاكسة.	١ سم جيبست / لتر ماء + ٢,٥ سم أجرونوم كالسيوم / لتر ماء فى شهر يوليو للوفاية من ظاهرة التبخير. ----- ١ لتر فيركال / فدان فى مارس ومرة أخرى فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.	١,٥ سم مانفيرت فروت سيت / لتر ماء ويعاد بعد إنتهاء التساقط الطبيعى لتحسين العقد ودفع النمو الخضرية. ----- ٠,٥ سم نافتوسين / لتر ماء + ٢,٥ سم أجرونوم ١٠/٣٠/٢٠ / لتر ماء لزيادة العقد وأخرى بعد ٢١ يوم من الرشة الأولى.	١,٥ جم إكسترا أوليجوميكس / لتر ماء فى أول مارس و الأخرى فى ١٥ يوليو . ----- ١ جم إكسترا أوليجوميكس / لتر ماء فى ١٥ إبريل، ومرة فى ١٥ يونيو. ----- ١ لتر مانفيرت ماكس ماج / فدان للدفع الخضري وللوقاية من الإجهاد الناتج عن البرد فى الأسبوع الأول من شهر مارس.	١ كجم هدلاند كومبليت / فدان للخروج من الإجهاد ومرة بعد ٢١ يوم. ----- ١ سم هدلاند بو-لا / لتر ماء + ٠,٥ سم هدلاند موليبدينم / لتر ماء لرفع خصوبة الأزهار.	المركبات المستخدمة



ملاحظة هامة

- يضاف هيومات أسيد أربع مرات خلال الموسم مع كل دورة نمو بمعدل ١ كجم / فدان.
- يضاف شيلان سوبر فى حالة وجود ظروف معاكسة (برد - حرارة - أمطار - رياح) بمعدل ٣ سم/ لتر ماء.
- يضاف ميكروكبريت حديد ١٤% ادتا بمعدل ٠,٥ كجم/ فدان مرتان خلال الموسم.
- يضاف ميكروكبريت منجنيز ١٤% ادتا بمعدل ٠,٢٥ كجم / فدان مرتان خلال الموسم.
- يضاف ميكروكبريت زنك ١٤% ادتا بمعدل ٠,٥ كجم / فدان مرتان خلال الموسم.
- للقضاء على المن والذبابة يرش مركب أميدامكس بمعدل ٢٥ جم / ١٠٠ لتر ماء.