

برنامج تسميد البطيخ (الرش الورقي)

								
النضج	تمام العقد	بداية العقد	بداية التزهير	قبل التزهير	الدفع الخضري	٣ - ٤ ورقات	بعد الزراعة	المراحل
٢ لتر هـلاند مالتى كى / ٦٠٠ لتر	١,٥ لتر مانفـيرت كى أسيد + ٠,٥ لتر مانفـيرت كينوفول / ٦٠٠ لتر	لزيادة حيوية العقد و تثبيته ١,٥ لتر مانفـيرت فوسك + ٠,٥ لتر مانفـيرت كينوفول / ٦٠٠ لتر ماء رش ١ لتر فيركال / ٦٠٠ لتر	٣٠٠ سم هـلاند موليدنيم + ٦٠٠ سم هـلاند بو-لا / ٦٠٠ لتر لزيادة حيوية العقد و تثبيته	١ لتر فروت سـيتر + ٠,٥ لتر كينوفول / ٦٠٠ لتر ماء ----- ١,٥ لتر مانفـيرت فوسك ٥٠ + ٠,٥ لتر مانفـيرت كينوفول / ٦٠٠ لتر لزيادة عدد الأزهار	٥٠٠ جم إكسترا أولـبـجـوميـكس + ١ كـجـم هـلاند كـومـبـليت / ٦٠٠ لتر لتحسين النمو الخضري ----- ١ لتر مانفـيرت ماكس ماج + ٠,٥ لتر مانفـيرت كينوفول / فدان فى السـمادـة	٦٠٠ سم جيبست + ٢ كـجـم أجـرونـوم ٢٠ - ٢٠ - ٢٠ / ٦٠٠ لتر ماء للدفع الخضري ----- ١ لتر مانفـيرت برو-زنك + ٦٠٠ سم هـلاند بو-لا / ٦٠٠ لتر لزيادة إستطالة المـداد	٣ لتر أجرونوم ماكسور- دي + ٢ كجم هيوميك أسيد لتنشيط المجموع الجذري او ٢ لتر مانفـيرت ماكس ماج + ١ لتر مانفـيرت كينوفول / فدان	المركبات المستخدمة



إضافات خاصة

- يضاف هيوميك أسيد ٢-٤ مرات خلال الموسم بمعدل ١,٥ كجم / فدان فى الإضافة.
- يضاف شيلان سوبر فى حالة وجود ظروف معاكسة (برد - حرارة - أمطار - رياح) بمعدل ٣ سم / لتر ماء.
- يضاف فنجشو لعلاج البياض الدقيقى بمعدل ١٠٠ جم + ١,٥ كجم كيريت ميكرونى / ٦٠٠ لتر ماء.
- ٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء الديسان للبياض الزغبي. يرش ١ لتر مانفـيرت برو كب / ٦٠٠ لتر ماء من ٢ - ٣ مرات
- فى حالة الإجهاد الشديد يستخدم مركب مانفـيرت كينوفول ٠,٥ لتر / الفدان فى مياه الري.