

برنامج تسميد البطاطس (الرش الورقى)

المراحل

المركبات المستخدمة

كسر طور السكون وتنشيط البراعم

تمام الإنبات بعد الريج

الدفع الخضرى

النمو الخضرى الكثيف

مرحلة ضرب الإبر

للقاية من ظاهرة القلب الأجوف

زيادة الوزن والوقاية من الجرب

زيادة الصب والوقاية من الظروف المعاكسة

يستخدم مركب مانفيريث كينوفول ٥ سم / لتر ماء.

يستخدم أجرونوم ماكسور- دى بمعدل ٣ لتر / فدان + ١ كجم هيوميك أسيد / فدان

يستخدم ١ كجم إكسترا أوليجوميكس + ١ كجم هيلاند كومبليت + ٠,٥ مانفيريث كينوفول / فدان عند ٣٠ يوم ، ومرة عند ٥٠ يوم

يستخدم مانفيريث برو ماج ٢ سم + ٢ سم مانفيريث برو- فير / لتر ماء عند عمر ٤٠ يوم ومرة عند ٧٠ يوم.

يستخدم مانفيريث ماكس ماج ١,٥ سم / لتر + ٠,٥ لتر مانفيريث كينوفول لرفع المناعة والوقاية من الأمراض الفطرية من ٢ - ٣ مرات خلال الموسم.

يستخدم هيلاند هاى فوس بمعدل ٢ لتر / فدان عند عمر ٤٥ يوم ومرة عند ٦٥ يوم

يستخدم هيلاند بو-لا ١ لتر عند ٦٠ يوم و ٢ لتر بعد ١٠٠ يوم.

يستخدم مركب مانفيريث كى أسيد ١,٥ / لتر + ٠,٥ لتر مانفيريث كينوفول مرتين (٦٥ و ٨٠ يوم)

يستخدم مركب فيركال ٢,٥ سم / لتر أو (أجرونوم كالسيوم) مرتين (٦٠ و ٨٥ يوم)

يستخدم مركب هيلاند بوتيتو كومبليكس ٢ لتر / فدان عند عمر ٧٥ يوم وعند ٩٠ يوم

إضافات خاصة

- يضاف هيوميك أسيد من ٤ - ٥ مرات خلال الموسم ١ كجم / فدان.
- يضاف شيلان سوبر فى حالة وجود ظروف معاكسة (برد - حرارة - أمطار - رياح) بمعدل ٣سم / لتر ماء.
- يضاف ميكروكير حديد ١٤% ادتا بمعدل ٠,٥ كجم/ فدان مرتان خلال الموسم.
- يضاف ميكروكير منجنيز ١٤% ادتا بمعدل ٠,٢٥ كجم / فدان مرتان خلال الموسم.
- يضاف ميكروكير زنك ١٤% ادتا بمعدل ٠,٥ كجم / فدان مرتان خلال الموسم.

