

برنامج تسميد البطاطس (الرش الورقى)

								
زيادة الصب والوقاية من الظروف المعاكسة	زيادة الوزن والوقاية من الجرب	للوقاية من ظاهرة القلب الأجوف	مرحلة ضرب الإبر	النمو الخضري الكثيف	الدفع الخضري	تمام الإنبات	كسر طور السكون وتنشيط البراعم	الغرض من الإستخدام
يستخدم مركب هـلاتند بو-لا ١ لتر / الفدان عند ٦٠ يوم و ٢ لتر بعد ١٠٠ يوم	يستخدم مركب فيركال ٢.٥ سم / لتر أو (أجرونوم كالسيوم) / الفدان مرتين عند ٦٠ يوم وعند ٨٥ يوم	يستخدم هـلاتند بو-لا ١ لتر / الفدان عند ٦٠ يوم و ٢ لتر بعد ١٠٠ يوم ----- يستخدم مركب مانفيري كى أسيد ١.٥ لتر + ٠.٥ لتر مانفيري كينوفول / الفدان مرتين عند ٦٠ يوم وعند ٨٠ يوم	يستخدم هـلاتند هاى فوس بمعدل ٢ لتر / فدان عند عمر ٤٥ يوم ومرة عند ٦٥ يوم	١ لتر مانفيري ماكس ماج + ٠.٥ لتر مانفيري كينوفول / فدان لرفع مناعة النبات والوقاية من الأمراض الفطرية مرة عند ٤٠ يوم و مرة عند ٧٠ يوم	يستخدم ١ كجم هـلاتند كومبليت + ٠.٥ كجم إكسترا أوليجوميكس + ٠.٥ لتر مانفيري كينوفول عند عمر ٣٠ يوم و عمر ٥٠ يوم للفدان	يستخدم أجرونوم ماكسور- دى بمعدل ٣ لتر / فدان + ١ كجم هيوميك أسيد / فدان فى السمادة	٥ سم مانفيري كينوفول + ٢ سم مانفيري بروزنك للتر	المركبات المستخدمة



إضافات خاصة:

- يضاف هيوميك أسيد من ٤ - ٥ مرات خلال الموسم ١ كجم / فدان.
- يضاف شيلان سوبر فى حالة وجود ظروف معاكسة (برد - حرارة - أمطار - رياح) بمعدل ٣ سم / لتر ماء.
- لزيادة نشاط الإنزيمات و العمليات الحيوية داخل النبات :
- يضاف هيفيسترين حديد ٦% بمعدل ٠.٥ كجم / فدان مرتان خلال الموسم.
- يضاف ميكروكوير منجنيز ١٤% ادتا بمعدل ٠.٢٥ كجم / فدان مرتان خلال الموسم.
- يضاف ميكروكوير زنك ١٤% ادتا بمعدل ٠.٥ كجم / فدان مرتان خلال الموسم.