المكافحة المتكاملة لأمراض الرمان

أولا الأمراض الفطرية

العلاج	أسبابة / مظاهر الإصابة	أسم المرض
کولیز ۵۰ جم / ۱۰۰ لنر ماء	ظهور بقع بنية سوداء على الأوراق وفي مركز اللون فاتح، وعلى الثمار نلاحظ بقع صغيرة لونها فاتح ولون حدودها بنفسجي إلى بني ومع تقدم الأفة تزداد مساحة البقع. اسباب الظهور:- درجات حرارة عالية ورطوبة عالية. Sphaceloma هذا الفطر يسبب بقع صغيرة ذات نسيج خشن.	تبقعات الأوراق و الثمار
يتبع نفس الأسلوب السابق ذكره لمكافحة العفن الأسود مع الإهتمام بنظافة أماكن التخزين	هذا المرض في الأساس يحدث بعد الحصاد. أعراضه ظهور عفن رمادي على التاج ومنطقة التاج نتيجة الإصابة بنوع من الفطريات المسببة لهذا المرض آخر الموسم أو أثناء التخزين.	مرض عفن التاج في الرمان
يمكن استخدام مبيد ريزولكس تى ٥٠% WP بمعدل ٣ جرام / لتر ماء حيث يتم عمل حجم مناسب من محلول الرش ويتم سقاية الاشجار (سقسقة تحت الجذع مباشرة) بمعدل ٥٠٠ سم – ٢ لتر / الشجرة حسب عمر وحجم الشجرة او دايسان ١ كجم + السمادة	في البداية نلاحظ اصفرار الأوراق ثم جفافها وسقوطها، وفي مراحل متقدمة نشاهد ثمار جافة على الفروع، أشجار مصابة إصابة شديدة تجف وتموت خلال بضعة شهور، عند قطع الفرع الرئيسي أو الجذع يمكن أن نرى تحول الخشب إلى اللون البني ومن ثم إلى الأسود. المرض يظهر خاصة في التربة الطينية الثقيلة ويزداد حدته مع ازدياد الرطوبة وقلة ويزداد حدته مع ازدياد الرطوبة وقلة الربيع وبداية المرض في الظهور في فصل الربيع وبداية الصيف. فطريات أخرى يمكن أن تسبب الأعراض نفسها	مرض الذبول في الرمان

ثانيا الأمراض الحشرية

مظاهر الإصابة العلاج / مكافحة

وجود ثمار ساقطة تحت الاشجار، تحول منطقة الإصابة إلى اللون البنَّ، خروج عصارة لزجة ذات لون بنَّ محمر من الثقب الذي تحدثه البرقة عند دخولها إلى الثمرة، وجود ثقوب واضحة على الثمار نتَّجة دخول الرقات، تلف جزء كبير من الثمرة بسبب الإصابة بالفطر يات الرمّة، وحشرات التخمر مما يؤدي إلى تعفن الثمرة بالكامل عند تقدم - الاصابة تحدث في مايو – سبتمبر


الأفة

Virachola Isocrates فراشة ثمار الرمان، عثة الرمان ،دودة ثمار

دودة ثمار الرمان

الرمان تعتبر من اهم الافات الحشرّة التّى تهاجم أشجار الرمان وقد تصل نسبة الفقد فّى محصول الرمان إلى ٦٠% بسبب الإصابة بهذه الافة .







وسهولة كسرها وقلة المحصول، بإشتداد الإصابة تموت الشجرة

تعتبر حشرات المن من اهم الافات التّى تهاجم أشجار الرمان وتسبب ضرر كبّير لها وخاصة فّى بداّية الموسم، تهاجم الاوراق والافرع الغضة بشكل خاص وتمتص العصارة وتسبب فّى تجعد الاوراق وتضعف الشجرة وتكون ثماراً صغّيرة الحجم كما تفرز هذه الحشرة مادة عسلية تكون ملائمة لنمو العفن الاسود، حشرة ماصة خضراء صغيرة تهاجم الاوراق والنموات الغضة والازهار والبراعم وحتى الثمار الصغّرة.



المن



- رش النبات بالزّيت الشتوي للقضاء على

البيض الموجود على الشجرة

- رش الاشجار عند ظهور بوادر المن قبل

التزهر وبعد العقد بالمبيّدات الكّماؤية

المناسبة مركب الاميدامكس بمعدل ٥٠ جم

/ ١٥٠ لتر مباة

دوروسبان ۱۷۰سم/۱۰۰ لتر ماء

تتم المكافحة في شهر مارس بإدخال سلك

وتمريرة حتى نهاية النفق لقتل اليرقات

دوروسبان ۱۰۰/سم /۱۰۰ لتر ماء





TIBA | Trading , Agencies& Agriculture Development

 $\textbf{Head Office}: 1 \, \textbf{Talaat Harb St.,} \textbf{Feasal Bank Building ,} \, \textbf{Toreel ,} \, \textbf{Mansoura City ,} \, \textbf{Egypt}$

 Tel: +2 050 23 09 650
 Fax: +2 050 23 09 651

 Email: info@tiba-egypt.com
 www.tiba-egypt.com

